

8^o A. gr. b. 3269
(Theophrast)
Stackhouse

~~Shyl. 129^m~~

Ant. p. 10. 11.

912. 9

A. Gr. 2223^m

m


phys. Bot

Auct. Gr. vet. 91.

p. 515.

Starkhouse

PLANTARUM



PLANTARUM

PLANTARUM

ILLUSTRATIONES
THEOPHRASTI

IN USUM

BOTANICORUM
PRÆCIPUE PEREGRINANTIUM.

AUCTORE

JOH. STACKHOUSE, ARM.

SOC. LINN. LOND. HIST. NAT. MOSC.

(COLL. EXON. OXONII OLIM)

SOCIO.

OXONII,
E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO.

MDCCCXI.

ILLUSTRAZIONI

THEOPHASTI

INTRODUCTORIUM



OXONIA

E. TYPGRAPHO CLARENDONIANO.

MDCCLXII

PRÆFATIO.

THEOPHRASTUS, omnium, si Salomonem excipias, antiquissimus rei herbariæ investigator, plantas circiter quadringentas, ut in variis peregrinationibus se forte ei obtulissent, enumeravit; paucas quidem obiter, utpote omnibus sui temporis notissimas, plurimas vero accuratissime: individuas illas fane, nulloque ordinis methodici vel Nomenclaturæ systematicæ respectu habito. Quotiescunque vel de habitu aliqujus plantæ, vel de partibus ejus sermo erat, et præcipue quando vires medicæ quædam indagandæ erant, toties fasciculos, ut ita dicam, breves plantarum affinium in diversis operis sui libris collegit; quo fit ut eadem sæpius recurrat species. Hinc fastidium enatum Botanicis superioris sæculi, cui forsan addendæ sunt, cum ex lingua technica et insolita, tum ex textûs corruptione ortæ difficultates.

THEOPHRASTI nimirum ubique textus corruptissimus; et, si codices MSS. litteris confluentibus ex-

aratos, et vocum compendiis ubique scatentes, inspicias, minime mirum videbitur rem ita se habere; præsertim si scientiæ Botanicæ ignaros omnino fuisse eorum exscriptores memineris. Omnium quidem ακριβέστατος est HOMERI textus, metro quippe heroico, omnium auribus accommodato scriptus; adeo ut alienam vocem locum non suum occupare, salva soni concordia, vix possibile fuerit. At Botanico cuivis THEOPHRASTI descriptiones assidue volventi, et plantas ipsas in agris simul investiganti simile quoddam, ni fallor, eveniet: specimen ipsum sub oculis erit textus commentarium, locisque corruptis, ut plurimum, medelam suppeditabit.


Inter errores innumeros libet exemplum depromere; ubi, speciminibus cum descriptione comparatis, ex meris tenebris vera elucebit lectio. Generis Ελατη Linn. duæ enumerantur species; E. αρρήν: E. Θηλεία, l. iii. c. 10. Prior describitur “foliis magis pungentibus και επεσρωμμενοις,” (ita scriptum in cod. Basil. in aliis επεσγραμμενοις, quod nullo modo convenit foliis Pinis:); quæ descriptio apte convenit P. Abieti Linn. (“Spruce Fir” nobis,) cujus folia *coacervantur*. Vid. Tab. fig. A. Ελατη Θηλεία, e contra, folium habet ὡς πτερυγας (pinnae alae) και επ’ ελαττον (sensim sese diminuens) ὥςτε την ὅλην μορphen δολοειδη ειναι, και παρομοιον μαλιστα ταις Βοιωταις κυνεαις. (in marg. ed. Budæi legitur κυαδοις.) Locum hunc ita vertit THEODORUS: “folium pinnatum, et “ in angustias tendens, ut tota facies concamerata vi-



Pinus Abies L.



Pinus Picea L.



“deatur, similisque potissimum galeis Bœotorum ap-
 “pareat.” THEOPHRASTUM haud ita scripsisse facile
 quivis, ne dicam Botanicus, affirmabit; THEODORUM
 vero ignotum per ignotius Latine interpretari. Vox
 Tholus (Gr. Θολος) occurrit apud VARRONEM in de-
 scribendo Ornithone Turdis fervandis et faginandis
 constructo. VARR. l. iii. c. 5. “Tholus camera in-
 “terior *dense* columnata; exterioribus lapideis, inte-
 “rioribus ex Abiete tenuibus,” sc. densis adeo, ut par-
 vulæ hæ aves minime transire queant. Ex structura
 Tholi clathrato-columnata, conjicere licet Θολον quod-
 dam clathratum significare. Θολος, ceu Cella penaria,
 HOMERI Od. xxii. lignis crebris parallelis construc-
 tus videtur, quo aer facilius permeet; ficut et Θολος,
 five vaporarium in balneis. Hinc si ramulus, vel fur-
 culus extremus aliquis P. *Piceæ* L. cum foliis den-
 sissime ex opposito inspicatur, similitudo apta της
 μορφης Θολοειδους occurret. (vid. Tab. fig. B.) Quod si
 vocem κυνειας consideremus, nihil omnino cum ramo
 abietino commune habet. Substituto levi immutatione
 unius literæ vocem κτανειας. Vox κτανεια quidem ipsa
 non reperitur, sed κτενος gen. a κτεις, pecten, est notis-
 sima, Dorice κτανος; et ex inspectione ramuli Ελατης
 Σηλειας, ceu Pinus *Piceæ*, cujus iconem exhibui, Tab.
 fig. B. licet conjicere κτανεαν Βοιωτιαν dentibus utrinque
 ex adverso instructam fuisse, ut in buxeis et eburneis
 nostris, Angl. “a double-toothed comb.” Notandum
 etiam est vocem πτερυγα pinnam alæ, æque ac alam

significare; (vid. Hesych.) unde folium *alatum* superioris ævi Botanicorum, est folium *pinnatum* Linnei. Voces ἀρρήν, Θηλεία, quæ in describendis plantis frequenter apud THEOPHRASTUM occurrunt, fertilitatem vel sterilitatem, habitumve plus vel minus robustum, indicare videntur, ut et vox ἵππος plantæ nomini in compositione præfixus; et hîc loci notatu dignum est, Ελατην ἀρρένα raro ante provectiorem ætatis annum femina maturare. In aliis vero ejusdem auctoris locis distinctio hæc in Mares et Fœmineas v. g. in Palmis et Ficubus, clare indicatur. Methodum Palmas fœmineas polline masculo fœcundandi libet hîc subjicere. Γίνεται δε τουδε τον τροπον· όταν ανθῇ το Αρρέν, αποτεμνοντες την σπαθην, αφ' ἧς το ανθος, ευθυσ ὡσπερ εχει, τον τε χνουν, και το ανθος (fors. legend. του ανθους. v. χνους) και τον κονιορτον, ΚΑΤΑΣΕΙΟΥΣΙ κατα του καρπου της Θηλειας, κ'αν τουτο παθῇ, διατηρει, και ουκ αποβαλλει. l. ii. ad finem.

In Tabula Systematica secundum Linnei methodum ordinanda mendas plurimas occursuras fatis scio: veniam tamen mihi dabit Lector, utpote qui opus tantæ molis aggredi primus ausus sim; observationibus autem illorum qui plantas loco natali crescentes investigaverint, et progressu operis celeberrimi, Flor. Græcæ, ita auspicato apud nos inchoatæ, Plantarum THEOPHRASTI Catalogus, indies, ut spero, accuratior evadet.

Nuperrime mihi in manus venit opusculum, cujus

titulus “ Tentamen in historiam plantarum THEO-
“ PHRASTI, Auct. I. I. P. Moldenhawer, Hamburgi,
“ 1791. Occasionem hujus Auctoris libello, ut ipse
“ ait, præbuit exemplar editionis Aldinæ primæ, Hif-
“ toriæ Plantarum Theophrasti, et de Causis Plan-
“ tarum, variis lectionibus auctum, in Bibliotheca
“ Regia Havniæ, una cum manuscriptis Alberti Fa-
“ bricii. In eo nempe cum occupatus fuerit, ut
“ utrumque opus commentario, notisque criticis il-
“ lustratum ederet, *summo Theophrasti acumine per-*
“ *culsus, et plura illum, quam vulgo opinantur, vidisse*
“ *perspiciens*, Tentamen hoc, ut specimen hujus insti-
“ tuti peritis tradit, ut illorum suffultus judicio ratio-
“ nem operis moderaretur.” Quatuor tantummodo
primi libri *περι φυτων* capitula ibi prelo mandantur; ad-
ditis emendationibus textûs, investigationibus planta-
rum quæ in his continentur, et quæ de partibus
plantarum, et de earum interna structura perspecta
habuit THEOPHRASTUS. Apud nos etiam miscellaneo
opere tractatûs varios Historiæ Naturalis continente
cel. vir GUL. FALCONER, M. D. plantas Theo-
phraستي et Dioscoridis, aliorumque scriptorum apud
Græcos, additis Bauhini et Linnei synonymis, edi-
dit, Cantabrigiæ, A. D. 1793. Ob variam sane Cl.
scriptoris doctrinam, et inprimis summam Græcæ lin-
guæ peritiam, “ Tabulam Plantarum in priscis Scrip-
“ toribus Græcis maxime repertarum,” cuivis Naturæ
inquisitori operæ pretium erit studiose perpendere;

non tamen hujus instituti est discrepantia nomina plantarum Theophrasti et Dioscoridis, aliorumque in concordiam redigere, sed tantummodo ex descriptionibus suis in unum collatis Tabulam systematicam Plantarum THEOPHRASTI Lectori exhibere.

Non autem tanquam Auctor systematicus, uti recte admonet LINNEUS, contemplandus est THEOPHRASTUS, etsi inter Physicos vix magistro ejus Aristoteli sit posthabendus. Comparatione scilicet (l. i. c. i. *περί φυτῶν*) instituta inter animalia et vegetabilia, *τὰ μέρη, τὰ παθή, τοὺς βίους, τὰς γενεάς*, amborum sedulo definit. Vires medicas etiam, et varias culturæ methodos incredibili fide ac cura persequitur, ut magis rem quotidiani usûs legere videamur quam longinqua vetustate abditam. Cujus rei exempla pauca liceat hoc loco proferre: 1. Methodum uvas sine acinis producendi. 2. Infita ex duobus Vitis, *Viniferæ* L. varietatibus in unum conjungendi, ut albæ et nigræ in eodem racemo inveniantur uvæ. 3. Luxuriam nimiam, fisso stipite, *calculo interposito* reprimendi. 4. Amygdalorum sterilitatem, ope fistulæ ferreæ in truncum circumactæ, quo succus nimius effluat, corrigendi. 5. In quamplurimis fructiferis arboribus corticem auferendo, vel circumscindendo: optime enim noverat vir acutissimus, quod quidem sæpius diserte monuit, fertilitatem ex debilitate, sterilitatem ex robore provenire.

**CATALOGUS ALPHABETICUS
PLANTARUM THEOPHRASTI,**

DESCRIPTIONIBUS SINGULARUM

IN UNUM COLLECTIS,

ET

IN GENERA ET SPECIES,

JUXTA

SYSTEMA LINNEI,

QUOAD FIERI POTUIT, DISPOSITIS.

PLANTARUM THEOPHRASTI

CATALOGUS ALPHABETICUS

DESCRIPTIONIBUS SINGULARIUM

IN LINNÆ COLLECTIS

ET

IN GENERA ET SPECIES

JUXTA

SYSTEMA LINNÆ

ET QUADAM RITI POTUIT DISPOSITIS

CATALOGUS ALPHABETICUS PLANTARUM THEOPHRASTI.

A.

ABPOTONON. *Syngen*^a.

Una cum Ruta, Origano, &c. ut sempervirens, i. 15. caulis lignosus, foliis parvis, vi. 1. ex radice vel furculis propagatur, rarius ex semine; planta frigoris impatiens; radices lignosæ, profunde in terram agentes, vi. 7.

ΑΓΝΟΣ. *Didynam*.

Cultura et tempore ad arboris magnitudinem accedit, i. 5. cum Paliuro et Hedera enumeratur, ibid. flores superi, *Bot.* ut Pyri, Punicæ, i. 22. fructificatio in summitatibus, i. 23.

ΑΓΡΩΣΤΙΣ. *Triandr*.

Culmus nodosus, i. 10. radix nodosa, repens; ad nodos radículas et stolones emittens; cum Cypero enumeratur inter paludosos, iv. 11. Sæpius non occurrit.

ΑΓΧΟΥΣΑ. *Pentandr*.

Genus herbaceum, (πωδης,) vii. 9. foliis radicalibus, caule nudo; cum Plantagine et Anthemio enumeratur; radix rubra, ib.

ΑΔΙΑΝΤΟΝ. *Cryptog*.

Folia hyemem durant, nullo certo germinandi tempore, vii. 10.

^a Vide Tabulam Systematicam.

folia humorem repellunt, unde nomen, vii. 13. duæ species numerantur, 1. A. λευκον, 2. A. μελαν, cujus usus ad capillos nutriendos, succo oleo mixto, ib.

ΑΕΙΖΩΝ.

Dodecand.

Foliis carnosiss, (σαρκοφυλλον,) i. 16. folium viride et succulentum, etiam in locis aridis; folia succulenta, lævia, oblonga, vii. 14. Habitat in arvis, in fummis murorum, et super figulas.

ΑΙΓΕΙΡΟΣ.

Polygam.

Cortex carnosus, i. 8. species peculiaris ex insula Creta memoratur, ii. 3. in pratis abundat, iii. 4. antiquitus arbor sterilis vocata; in Creta fructifera, iii. 5. arbor præcox, iii. 6. juxta aquas crescit, και ευαυξης εστι, "is of quick growth," iii. 7. species unica datur, arbor procera, iii. 14. βραχυβιος, "short lived," iv. 14.

1. ΑΙΓΙΑΩΨ—δρυς.

Monæc.

Species hæc glandem maxime amaram fert; habitat in M. Ida; arbor omnium procerrima, cortice maxime omnium lævi, ligno solidissimo; raro in agris cultis, iii. 9.

2. ΑΙΓΙΑΩΨ—gramen.

Polygam.

Semina annis successivis proveniunt, vii. 12. folia pubescentia et nitentia vere, viii. 7. inter segetes hordei frequentissime, viii. 8. terram maxime exhaurit. Radicibus et caulibus numerosissimis, viii. 9. semen non germinat, nisi cito fatum; nec occultari terra amat, sed inter gramina germinat; arenosa amat et culta, viii. 11.

ΑΙΜΑΔΩΡΟΝ.

Didyn.

Spec. parasitica; nasc. ex radice Cumini, caule unico simplici; capite amplo, obtuso; radice orbiculari, viii. 8. semel occurrit.

ΑΙΡΑ,

Triandr.

Caulis tegumen simplex sine tunicis, (μονολοπος,) i. 8. semen noxium, capitis dolorem inducens, viii. 5. sterilitatem inducit agris, viii. 9. folia angusta, pubescentia, Bot. (δασεα) nitentia præcipue tempore verno, viii. 7. Triticum et Hordeum dicuntur degenerare in αιραν cultûs negligentia.

1. AKANΘA. *Syngen.*

Gummifera; gummi Illyrico, odore et colore, fimilis. Hab. reg. Aria dict. iv. 5.

2. AKANΘA—ΑΦΥΛΛΟΣ. *Syngen.*

Μία ακανθα εφ' ἑκάστῳ τῶν ὀζων, spec. ignota, cujus succus expressus oculis perniciosus, iv. 5.

3. AKANΘA ΔΙΨΑΣ. *Syngen.*

Desc. nulla. Hab. in arenosis Arabiae prope mare Rubrum, iv. 8.

4. AKANΘH INΔIKH. *Syngen.*

(Id. q. Ακανθη gummifera, iv. 5.) quæ vocatur Ατρακτυλις. (vid. vi. 3, 4.) ix. 1, cujus gummi, coloris sanguinei.

5. AKANΘA KEANΩΘΟΣ. *Syngen.*

Vid. Κεανωθος.

6. AKANΘA ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΟΖΟΣ. *Syngen.*7. AKANΘA 'ΗΡΑΚΛΕΙΑ. *Syngen.*

Ex hujus caule baculi fiunt; caulis fucco plenus, spec. ignota, iv. 5.

8. AKANΘA ΧΑΛΚΕΙΟΣ. *Syngen.*

Ita dicta ex colore floris; semel occurrit, vi. 3.

AKANΘΟΣ. *Polygam.*

Hab. in arvis, non in montibus, Macedoniæ, iii. 4. spinosa per totum; magn. ampla, lignum utile. Species duæ; 1. A. albus; 2. A. ater. 1^{ma}. ligno molli, ευστηπτῶ, “quickly decaying.” 2^{da}. lig. duro, αστηπτῶ; loti ligno simili; fructu lobato, coriariis utili; flore specioso in fertis usitato, arbor gummosa, sylvam cæduam formans. Hab. Thebaide, iv. 3.

AKAPNA. }

AKOPNA. }

Syngen.

Foliis spinosis, i. 16. pl. herbosa, et inter spinosas cum carduis

enumeratur, vi. 3. Cnico affinis fativo? (ἡμερω) colore subflavo, et foliis nitentibus, (λιπαροίς.)

AKONITON.*Polyand.*

Folio Cichorii, radice tuberculata, bulbis nuciformibus, venenosis; ceteræ partes innoxiae: habitat in Ακοναίς, pago quodam Mariandunorum, unde nomen, ix. 16. N. B. Textus forsan corruptus; ακονη enim cos; εν ακοναίς (locis saxosis) pagi, &c.

AKOPOΣ.*Hexandr.*

Flos infidet semini, semel occurrit sine descriptione, cum Cnico, i. 22.

AKTH.**AKTEOΣ.***Pentand.*

Lignum tortuosum, (λοξον) i. 8. sine medulla secundum quosdam, i. 9. secundum alios medulla carnosæ, ib. lignum enode, i. 13. in udis crescit, et in umbra; lignum laxum, leve, medulla tenera in junioribus, parte interna cava in adultis; unde ex levitate baculi fiunt, radices superficiales paucæ, folia περι ένα μισχον, (pinnata,) παχυ, ινωδες, (pedunculo crasso, strigoso,) τα μεν ενθεν, τα δ' ενθεν, (opposita,) κατα γονυ και συζυγίαν, (ad nodos et juncturas,) εχοντα δ' εν, (φυλλον) επ' ακρον, (terminata folio impari Bot.) ανθος λευκον εκ μικρων λευκων πολλων, (umbella alba, ex flosculis albis numerosis,) επι μισχου σχισει, κηριωδες, (ad divisuram pedunculi formam exhibens favi, sc. cavitatibus florum in plano, vid. Κηριωδης Lex. Theophr.) odor liliaceus; bacca lentis magnitudine, immatura, purpuro-rubra, (ομφακωδης) matura, nigra, iii. 13. Sambuci desc. accuratissima. Lign. solidum album, iv. 4.

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΑ ΔΑΦΝΗ.*Diœcia.*

Fructum fert super folium, ex rachi, vel vena intermedia; eodem modo ac Κεντρομυρρίνη, (Ruscus aculeatus,) ambo enim Rusci L. species, iii. 17.

ΑΛΘΑΙΑ.*Monadelph.*

Ab aliis Malva fylvestris; hab. Arcadia, Macedonia; planta medicinalis, ix. 15. foliis Malvæ, sed majoribus, et magis pubescen-

tibus; caules etiam pubescentes; flore luteo; fructu Malvæ; radice fibrosa alba: succus gustu similis caulis Malvæ; usus adv. hernias, et morbos pulmonum, et ulcera externa, oleo mixtus, ix. 19.

ΑΛΙΜΟΝ το.

Polygam.

Sp. Salicorniæ, ex qua sal Kali, "Barilla" dict. ex Europa Australi; plantas alias necat ex abundantia salis muriæ in succo, iv. 20. de C. Pl. v. εν ἀλμωδεσι φυεται. de Caus. Pl. vi.

ΑΛΙΦΛΟΙΟΣ. Vid. Δρυς. *Monæc.*

ΑΛΩΠΕΚΟΥΡΟΣ.

Triandr.

Spec. σταχυωδης, μαλακος, χνόωδεςερος (vid. Ξνυς) ὁμοίος τῶν Αλωπεκων βραις. Descriptio hæc satis convenit graminei Alopecuro Linn. item ἡ ανθησις χνόωδης (flores apetalis Bot.) καθαπερ τε Σιτς, vii. 10. N. B. Textus hic corruptus valde: nec satis liquet quare Αλωπεκούρος cum Στελεφερῳ (Plantagine L.) et Θρυαλλιδι (Verbasci L.) ut planta affinis et Σταχυωδης enumeratur. De significatione voc. σελεφερός, vid. Lex. Theoph. Σταχυς Θρυαλλιδος (Thyrsum Botanicorum) ουκ οξύς, ουδε αθερωδης (barbatus Bot. vid. Lex.) ἀλλ' ἀπλα και μονοειδης, quibus satis distinguitur Verbasci Thyrsum a Spica graminea. N. B. In Fasc. 2^{do}. Flor. Græc. extat Spec. Phleum crinitum dict. t. 62. spica caudam vulpinam referente.

1. ΑΜΑΡΑΚΟΣ.

Didynam.

Pl. herbacea, sempervirens, i. 15. ramalis lignosis, foliis parvis, vi. 1. πολυσπερμος, fragrans, foliis mollioribus Abrotano; radice fibrosa, superficiali, vi. 7. vires aromaticæ, ix. 7.

2. ΑΜΑΡΑΚΟΣ.

Hexand.

Spec. duæ; 1. Α. φρυγιος; 2. Α. ποθος; quorum prior flore Hyacinthis simili, alter αχρους, λευκος (an οχρο-λευκος, albidus,) cujus usus ad funera ornanda, vi. 7.

1. ΑΜΠΕΛΟΣ.

Pentand.

Cortex laceratus, i. 8. medulla carnosæ, i. 9. folia ampla, i. 16. succus aquosus, i. 19. flores staminei, i. 21. flor. inferi, Bot. i. 22. furculi recentes fructum ferunt. 1. 23. Varietates occur-

runt plurimæ, i. 24. propagatur ex ramis junioribus, ii. 1. ferendo degenerat, ii. 3. var. A. καπνιος dicta, cujus racemi variegantur albo et nigro, (εκ μελανος βοτρυος λευκον, και εκ λευκου μελαν φερει) ii. 4. Hab. in Tmolo monte, et Olympo. A. μανομενα. de C. Pl. ii.

2. ΑΜΠΕΛΟΣ ΑΓΡΙΑ.

Radix Vitis sylvestr. caustica, depilatoria.

3. ΑΜΠΕΛΟΣ ΙΔΑΙΑ. *Pentandr.*

Fruticosa spec. ramulis parvis; racemis lateralibus; uvis Pisi magn. gustu suavi; acinis mollibus; foliis parvis, rotundis, indivisis, iii. 17.

4. ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΟΝΤΙΑ. *Cryptog.*

Species 2. littoralis et pelagica, sed fructus pelagici major; vesiculæ rotundæ, F. bacciferi et natantis L. pro fructu accipiebantur, cujus forma haud inepte uvam refert.

ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ. *Icosandr.*

Nux cum putamine statim enascitur, i. 18. femina oleosa, i. 19. flos petalis instructus, amplus, i. 21. fructum fert in furculis biennibus, i. 23. mos succum extrahendi ope paxilli in lignum inducti, quo fructifera evadat, ii. 3. flores prodeunt ante folia, vii. 12. arbor gummosa, ix. 1.

ΑΜΩΜΟΝ. *Monandr.*

Ex Media transfertur, item ex India; cum Cardamomo enumeratur: sed unguentum solum memoratur, ix. 6, 7.

ΑΝΑΔΕΝΔΡΑΣ. *Class. incert.*

Spec. Epidendri peculiaris. de Caus. Pl. v.

ΑΝΔΡΑΧΝΗ. *Decandr.*

Sempervirens, i. 15. montana sp. hab. Macedonia, iii. 4. duæ species enumerantur, quæ simul germinant, iii. 6. ευανξης, (cito crescit,) iii. 7. foliis Κομαρου (Arbuti), cortice lacero, et sese abiciente, (ὡς ε αποπιπτειν,) i. 8. albido, fructu Arbuti, iii. 16. lignum tornatile, et ad fusos usitatum, v. 8.

ΑΝΔΡΑΦΑΞΥΣ. }
 ΑΤΡΑΦΑΞΙΣ. } *Polygam.*

Satio post solstitium autumnale, vii. 1. semen post octo dies emergit, ib. semen latum, membrana cinctum, (φυλλωδες) vii. 3. radix fusiformis, vii. 2. Species una saltem: semina non durant, vii. 6.

ΑΝΔΡΥΑΛΙΑ. *Syngen.*

Semel inter λαχανα occurrit, quæ usibus culinariis inserviunt; inter κιχωριωδη cum Αφακη, Ὑποχοιριδι, Ηριγεροντι enumeratur, vii. 7.

1. ΑΝΕΜΩΝΗ. *Polyandr.*

Floret post primum tempus pluviale, vii. 8. Desc. nulla.

2. ΑΝΕΜΩΝΗ ΛΕΙΜΩΝΙΑ. *Hexandr.*

Spec. Narcissi sylvestris, quæ floret cum Ελειοχρυσω, Ξιφιω, Ὑακινθω, vi. 7. ανθη εαρινα. ib.

ΑΝΗΘΟΝ. }
 ΑΝΗΣΟΣ. } *Pentandr.*

Species gymnosperma, (vid. Γυμνοσπερμος Lex. Theophr.) cum Cumino, Coriandro, Fæniculo. (N. B. Non Gymnosper. Linn.) i. 18. planta fragrans, i. 19. αμαυροκαρπος, (fructus parvus latens?) ex axillaribus ramis fructum fert, ut ferula, vi. 2. seminatur bis in anno, vii. 1. Κοριαννον, Μαραθρον, Ανηθον, γυμνοσπερματα: vid. divisionem in γυμνοσπ. εμφολοιοσπ. et παπποσπερματα, vii. 3. semina inter unguentaria, ix. 7.

ΑΝΘΕΜΟΣ. }
 ΑΝΘΕΜΟΝ. } *Syngen.*
 ΑΝΘΕΜΙΟΝ. }

Flos femini infidet, i. 22. foliis radicalibus, radicem cingentibus, vii. 9. flores ad apicem primo florent: forma floris, το εν κυκλω ανθος λευκον, (radii circulares floris, albi,) το δ' εν μεσω χρυσος, (discus floris luteus, vel aureus,) vii. 13.

ΑΝΘΕΡΙΚΟΝ.

Hexandr.

Planta herbacea, quæ vel in aridis vel in uliginosis et paludibus marinis provenit, ut Scylla, i. 7. planta fistulosa, cum Conio, Fæniculo, &c. enumeratur. N. B. Distinctio fumitur illarum quæ caule sunt lævi, ut Mandragoras, Conium, Helleborus, Anthericum; et quæ caule nervoso et striato, ut Fæniculum, &c. vi. 2.

ΑΝΤΙΠΠΙΝΟΝ.

}

Class. incert.

ΑΝΤΙΠΠΙΖΟΝ.

Dicitur esse simile Aparines, ix. 21.

ΑΠΑΡΙΝΗ.

Tetrandr.

Caulis scandens, vii. 8. adhæret vestibus δια την τραχυτητα, nec facile abstrahitur; flos dicitur innasci in aspero pericarpio, inconspicuus, Bot. et in seipso fructificans, ut ovum, vii. 14. Ervi segetes infestat, viii. 8.

ΑΠΑΘΗ.

Class. incert.

Επιγειοφυλλος cum Αρνογλωσσω, vii. 9.

ΑΠΙΟΣ.

Icosandr.

Arbor mediæ magn. i. 4. folium περιφερές, in medio turgidum, P. mali L. folio rotundius, i. 16. succus, (χυλος) "the sap," aquosus, i. 19. flores πεταλωδεις, (petalis distinctis) i. 21. ex furculis biennibus vel annuis floret, i. 23. Varietates cultæ maxime differunt a sylvestribus, i. 24. ferendo degenerat, ii. 3. propagatur infitione, ii. 7. sylvestres spec. validiores, sed minus fructiferæ, iii. 3. fructum fert ex furculis extremis, et ex lateralibus, Ang. "spurs," iii. 7. optimi circa Pantacapæum, in Ponto, iv. 6. Distinctio inter Απιον et Αχραν, sylvestrem sc. et cultam, iv. 11. Sylvestris spec. minus obnoxia vermibus, iv. 16.

ΑΡΑΚΟΣ.

Diadelph.

Planta infestans segetes Ervi; herba aspera, fragilis, (σκληρος) viii. 8. N. B. Hinc forsan vox Latina eracca, nomen triviale Vi-ciæ spec. Linn.

ΑΡΑΚΟΥ ΟΜΟΙΟΣ.

Diadelph.

Cum Αραχιδνα enumeratur, i. 11. vid. Αραχιδνα.

APAXIΔNA.

Diadelph.

Fructu vel tuberculo sub terra : cum Ουιτω enumeratur, i. 1. radix simplex carnosā ; ceteris fibrosis, super quibus fructus, vel tubercula, i. 11.

APIA.

Icosandr.

Fructus maturatur hyeme ineunte, iii. 6. Dorica spec. Αρια vocata, Πρινω affinis, cujus lignum intermedium inter Πρινον et Δρυν λευκοτερον του Πρινου, οινωποτερον της Δρυος, "lighter coloured than the first, darker than the last," iii. 16. folia Πρινου : fructus vocatur Ακυλον, ib. lignum hyeme cæditur, v. 1. durum, fragile, v. 4. incorruptum, v. 5. δυσεργον, ut quercus lignum, v. 6.

ΑΡΙΣΤΟΛΟΧΙΑ.

Gynandr.

Fructus fragrans odore, etsi gustu amarus ; foliis Alfines, sed angustioribus ; radice nigra : planta medicinalis valde, ix. 13. Hab. in Arcadiæ et Laconia montibus : in Pelio, Clitoria, Tegea, &c. ix. 15. radix magna, atra, amara, sed fragrans ; foliis rotundis, radicalibus, ib.

ΑΡΚΕΤΘΟΣ.

Diæcia.

Sempervirens, i. 15. spec. montana, iii. 4. ενιαυτοφορος (fructus maturatur anno 2^{do}.) iii. 6. cito crescit, iii. 7. habitat cum Ελατη in montium lateribus, non in summis, iv. 1. lignum usitatum in ædificando cum Ελατη et Κεδρω, vi. 8.

ΑΡΝΟΓΛΩΣΣΟΝ.

Tetran.

Foliis coronam radice cingentibus : επιγειοφυλλον, vii. 9. spica floret κατα μέρος, (successive) vii. 10.

ΑΡΟΝ.

Gynandr.

Radix magna, carnosā, i. 9. simul cum Cypero, i. 10. radix lævis, mollis, sine cortice, vii. 9. radix edulis cum aceto : quo radix crescat magnitudine, circumvertunt radicem ne foliis luxurietur, et alios generet radiculos, vii. 11. folia subtus cava, et lata, vii. 12. plant. ακαυλος, vii. 12.

ΑΣΙΝΗ.

Class. incert.

Cum Έρπυλω enumeratur semel. de C. Pl. ii.

ΑΣΚΙΟΝ.*Cryptog.*

Tuberis spec. cum subterraneis Ὕδνω, Ουίπω, vel Ουιγγώ enu-
meratur, ὧν ουδενι εἰσι ῥίζα, i. 10.

ΑΣΚΛΗΠΙΑΣ.*Pentandr.*

Panaceæ species, sic dicta ab Æsculapio; radix σπιθαμιαίος,
alba, crassa, cortice valde crasso; ἀλικωδεις? (i. e. succo salino)
caulis nodosus, foliis θαψίας, sed crassioribus, ix. 12. Vid. Πα-
νακες.

ΑΣΠΑΛΑΘΟΣ.*Class. incert.*

Inter odoriferas, ix. 8.

ΑΣΠΑΡΑΓΟΣ.*Hexandr.*

Planta aphylla, spinosa, i. 16. spinis solum, ut Σκορπιος,
vi. 1. floret autumnno, vi. 3. producit aliquod clavæforme, (κορυ-
νωδες,) parvum, ex quo prodit flos parvus, ib. radices profundæ
et numerosæ; stolones εκ της Ασφαραγίας, ("the Asparagus bed,")
edules; unde liquet antiquis usum plantæ notum esse, ib.

ΑΣΦΟΔΕΛΟΣ.*Hexandr.*

Foliis radicalibus, i. 16. radix glandiformis, (βαλανωδης) vii. 9.
radix edulis, vii. 11. foliis longis, angustis, nitentibus, ib. πολυκαρ-
πος; semine lignoso, triquetro, in pericarpio rotundo, infero, Bot.
dehiscente per maturitatem; floret successive; caulis supra ra-
mosus? (αποφυσεις ανωθεν εχων,) vii. 12 Vid. αποφυσεις.

ΑΤΡΑΓΕΝΗ.*Polyandr.*

Semel cum Corylo *Avellana* occurrit: lignum ad πυρείας εσχά-
ραν utile: (vide πυρεία,) v. 10.

ΑΤΡΑΚΤΥΛΙΣ.*Syngen.*

Spinis in caule et foliis, ακανοις etiam (perianthiis vel capi-
tulis spinosis) cum Κνικω, Ονοπορδω, aliisque Carduis enumera-
tur, vi. 3. λευκοτερα πασων, (foliis magis canis,) succus fan-
guineus: vocatur Ακανθα φονος: odor gravis; fero floret, vii. 4.
succus sanguineus, ix. 1.

1. ΑΦΑΚΗ.*Diadelph.*

Οψισπερμος, viii. 1. legumen latum, viii. 5. cito germinat,
viii. 10.

2. ΑΦΑΚΗ. }
ΑΠΑΘΗ. }

Syngen.

Planta *κίχωριωδης*; floret successive, vii. 10. spec. amara et in-
dulis; cito senescit et in pappum abit; flos pallide luteus, vii. 11.
germinat *πρωτοις υετοις*, vii. 8. floret per totam æstatem, vii. 11.

ΑΦΑΡΚΗ.

Pentandr.

Sempervirens, i. 15. hab. in montibus Macedoniae, iii. 4.
spec. sylvestris et culta germinant simul, iii. 6. lignum utile ad
vallos et fudes, v. 8.

ΑΦΙΑ.

Class. incert.

Planta *κίχωριωδης*, quæ semel memoratur, vii. 8. floret statim
cum prima germinatione. N. B. Forſan error textûs pro *Αγία*.

ΑΧΡΑΣ.

Ifocandr.

Καλλικαρποτερος Απιου, i. 7. differt max. a culta spec. i. 24.
hab. in planis, iii. 4. floret post cultam, iii. 6. *ευαυξης*, (cito
crescit,) iii. 7. maxima inter *Αχραν* et *Απιον* differentia, iv. 14.

ΑΧΥΝΩΨ.

Incertum.

(Baf. *χινωψ*,) cum *Αρνογλωσσω*, *Στελεφουρω* floribus spicatis,
cylindricis. vii. 10. N. B. Censeo legendum *Εχινωψ*, vel forſan
Κυνωψ, spec. flore ringenti. Bot. Vid. vii. 8.

ΑΨΙΝΘΙΟΝ.

Syngen.

Succus amarus ut Centaurium, i. 19. inter odoriferas quæ
frigora amant, iv. 6. folia amara, sed utilia, vii. 9.

B.

ΒΑΛΑΝΟΣ ἡ.

Class. incert.

Nux in cortice coriaceo, i. 17. gustu dulci, melleo, i. 19. arbor
ita vocata ex fructu glandiformi, iv. 2. Hab. Ægypto; folio Myrti
vel angustiore; arbor satis ampla, ramis tortuosis. Unguentarii nu-
cibus et pericarpis simul utuntur, ambo enim odoriferæ: nux
forma et magnitudine similis *Καππαριος*, lignum navibus fru-
endis utile, iv. 2.

ΒΑΣΑΜΟΝ.

Class. incert.

Gummi sponte fluit ut lachryma, ix. 1. excisione apud Syros colligitur, ix. 2. Habit. εν αυλωνι της Συριας, (inter Libanon et Antilibanon,) arbor magnitudine Punicæ L. ramosissima, foliis rutaceis, sed magis incanis; sempervirens; fructu simili Τερεβινθου. Gummi hujus arboris omnium pretiosissimum abraditur a cortice ονυξι σιδηροις, (instrumentis unguiformibus) sæpe adulteratur, ix. 6. inter aromatica recensetur, ix. 7.

ΒΑΤΟΣ ἡ.

Ifocandr.

Cum Paliuro, ut frutex, i. 4. cum eodem ut frutex spinosus, i. 8. caules spinosi, i. 16. sempervirens, cum Paliuro, iii. 17. genera plura: 1. erecta; 2. repens, cujus ramuli όταν συναπτωσι τη γη ῥιζονται παλιν. (N. B. Species hæc vocatur optime, Χαμαιβατος) 3. Κυνοσβατος fructu rubro simili rosæ, sc. Rosa canina L. folio Viticis, agni casti L. iii. 18. spec. λοχμωδης vocatur ἡ Βατος, cum Παλιουρω, ut in paludibus et aquosis crescens, iv. 9. ib. iv. 13. πτορθακανθος, ramis spinosis, vi. 1. N. B. Βατος ὁ an sp. diversa, de Caul. Pl. 1.?

ΒΛΗΚΩΣ.

Didynam.

Id. q. Γληχων, Mentha pulegium Linn.? semel occurrit, ix. 16. ubi Dictamni folia τη Βληχοι comparatur.

ΒΑΙΤΟΝ.

Polygam.

Ακροκαρπον, και πλαγιοκαρπον, una cum Ανδραφαξει et Παφανω, i. 23. feritur mense Martio, vii. 1. radices agit fibrosas, vii. 2. radices lignescunt, vii. 3. semina membrana obvoluta (εμφλοιοσπερματα) vel cortice tecta? ib. Genus simplex, vii. 4.

ΒΟΛΒΟΚΩΔΙΟΝ.

Hexandr.

Vocatur βολβου κωδιον duobus verbis: florens post Narcissum; nec sæpius memoratur, vi. 7.

1. ΒΟΛΒΟΣ.

Class. incert.

Radix cortice tecta et tunicata; cum Scylla, et Allio cepsa L. i. 10. folia sine pediculo, (αμισχα) i. 16. propagatur ex bulbis, vii. 2. radix tunicata, (λεπυρωδης) vii. 9. folia linearia, παντελωσσενα, (per totum angusta.) Spec. hæc εχει καυλον του ανθους μονον, (i. e. scapum Bot.) vii. 12.

2. ΒΟΛΒΟΣ ΕΠΙΟΦΟΡΟΣ. *Class. incert.*

Γενος ιδιωτατον, (maxime peculiare,) hab. in arenosis maris; pars lanosa sub primis tunicis; pars interior edulis, in Taurico Chersoneso, vii. 13. lana, gossipina, non sericea, ib. N. B. Hyacinthi Peruviani mentio fit sub nomine Bulbi eriophori. Act. Soc. Horticult. Lond. v. 1. p. 47.

ΒΟΛΒΙΝΗ. *Hexandr.*

Simul occurrit cap. eodem, vii. 13. dicitur infestare fegetes; an bulbus Hyacinthi *Botryoidis* L.?

ΒΟΥΚΕΡΑΣ. *Gynandr.*

Nihil æque aridum, recenti statu, viii. 8.

ΒΟΥΜΕΛΙΑ. *Diandr.*

Arbor excelsa, cortice lævi; hab. Macedonia in planis, iii. 11. in Ægypto abundant Μελια et Βουμελια, iv. 9. in aquosis, ib. non occurrit in Græcia. Vid. Fl. Græc. Fasc. 1^{mum}.

ΒΟΥΠΡΗΣΤΙΣ. *Class. incert.*

Planta cichoracea, cum Aphaca et Κυνωπι, germinans cum pluviis primis, vii. 8.

ΒΟΥΤΟΜΟΣ. *Monæc.*

Caulis εχων ὀμαλωτητα ιδιαν, (lævitatem singularem,) vid. Ὀμαλος. Nervo acuto folium transcurrente, γωνιοφυλλος, vid. γωνια, i. 16. inter fluviatiles, iv. 9. fructus ater, similis fructui Σιδης pl. masculina inutilis; pl. fœmina πλοκαμοις utilis, iv. 11.

ΒΡΟΜΟΣ. *Triandr.*

Fructus, i. e. spica, omnium maxime paleacea, (πολυλοπος,) viii. 4. ὁμοιοπυρος, (i. e. tritici affinis habitu) terram exhaurit maxime post Ζειαν, πολυκαλαμος ων, και πολυρριζος.

Γ.

ΓΑΛΒΑΝΟΝ. *Pentandr.*

Aliis Χαλβανον: gummi solum occurrit, ix, 1. Planta forsitan γαλβανος?

ΓΗΘΥΟΝ.

ΓΗΤΕΙΟΝ.

ΚΡΟΜΜΥΟΓΗΤΕΙΟΝ.

Hexandr.

Κοιλοφυλλον, (folio cavo intus,) i. 16. anno secundo maturat fructum, vii. 1. 2^{da}. satio mens. Munychione. ἀκεφαλον, και ὡσπερ αυχενι μακρω? sæpius secatur, (Porrū *sectile* L.) propagatur ex radice, vii. 4. amat loca irrigua, vii. 5. ου μεταφύεται, ib. semen minime durat, vii. 6.

ΓΛΕΙΝΟΣ. Syn. Ζυγίας. Vid. iii. 4.

ΓΛΗΚΩΝ.

Didynam.

Inter λαχανα fine descr. utpote notissima enumeratur; Φιλοκοπρα vocatur, et multo melius transplantatione provenit. N.B. Semel occurrit, et ibi apud Aldum Γλισχος legitur, sed male. vii. 5. Vid. Βληχως.

ΓΛΥΚΥΣΙΔΗ.

Polyandr.

Παιωνια ab aliis vocata, ix. 9. Vid. Παιωνια.

ΓΟΓΓΥΛΙΣ.

Tetradyn.

Radix carnosā, i. 9. corticata, i. 10. feritur cum primis pluviis, vii. 1. radix magna, bulbosa; cortex avulsu facilis, vii. 2. πλαγιοκαρπος, (opp. ακροκαρπω, cujus fructus in apicibus,) vii. 3. duæ sp. masc. et fœm. vii. 4. non transplantatur, vii. 5. bulbosus corticatus, vii. 9.

Δ.

ΔΑΥΚΟΝ ΔΑΦΝΟΕΙΔΕΣ. *Class. incert.*

Pl. pharmaceutica, succus solum describitur, crocei coloris, xi. 15. Δαυκον an spec. eadem? Hab. Arcadia juxta Laconiam, singularis species radicem habens nigram, succo δερμαντικῷ διαφεροντως, (omnium calidissimo) ix. 22. cum Πευκεδανῷ jungitur.

1. ΔΑΦΝΗ.

Enneandr.

Λεπτοφλοιος, i. 8. radice ανωμαλει, (an scabra, an inæqualis

magnitudine? vid. ὁμαλος) i. 9. Arbor ανοζος, (enodis,) cum Συκη, Ακτη, i. 13. sempervirens, i. 15. iii. 4. baccæ oleosæ, i. 19. species plurimæ, i. 24. pullulat cum zephyris, iii. 6. baccæ in racemo, iii. 8. Hab. in Olympo M. iv. 6. Inimica Viti; iv. 20. Baculi fenibus ex illa fiebant ob levitatem, v. 8. usus ad τρυπανον πυρειας, (vid. Lex. Theoph.) v. 10.

2. ΔΑΦΝΗ ΑΓΡΙΑ. *Enneandr.*?

Semel occurrit inter sempervirentes. An spec. peculiaris? i. 15.

3. ΔΑΦΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. *Diæcia.*

(Vid. Κεντρομυρρίνη) επιφυλλοκαρπος; fructificatio super folium, i. 16. Hab. M. Ida, iii. 17.

4. ΔΑΦΝΗ ΠΟΝΤΙΑ. *Corallina.*

iv. 8.

1. ΔΙΚΤΑΜΝΟΣ. *Didyn.*

Foliis Βληχου, (vid. supra) ramulis gracilioribus? succus gustu Menth. *Pulegii* L. similis? Vires ad partus utilissimæ; folia solummodo in usu, succus sc. expressus et aqua mixtus. Hab. Creta, ix. 16.

2. ΨΕΤΔΟΔΙΚΤΑΜΝΟΣ foliis fimilibus, ramis minoribus. Vires inferiores, ib.

ΔΙΟΣ ΑΝΘΟΣ. *Decandr.*

Planta ποωδης, (herbacea,) sed caulis lignescens, μικροφυλλος, vi. 1. in fertis usitata, ib. ανοσμος, vi. 6. sero æstate floret, vii. 7.

ΔΙΟΣ ΒΑΛΑΝΟΣ. *Monæc.*

Non eget cultura respectu fructûs, iii. 3. Hab. in montibus Macedoniæ, iii. 4. Ambigebatur olim de flore masculo, vel ιουλω, (amento, *Bot.*) iii. 6. germinat initio veris, ib. καχυωδης, *Juliferus*, *Bot.* (καχυς id. quod ιουλος,) iii. 7. Hab. M. Tmolo et Olympo, iv. 6.

ΔΟΛΙΧΟΣ. *Diadelph.*

Arbores scandit, viii. 3. femina cito germinant, viii. 10.

ΔΟΝΑΞ.

Triandr.

Spec. omnium maxime communis: λοχμωδης, i. e. fruticosus, (vid. Λοχμος,) iv. 12.

ΔΡΥΣ.

Monæc.

Τραχυφλοιος, (cortice scabro,) i. 8. ακρορρίζα, (radice superficiali,) βαθυρρίζα, (unica profunda fusiformi,) i. 9. οζωδης, (nodosa arbor,) item κραδαις obnoxia, (vid. Κραδη,) i. 13. foliis εντομας εχουσι, (lobatis Bot.) i. 16. Hab. in planis Macedoniæ, iii. 4. Amentum βρυον vocatur, iii. 6. item καχρυς, iii. 7. primo vere apparens, ib. Species variæ, iii. 9.

1. δ. ήμερις.

4. δ. φηγος.

2. δ. αιγιλωψ.

5. δ. αλιφλοιος.

3. δ. πλατυφυλλος.

6. δ. φελλος. vid. φελλος.

1. Sp. parva, humilis, ramosissima, sine trunco; ramis inflexis, iii. 9.

2. Sp. maxime procera et recta, cortice lævi, ligno ισχυρω, (solido,) in incultis crescens, ib.

3. Sp. inter primam et secundam proceritate et magnitudine; ligno ad usus architectonicos minus utili; ad carbones et igniaria prorsus inutili, utpote laxo et poroso, ib.

4. Sp. ουκ ορθοφυης, (fruticosa species,) ligno firmissimo, incorrupto, ramis numerosis; ή φυτεια περικομος, (capite rotundo, vel valde folioso,) ib.

5. Sp. trunco craffo, brevi, sæpius intus cavo; ligno minus utili; sine corde.

6. Sp. trunco erecto; cortice duplici. Quercus Suber L.

N. B. Gallæ 1mæ. spec. solum εις δερματα (ad usus coriarios) utiles. Spec. 2^{da}. fert Lichenem Φασκον dictum. (vid. Φασκος.) Species hæc hab. in Ponto, iv. 6. lignum σκληρον και βαρυ, v. 5. sub aqua dulci durat; falsa tamen σιηπεται, ib. Carbones optimi ad usum argentariorum. Divisiones Quercûs alibi, iii. 9, 10. sic notantur:

1. ετυμοδρυς, gl. dulci.

2. πλατυφυλλος gl. amara.

3. φηγος gl. rotunda.

4. οσπρις gl. rara, ineduli.

ΔΡΑΚΟΝΤΙΟΝ. *Gynandr.*

Caule variegato, ut serpentis maculæ; radix bona ad βηχας, (tusses,) ix. 22.

E.**ΕΒΕΝΟΣ ἡ.** *Diadelph.*

Lignum ponderosum; enumeratur cum ligno Buxeo, i. 8. durities extrema, ut Loti, i. 10. Hab. India. Spec. duæ: prima; arbor speciosa, ligno utili, quæ rara est: secunda fruticosa, inutilis, iv. 5. lignum solidissimum, in aqua subfidens: gravitatis lignorum hi notantur gradus. 1. Εξενος, πυξος. 2. Λωτος. 3. Μελανδρυνον (Heart of Oak.) 4. Κυτισος (Cyt. Laburnum.) 5. Τερμινθος, v. 4. Lignum ασαπες, (sine succo,) v. 5. Usus ad morbos oculorum statu arido, ακονη τριβομενον, (ope cotis attritum,) ix. 22.

ΕΛΑΙΑ. *Diandr.*

Lign. αδραυσον, (tenax, Angl. "tough,") i. 8. sine corde; secundum alios, totum cor, i. 9. radicibus scabris? nodosis et δυσανωδεσι, (fasciculis fibrarum ad nodos, vid. δυσανοι,) ib. arbor nodosa, spec. sylvestris tamen (Κοτινος dicta) nodosior Ελαια, in trunco innascitur γογγρος, (vid. γογγρος,) i. 13. sempervirens, i. 15. σρεφονται τα ὑπτια (partes superiores foliorum) μετα τροπας σερινας, (i. e. "the upper parts of the leaves turn up;") folia incana, angusta, pediculo brevi, i. 16. fructus carnosus, i. 17. oleosus, i. 19. flos πεταλωδης, (petalis distinctis Bot.) i. 21. fructus ex furculis anni prioris; differentia maxima inter sylvestrem et cultam, (Κοτινον et Ελαιαν,) i. 23. infitione propagatur, ii. 7. Κοτινος validior Ελαια, iii. 3. maxime abundat in Libya, Cyrenæa, iv. 3. spec. intermedia, sterilis in India, iv. 5. Arbor celebris Athenis, iv. 14. maxime vivax, iv. 15. Cultura fit καλλιω, iv. 19. lignum solidum album, v. 4. optimum juxta radices, v. 5. amat maris littus, vi. 2.

ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ. *Diæcia.*

Fruticosa sp. Αγνω vel Vitici agno casto L. similis, foliis Μηλεας,

fed mollibus; floribus apetalis, ut Populi; καρπῶ οὐδενί. Hab. in palude juxta Lacum Orchomenis, iv. 11.

1. ΕΛΑΤΗ.

Monœcia.

Nunquam culta, i. 6. Procera spec. cortex πολυλοπος, (vid. λοπος,) i. 8. cor, vel medulla lignea, ολιγορρίζα vel μονορρίζα· απα-
ραβλασος, (non emittens furculos,) i. 9. mares nodosiores fœmi-
nis; πενταοζος, (ramulis horizontalibus 4. uno erecto.) N. B. οζοι
tumores ad basin ramorum, qui apte dicuntur εμπεπηγοτες, i. 13.
μονοσελεχης, (trunco simplici,) i. 14. sempervirens, i. 15. foliis
ακανθωδεσιν εξ ακρου, (apice pungentibus,) i. 16. arbor picea,
i. 19. ανθει κοκκινω, vel forsan legendum κροκινω, ut apud quos-
dam, (amentis croceo *Bot.*) i. 21. propagatur femine solum, ii. 2.
iii. 1. Hab. in M. Macedonia, iii. 4. floret vere, iii. 6. germi-
natio conspicua δια το στοιχειν τα γονατα, και εξ ισου τους οζους
εχειν; (de modo crescendi regulari; angulos enim rectos cum
trunco faciunt, nodis 4 invicem oppositis, pari intervallo,) iii.
6, 7. καχυρας εχει, (Iulum fert,) βαθυρριζος, iii. 7. nunquam
pullulat post cæsuram, iii. 8. Genera 2: 1. E. αρρήν. 2. E. δε-
λεια. 1. Pin. *Abies* L. 2. P. *Picea*, (vid. Præfat.) εν κωνω του αρρε-
νος, καρνα (femina) ολιγα επ' ακρον· ξυλον ινωδες κουφον· οζοι
σκληροτατοι, iii. 10. amant umbrosa, iv. 1. decacuminatione mo-
riuntur, iv. 19. decorticandæ vere, ut lignum diutius duret, v. 1.
lignum fibrosum, ασαρκον, βαρυ, αδαδον (non inflammabile;
opp. ligno πευκης,) οζοι κερατωδεις, (duri instar cornu;) trunci ju-
niorum ad κεραιας (antennas) navium, v. 2. lignum proprium ad
onera sustentanda vi elastica, v. 7. etiam ad usus navales ex levi-
tate; et ad ædificandum, v. 8. refina δακρυωδης (in guttis) ex
vulnere stillat, ix. 1.

2. ΕΛΑΤΗ ΠΟΝΤΙΑ. *Cryptog.*

Spec. προσγειος, (in æstuariis, aut prope littus,) φυεται επι λιθοις
και οσρακοις· ὅλη μορφη ορθη, (habitus totus erectus,) summita-
tibus etiam erectis, iv. 7.

ΕΛΕΒΟΡΟΣ.

ΕΛΛΕΒΟΡΟΣ.

Polyandr.

Amat loca frigida, iv. 6. pl. ναρθηκωδης, (caule fistuloso,) cum

Conio, Fæniculo, &c. vi. 2. odor radices gravis stomacho etiam in effodiendo, qua de causa Cepam prius comedunt, ix. 9. Spec. duæ: 1. E. μελας. 2. E. λευκος, quæ vel colore radicum vel foliorum differunt. Sp. prioris fol. δαφνωδη, “dark green;” posterioris πρασωδη, “light or grass green?” foliis *profunde incisis*; caule ανθερικωδει, (vid. ανθερικος,) brevissimo, ex corona radices: επιγειοφυλλος, (fol. radicalibus,) radicibus plurimis λεπταις; in quibus vis narcotica. Sp. 1. E. μελας, communis. 2. E. λευκος, rara: maxime in M. Oeta, Ponto, Elea, Maffalia; in vineis. Crescit item in M. Parnasso et in Ætolia, sed vires deteriores, ix. 11, 15.

ΕΛΕΒΟΡΙΝΗ. *Gynandr.*

Ποαριον, (parvula species, herbosa,) foliis minimis; semen una cum succo Hellebori in usu ὅπως ευεμεση, (ut vomitum sine dolore ciat,) vii. 6. Nulla descr.

ΕΛΕΙΟΣΕΛΙΝΟΝ. *Pentandr.*

Tres Σελινου species apud Theophr. l. vii. 6. Ελειοσελινον, Ἰπποσελινον, Ορεοσελινον, (vid.) Spec. hæc hab. in rivulis, vel ductibus aquæ, μανοφυλλος, (foliis raris,) Σελινου similis odore, succo, habitu, vii. 6. Semel occurrit.

ΕΛΕΙΟΧΡΥΣΟΣ. *Class. incert.*

Pl. coronaria, cum Cœnanthe, Anemone, &c. æstate media florens, vi. 7. foliis tenuibus albidis; flore aureo; semine tenui, duro, (σκληρω,) radicibus horizontalibus. Planta boni ominis apud antiquos, ix. 21.

ΕΛΕΛΙΣΦΑΚΟΣ. *Diandr.*

Πωδης, (pl. herbacea,) inter non spinosas, quas difficile est distinguere, cum Origano, Thymbro, Cisto, &c. ponuntur Σφακος, Ελελισφακος, vi. 1. Σφακος vel Σφακελος species culta; Ελελισφακος spec. sylvestris, foliis magis scabris; odore graviori. (vid. Σφακος, Σφακελος,) vi. 2.

ΕΛΕΝΙΟΝ. *Class. incert.*

Φρυγανον ξυλωδης, caule lignescente, foliis parvis, cum Sisym-

brio, Abrotano, et multis aliis, vi. 1. flore et foliis fragrantibus, ἄπλος τοῖς εἶδεσιν, (nullæ occurrunt varietates?) vi. 6. Semina aiunt nunquam maturari Ελενίου, Ἐρπυλλοῦ, Σισυμβρίου, Μινθου, sed furculis plantas propagari, falso tamen, quia semen parvitate sua latet, vi. 7. radicibus multis, divaricatis, ταρρώδεσι, (implicatis corbis modo, vid. ταρρός) lignosis, ib.

1. ἙΛΙΞ.

Pentandr.

Περιολλοκαυλός, (planta scandens,) δαμνωδής, cum Smilace occurrit, sine descriptione; videtur Hederæ varietas, vii. 8.

2. ἙΛΙΞ.

Pentandr.

Κιττου (Hederæ) tertia species; varietates maximæ occurrunt respectu magn. foliorum et formæ angulosæ: ἑλικός folia magis angulosa, et foliis του Κιττου similia; fructus rarus. Var. tres: 1. foliis læte viridibus. 2. foliis albis vel canis. 3. foliis variegatis. N. B. Hedera dicitur αποκιττουσθαι, quando per ætatem folia minus angulosa fiunt, iii. 18.

ΕΛΥΜΟΣ.

Triandr.

Ελυμός, Κεγχρός, Σησαμόν παρ' αὐτά, (divisio separata et habitu diversa a frumentaceis et leguminosis, σιτωδεσὶ καὶ χεδροποις,) viii. 1. grana Ελυμοῦ et Κεγχροῦ maxime durant, viii. 10.

ΕΝΘΟΥΣΙΚΟΝ.

Incertum.

Semel occurrit in loco corrupto cum Caucalide et Ἡδυοσμῶ inter λαχανά inedulia, vii. 7.

ΕΠΙΜΕΝΙΔΕΙΟΣ. Vid. Σκυλλά.

ΕΠΙΠΕΤΡΟΝ.

Class. incert.

Ὅλως ἀνανθές! Flores inconspicui Bot. Semel occurrit, vii. 8.

ΕΡΕΒΙΝΘΟΣ.

Diadelph.

Leguminosus, viii. 1. οψισπορός, ib. πλαγιοκαυλός, (caule ramoso,) viii. 3. legumen rotundum, viii. 5. prominens hilum Bot. ex femine, ut in Vicia, Faba L. ib. Spec. tres: 1. E. μέλας. 2. E. λευκός. 3. E. πυρρός, quorum posterior sero ferendus; in udis lo-

cis, viii. 6. omnium leguminosorum citissime fructum perficit, viii. 7. amat terram mollem, levem, (ψαφαρην) viii. 9. illæsus ver-
mibus ob amaritudinem, viii. 10. N. B. Species occurrit sub no-
mine Κερασβολου, ita dict. ob duritiem seminis. De Caul.
Pl. iv.

ΕΡΕΙΚΗ.*Oc Andr.*

Ακροκαρπος, (flores et semina in apicibus ramorum,) semel oc-
currit, i. 23.

ΕΡΙΝΕΟΣ.*Polygam.*

Sylvestris spec. της Συκης, i. 24. sed plane diversa, nec cultura
mutans: accuratissime, Ficus enim genus Triœcium. Mutatio
Ερινεου in Συκην dicitur portentosum esse, i. 4. Ερινεα προαπ-
τωτα, (fructus sc. mas Ερινεου) comparantur amento Quercûs,
Pinûs, &c. pullulat primo vere, iii. 6. Sexus Ερινεου et Συκης
distinguitur, iv. 14. Lignum excellens ad εργα πολυτελη, v. 7.

ΕΡΙΟΦΟΡΑ.*Monadelph.*

Foliis vitis; Pericarpium εν ω το εριον, (in quo gossypium con-
tinetur,) ήλικον μηλον εαρινον, (magnitudine mali verni,) συμμε-
μυκος, (apice connivens,) όταν δε ωραιον η, (quando maturatur,)
εκπεταννυται, (expanditur,) και εξαιρεται το εριον, (et aufertur
gossypium.) N. B. Descriptio accurata admodum. Hab. India,
Arabia, iv. 9.

ΕΡΠΥΛΛΟΣ.*Didyn.*

Sempervirens, i. 15. φρυγανικος; caule lignoso, foliis parvis,
vi. 1. Pl. coronaria, cum Έλενιω enumerata, ως άπλος τοις ειδεσιν
etiam ως αγρια φυσις αυτου: floret maxime sine cultura. Hab.
M. Hymetto, Athenis, &c. &c. montes totos operit, vi. 6, 7.
Radix επιπολαιος, et in spatium longum repens, vi. 7. ταρρώδης,
(vid.) ξυλωδης, ib. Duæ spec: 1. E. ορεινη. 2. E. ευοσμος, apud
sylvestres ολιγο-ύδροπατος, ib.

ΕΡΥΘΕΔΑΝΟΝ.*Tetrandr.*

Φρυγανικον, ανακανθες, (frutex inermis;) plures numerantur ge-
nera, quæ sunt difficilia separari, ex habitu, et varietate foliorum;

vi. 1. radix rubra, vii. 9. foliis Ωχροῦ, Pisi *Ocbri* L. sed rotundioribus, κυκλιδόν (habitu verticillato, *Bot.*) caulis repens; vires diureticæ, ix. 14.

ΕΡΥΣΙΜΟΝ.*Tetradyn.*

Cum Sefamo enumeratur, foliis sine nervis, vel venis, viii. 3. caulis subfistulosus, ib. semen non comeditur crudum, utpote nec Lupini; spec. affinis Σησαμου, et oleo abundans, viii. 7.

ἙΣΠΕΡΙΣ.

Νυκτός οζει μαλλον, unde nomen. Desc. nulla. De C. Pl. vi.

ΕΤΥΜΟΔΡΥΣ. Vid. Δρυς. *Monæc.*

ΕΥΒΟΙΚΗ. Vid. Καρυα. *Monæc.*

ΕΥΖΩΜΟΝ.*Didynam.*

Cum Ocymo enumeratur, rad. lignosa, i. 9. επισπορος, (sp. sæpius ferenda in anno?) vii. 1. radix lignosa, vii. 3. semen durat, vii. 6.

ΕΥΗΠΙΑΤΟΝ.*Pentandr.*

Syn. Στρυχνου, (vid. Στρυχον,) vii. 7.

ΕΥΩΝΥΜΟΣ.*Class. incert.*

Arbor Punicæ *Granati* L. flore et foliis similis. Ex insula Lesbo; odor floris gravis, iii. 18.

Z.**ΖΕΙΑ.***Triandr.*

Σιτωδης, (frumentacea, spec.) πρωισπορος, (primo sationis tempore ferenda,) viii. 1. multis et profundis radicibus; multicaulis: καρπος κουφοτατος, (spica maxime paleacea,) προσφιλης πασι τοις ζωοις, (pecoribus omnibus gratissima,) viii. 9.

ΖΥΓΙΑ.*Monæc.*

Hab. montibus Macedoniæ, iii. 4. germinat ante equinoctium

vernum, iii. 6. ευαυξής, (cito crescit,) iii. 7. hyeme cæditur, v. 1. lign. σκληρον, (durum, fragile,) v. 4.

H.

ἩΔΥΟΣΜΟΣ. *Class. incert.*

Cum Ενθουσικῶ femel occurrit, vii. 7.

ἩΛΙΟΤΡΟΠΙΟΝ. *Pentandr.*

Επετειοκαυλος, (caule quotannis sese renovante,) vii. 8. successive floret, vii. 9. sempervirens, vii. 10. flos ακουλουθει τα ασρα, (annon το ασρον Solem?) inde nomen.

ἩΜΙΟΝΟΣ ἥ. *Cryptog.*

Φυλλοις σκολοπενδρου, (pinnis sc. dense stipatis utrinque, ut Scolopendri pedes?) radix tenuis: vires in morbis splenis, ix. 19.


ἩΡΑΚΛΕΩΤΙΚΗ. *Monœc.*

Foliis εντομας (ferraturas) εχων cum Πτελεα, i. 16. Julifera arbor, iii. 7, 8. Sp. duæ: 1. H. αγρια, *Corylus Avellana* L. φυλλοις κεχαραγμενοις, (ferratis;) καρπιμωτερος, κατακοπτομενος τας ραβδους· καρπος στρογγυλος· πολυκαρπος, εν ταις φοραις· ραβδοις ανευ μασχαλων, (furculis simplicibus, non ramosis.) Sp. 2. H. ἡμερα, καρυω προμακρω, εκλευκοτερω, (pulvere sc. farinaceo ad basin nucis,) *Corylus Colurna* L. Ang. "Filbert," iii. 15. φλοιω ιδιας σιγμας λευκας εχοντι. N. B. Optime de cortice maculato, Coryli, ib.

ἩΡΑΚΛΕΙΑ. Vid. Μηκων. *Polyandr.*

ΗΡΙΓΕΡΩΝ. *Syngen.*

Pl. κιχωριωδης: inter λαχανα, αρουραια vocata, foliis Cichorii, vii. 7. floret longum tempus, primo vere εκκαυλει, και ανθει· ορθοκαυλος και νευροκαυλος, vii. 8.

**ΘΑΨΙΑ.***Pentand.*

Planta venenosa; odor idcirco vitandus in colligendo, ix. 9. vires medicinales in radice et succo; pars radice dicitur vomitum ciere, pars alia purgare alvum; foliis Fæniculi, sed amplioribus; caule fistuloso; radice alba, ix. 10. emetica; succus ὑπωπιας αἶρει, (fugillationes.) Hab. Attica.

ΘΕΡΜΟΣ.*Diadelph.*

Annon dantur sylvestres et cultæ species? i. 6. enumeratur cum Capparide, ib. semen ἐκ ὑλῆς βαθεῖα, (in densa materie, remotum a terra,) radicem emittit et germinat, i. 12. non eget cultura; cum Capparide et Σιλφίω, iii. 3. immediate ex ἁλῶ ferendum, viii. 1. βλαστάνει (το σπέρμα) ἐκ τοῦ αὐτοῦ, (radiculam, et plumulam, Bot. ex eodem puncto profert. Vid. Monocotyled. Bot.) viii. 2. semen inedule fine coctione? viii. 7. semen durat, viii. 10. De Caus. Pl. iii. 4.

ΘΗΛΚΡΑΝΕΙΑ.*Tetrandr.*

Hab. in Macedoniæ montibus, iii. 4. germinat πρὸ Ζεφυροῦ, (vere primo?) iii. 6. differt a Κρανεία μαλακότητι foliorum, cavitate ligni medullari, et fructûs magnitudine: plures baccæ ex communi pediculo umbellatim dispositæ, inedules, (vid. Κρανεία,) radices validi, iii. οὐκ οἰσθδεῖς, ὡς κρανείας, i. 13.

ΘΗΛΠΤΕΡΙΣ.*Cryptog.*

Φυλλὸν μονοκώλον, (simplex, sine lobis, Bot.) radix magna, nigra; remedium vermifugum, præcipue adversus tænias, vino vel melle sumptum, ix. 20.

ΘΗΛΦΟΝΟΝ. Vid. Σκορπίον.**ΘΗΣΕΙΟΝ.***Class. incert.*

Radix gustu amara; alvum solvit; enumeratur cum Aro, Dracontio, et Xiphio, vii. 11.

ΘΡΑΥΠΑΛΟΣ. *Pentandr.*

Radix επιπολαιότη, (forſan quia creſcit in udis?) enumeratur cum Κοκκυμηλεα et Σποδια, iii. 7. radices numeroſæ; amat maxime umbroſa loca, iv. 1. una cum Taxo et Pado.

ΘΡΙΔΑΚΙΝΗ. *Syngen.*

Caulis folioſus, i. 16. ſuccus ὕδαρης, i. 19. επιſπορος (ſpec. culta; bis, vel ſæpius ferenda,) vii. 1. παπποſπερμος, (ſemine pappoſo Bot.) Spec. duæ: 1. θρ. λευκη. 2. θρ. μελαινα, quarum prior γλυκυτερα, απαλωτερα, vii. 4. Cultæ var. θρ. λευκης tres, ib.

1. θρ. πλατυκαυλος.
2. θρ. ſτρογγυκαυλος.
3. θρ. Λακωνικος.

Caules prioris latiffimi adeo ut θυραις κηπωρικαις inſerviant. Spec. tertię folia ſκολυμου. Var. Θριδακινης μελαινης reſpectu foliorum, ib.

1. θρ. πυκνοφυλλος.
2. θρ. ουλοφυλλος.
3. θρ. δαſυφυλλος.
4. θρ. μανοφυλλος.

Reſpectu caulis, ib.

1. λευκοκαυλος.
2. πορφυροκαυλος.
3. ποικιλοκαυλος.

N. B. Inſectum Πραſοκουρις dict. Θριδακινη proprium, vii. 5.

ΘΡΙΔΑΚΙΝΗ ΑΓΡΙΑ. *Syngen.*

Φυλλοις βραχυτεροις, caulis per maturitatem ακανθουται, (ſpinofus fit,) ſuccus auſterus, medicinalis; habitat inter fegetes. Uſus in hydropē levando, et in morbis oculorum, vii. 6.

ΘΡΙΔΑΞ. *Syngen.*

Differentia in caulibus παλιελαſοις, (vid.) vii. 2. βραχυρριζα, vii. 3. melius ex ſemine, (ου μεταφυτευθειſα,) vii. 5. pappoſo ſemine, vii. 3. Forſan ſyn. Θριδακινης αγριας.

ΘΡΥΑΛΛΙΣ. *Pentandr.*

Inter ανθουντας κατα μερος, (quæ in ſpica vel thyrſo florent

successive,) cum Plantagine enumeratur, et semel occurrit sine descriptione, vii. 10.

ΘΥΙΑ.

ΘΥΙΟΝ.

Monœc.

Sempervirens, i. 15. οψικαρπότερος παντων, iii. 6. cum Taxo, ib. Hab. in cacuminibus montis, iv. 1. habitus Cupressi; foliis, ramis, trunco; etiam fructu: frequens in Cyrenæa, regione prope Ammonis templum: lignum incorruptibile; radice præcipue, ex qua simulacra et alia pretiosa, v. 5.

ΘΥΜΒΡΑ.

ΘΥΜΒΡΟΝ.

Didynam.

Succus δριμυς, (astringens, pungens,) i. 19. Inter perennes, ανακανθους, (sine spinis,) cum Origano, Thymo, &c. vi. 1. differt a Thymo, ότι σπέρμα έχει φανερόν, abfimile Θυμῳ, (sed hic error notandus, ambo enim gymnospermæ, sed Thymi semina minutissima,) vi. 2. Seritur τριτῳ αροτῳ mense Maio, vii. 1. Semina durant, vii. 6.

ΘΥΜΟΝ.

Didynam.

Succus similis Thymbræ δριμυς, i. 19. semen invisibile, (ὡς ανθος μονον,) iii. 2. Frequentissime in desertis Libyæ, iv. 4. Spec. duæ: 1. Thymus alba; 2. nigra: ambo floribus luxuriant æstate: flores apibus gratissimi: semen minimum, calycibus occultatum, vi. 2.

ΘΥΜΟΝ ΛΙΘΟΕΙΔΕΣ. *Coral.*

iv. 8.

I.

ΙΑΣΙΩΝΗ.

Pentandr.

Monopetala: ανθος διαγραφην εχον, μονον ον, των πλειονων, (etsi flos monopetalus fit, expansionem habet floris polypetali Bot.) i. 21.

ΙΔΑΙΑ. Vid. Αμπελος.

ΙΔΑΙΑ. Vid. Παυκη.

ΙΚΜΗ. }
ΙΚΑΜΗ. } *Class. incert.*

Planta palustris in lacu Orchomeni, cujus descriptio nulla, iv. 11.

ΙΞΙΑ. *Diœcia.*

In trunco Quercûs, iii. 9. amat Boreale latus, iii. 15. Spec. gummosa, ix. 1. De C. Pl. ii. 5.

ΙΞΙΝΗ. *Class. incert.*

Forſan Cardui ſp. ſic dicta, vi. 3. ῥιζοφυλλος, (radicem ex folio agens,) et ex folii medio ακανόν, (pericarpium ſpinoſum, vid. ακανος) producens, magnitudine mali, foliis involutum, vi. 4. Gummi Maſtiche ex caule, ix. 1.

ΙΟΝ. *Syngen.*

Sempervirens, i. 15. Spec. duæ: 1. Ιον λευκον. 2. Ιον μελαν, vi. 6. Ιον μελαν, ſæpe uno verbo Μελανιον, differt ab Ιω λευκω, ὅτι πλατυφυλλον, εγγειοφυλλον και ſαρκοφυλλον εſτι, ib. ευοσμοτερον τε λευκου, ib. item vi. 7. N. B. Vid. infr. Ιωνια.

ΊΠΠΙΟΝ. }
ΊΠΠΙΟΝΟΝ. } *Class. incert.*

Planta palustris cum priore enumerata, et ex eodem lacu, ſed diverſa. N. B. Si ex nomine Ίππος conjicere liceat, forſan Hippuris, vel Equisetum L. ambo fluviatiles.

ΊΠΠΙΟΜΑΝΗΣ. Syn. Τιθυμαλλου. ix. 15.

ΊΠΠΙΟΜΑΡΑΘΡΟΝ. *Pentandr.*

Ναρθηκωδες, νευροκαυλον, (caule fiſtuloſo, ſtriato,) ſemel occurrit, vi. 1.

ἸΠΠΟΣΕΛΙΝΟΝ. *Pentandr.*

Sempervirens, i. 15. radix carnosā, vii. 3. magnitudine differt ab Ἐλειοσελινῶ: caulis maximus; radix magnitudine Raphani sativi, nigra: semina nigra similia Οροῦ, sed majora; folia similia Ἐλειοσελίνου, δασέα, &c. (pubescentia) vires diureticæ, vii. 6. succus gummosus in radice, ut Scammonia, ix. 1.

ἸΠΠΟΦΕΩΣ. }
ἸΠΠΟΦΥΤΟΝ. } *Tetrandr.*

Planta spinosa, cum Τριβόλῳ, Οἰωνίδι, vi. 3, 4. Vid. Φεως, etiam φυσεὸς ἀκανθική et desc. vi. 3. differt a φλεως. Vid. Triandr.

ΙΡΙΣ. *Triandr.*

Æstate floret, vi. 7. cum Ασφοδελῶ enumeratur; folio καλαμωδεσέρῳ, (angustiore et rigidiorē?) καυλῶ ἀνθούς μόνον (pl. acaulis, scapo prædita Bot.) sed minore et rigidiorē; radix optima, suaveolens, iv. 6. ix. 7.

ΙΣΧΑΙΜΟΣ. *Polygam.*

Ex India; spec: cujus vires stypticæ mirabiles. Def. nulla, ix. 15.

ΙΣΧΑΣ. *Class. incert.*

Plant. pharmaceutica: radix emetica et cathartica, cum Θαψία enumeratur; foliis rutaceis, parvis; caulibus repentibus 3. vel 4. radice Asphodeli, sed λεπυρωδῇ, (tunicata.) Hab. in montosis et calcareis locis, ix. 10.

ΙΤΕΑ. *Diæcia.*

In paludosis, i. 17. (βραχυσελεχης) lign. leve, i. 8. βλασάνει ἀπο παρασπαδῶν, (furculos emittit,) iii. 1. ωλεσικαρπός, (semina copiosissime per aerem spargens. Hom. Il. vid. ωλεσικαρπός) iii. 2. πρωϊβλαστός, (primo vere germinans,) iii. 6. ευαυξής, (cito crescens,) iii. 7. πολυειδής (var. plurimæ.) 1. I. μελας, cortice subnigro, φοινικῶ, (atro rufo.) 2. I. λευκή, cortice albo. 3. I. ἐλική apud Arcades καρπῶ γονιμῶ, (opponitur ωλεσικαρπῶ, sc. fructum immaturum spargens, secundum Theophr.) iii. 13. spec. peculiaris in Hæmo monte, iv. 7. In palude Orchomeni lacûs, iv. 11. βραχυβίος, iv. 14. arbor succisa Philippis iterum fur-

rexit, iv. 19. scutis faciendis, opus textile sc. v. 8. sed et ex ligno ipso, quod συμμυει πληγεν, (quando perforatur coalescit,) v. 5.

ΙΦΤΟΝ. }
ΙΦΤΣΟΝ. }

Didynam.

Inter flores coronarios æstivos, cum Iride, Lychni, &c

ΙΨΟΣ.

Incertum.

Omnium οψιζλαστοτατος cum Aria et Τετραγωνια, iii. 6. Semel occurrit.

ΙΩΝΙΑ.

Syngen.

Spec. duæ: 1. λευκη, spec perennis annos tres durans, ætate ελαττουμενη, λευκοτερη, vi. 7. 2. μελαινα ακλονητος (non ramosa) προσριζοφυλλος· αιφυλλος διολε φερων το ανθος, (ex omni parte florens,) vi. 6. Vid. Ιωνια Lex. Theophr. N.B. Ex locis supradictis, ubi solummodo occurrit vox hæc, colligi potest vocem Ιωνια plantam ipsam æque ac violetum indicare. Vid. Ποδωνια, Κριωνια, Lex. Theophr.

K.

ΚΑΔΥΤΑΣ.

Class. Incert.

Βοτανον Συριακον, super truncis arborum. De C. Pl. ii.

ΚΑΚΤΟΣ.

Icosandr.

Hab. in Sicilia solum; omnium maxime singularis planta; immediate ex radice emittit caulem peculiarem, κακτον vocatum, latum, densum, spinis obsitum; cocti hi et decorticati, edules sunt, et conservantur in άλμη, "brine." Ex cacto hoc alius assurgit caulis, vocatus περνιζ, edulis etiam; in quo sita est fructificatio spinosa, pappo involuta, Palmæ εγκεφαλω similis, quæ vocatur σκαλια, vi. 4.

ΚΑΛΑΜΟΣ.

Triandr.

Ινοφλοιος, (cortice fibroso,) μονολοπος, (cortice simplici,) γονατω-

δης, (caule nodoso.) i. 8, 10. μητρα ὑμενωδης, (pars interior membranis divisa,) i. 9. radice fibrosa, i. 10. γωνιοφυλλος, (nervo acuto longitudinali prominente,) (vid. γωνια) i. 16. λοχμωδης, (vid.) cum Cypero, iv. 9. Species Calami quinque: 1. K. αυλητικος. 2. K. πλοκιμος. 3. K. χαρακιας. 4. K. ζευγιτης (affinis K. χαρακιας, si non idem, ex arefactione lacûs proveniens.) 5. K. βομβυκιας, qui omnium aridissimus, folio latiore, et magis cano, iv. 11. spica minore. Dissertatio de K. αυλητικῳ et methodo fistulas formandi, in hoc capite occurrit: optimi ex Cephiso flumine. Divisio alia: 1. K. πυκνος. 2. K. μανος. 3. K. κοιλος (συριγξ voc.) 4. K. σερεις, (πληρης.) 5. βραχυς. 6. ὑψηλος. 7. παχυς. 8. λεπτος. 9. πολυφυλλος. 10. ολιγοφυλλος. 11. μονοφυλλος. 12. K. δοναξ, maxime communis spec. et maxime lignosa. 13. K. τοξικος, spec. peculiaris; arcubus, an potius sagittis proprius. 14. K. Λακωνικος (variegatus.) 15. K. επιγειος, spec. repens, folio sagligno, ad spicula propria. Hab. fluvio Acesine, iv. 12. folia amplexicaulia, vi. 2.

ΚΑΛΑΜΟΣ. Σχοινος, (vid. Σχοινος,) ix. 7.

ΚΑΠΝΙΟΣ. Vid. Αμπελος.

ΚΑΠΠΑΡΙΣ. *Polyandria.*

Nunquam colitur, i. 6. iii. 3. foliis et caule spinosis, vi. 3. foliis spinosis; radice simplici; caule repente: æstate florens in arenosis, vi. 5. επετειοκαυλος, (perennis,) vii. 8.

ΚΑΡΔΑΜΟΣ. } *Tetradyn.*
ΚΑΡΔΑΜΟΝ. }

Succus auferus, i. 19. planta λαχανωδης, cum Ανηθῳ, Κοριανθῳ, εν πρωτοις αροτοις (olera quæ feruntur hyemali solitatio,) vii. 1. genus simplex, vii. 4. semen durat, vii. 6.

ΚΑΡΔΑΜΩΜΟΝ. *Monandr.*

N. B. Planta forsan Καρδαμωμος: sed unguentum solum memoratur inter aromata, ix. 7.

ΚΑΡΤΑ.

Monœcia.

Περσική. }
 βασιλική. } Syn. Juglandis, *Regiæ*. L.
 Ευβοϊκή. }

Ξυλον ασαπες, (incorruptum,) v. 5. item in aqua durans ; cum Οξύη, (Fago,) ib. item v. 8. optimum ad carbinationem, iii. 7. arbor non germinat ex apice furculorum ; sed εκ των πλαγιων προωδεται αυτο το υπαρχον, ὥσπερ και αυτο το σελεχος, (ex lateribus propelluntur incrementa, pari modo, ac in trunco evenit,) iii. 7. Carbones optimi ex ligno hujus arboris, v. 10. Fructus maturatur μετ' οπωρον, (ineunte hyeme,) iii. 6. το Καρυον pro nuce arboris ? iv. 6. Hab. Tmolo, et Olympo Mysio, ib.

ΚΑΣΙΑ.

Enneandr.

Cum Σμυρνῇ et Ολιβανῶ, in Arabia ; spec. ramosissima ; ramulis parvis, sed latioribus Cinnamomo ; cortice fibroso ligno firmiter adhærenti : vires eædem cum Cinnamomo ; methodus singularis partem interiorem furculi destruendi, ope vermium, ix. 4.

ΚΑΤΚΑΛΙΣ.

Pentandr.

Oleris genus ; semel cum Ανδρυαλῖα, Ὑποχοιριδι, &c. vocantur κιχωρη, quia foliis similibus instruuntur ; desc. nulla.

ΚΕΑΝΩΘΟΣ. Vid. Ακανθα. *Syngen.*

Ῥίζα γονατωδης, (nodis abundans) εξ ἑκάστου γονατος αφησι ανω βλαστον, κατω ριζαν ; sed non καλαμωδης, iv. 11.

ΚΕΓΧΡΟΣ.

Polygamia.

Hymenospermus, cum Πυρῶ, i. 18. ανωνυμος κοινή προσηγορία, (differens habitu, etsi cum σιτωδεσι conjunctus,) viii. 1. cum Ελυμῶ et Σησαμῶ, ib. feritur æstate ineunte, μη δυναμενος φερειν τον χειμωνα, ib. καυλος καλαμωδης, viii. 3. πολυκαρποτατος, (seminibus maxime abundans,) semina durant, viii. 10.

ΚΕΔΡΙΣ. }
ΚΕΔΡΙΑ. }

Diæcia.

Θαμνωδης (fruticosus;) τι μικρον, ο ου δενδρουται, i. 15.

ΚΕΔΡΟΣ.

Diæcia.

Ξυλου φλοιος ασαρκης, i. 8. sempervirens, i. 15. foliis apice acuminatis, i. 16. radice superficiali, iii. 7. Gen. duo: K. λυκια. K. φοινικη. ambo fimiles Juniperi, sed differunt foliis magis pungentibus, et rigidis. Alii distinguunt ita. 1. Κεδρος. 2. Οξυκεδρος. Lign. incorruptum το πλειστον εγκαρδιον, (totum fere cor,) rubri coloris, *fragrans*; bacca flava, myrti magnitudine, fragrans, gustu dulcis; annum totum in arbore durans: trium annorum proventus simul in arbore, προπερυσινος, περυσινος, νεος: cortice Cypressi, sed magis scabro. Hab. in montosis, saxosis, iii. 12. in montibus Thraciæ, iv. 6. et Phryg. ib. εαν επικοπη το ακρον, φθειρεται, iv. 19. Statuæ fiebant ex ejus ligno, v. 5. Lignum minime ponderosum et ad navalia utile, v. 8. Cedri in Syria magnitudine tali, ut tres homines amplecti nequeant: long. 13 ulnarum, ex quo ενδεκτηρης ναυς, (navis quindecim-remis,) an Cedr. *Libani* L.? v. 9. οπος δακρυωδης, (succus resinofus.)

ΚΕΝΤΑΥΡΙΟΝ.

Syngen.

Succo amaro, cum Αψινθιω, i. 19. amat frigida loca, iv. 6. folia amara, sed utilia, vii. 9.

ΚΕΝΤΑΥΡΙΣ ΤΡΙΟΡΧΙΣ. *Class. incert.*

Planta spinis venenosis, ut videtur, ix. 9.

ΚΕΝΤΑΥΡΙΣ.

An idem cum Κενταυριω? radix crassa, pinguis, ix. 15.

ΚΕΝΤΗΡΙΑ.

Class. incert.

Syn. ατρακτυλιδις; (α κεντεω) οπος αιματωδης.

ΚΕΝΤΡΟΜΥΡΡΙΝΗ. *Diæcia.*

Επιφυλλοκαρπος, (fructificatione super folium,) una cum Δαφνη Αλεξανδρεια; ambo Rusci L. iii. 17.

ΚΕΡΑΣΒΟΛΟΝ. Vid. Ερεβινθος.

ΚΕΡΑΣΟΣ. *Icosandr.*

Ορδοφυης, (procera arbor) μεγαλει μεγας· και γαρ εις τεσσαρας και εικοσι πηχεις, (sc. circumferentia ramorum,) circumferentia trunci ipsius διπηχυς: lignum durum valde; cortex similis Tiliæ et ad eisdem usus; methodus peculiaris decorticandi, adeo ut pars interior illæsa maneat, iii. 13. flos albus, Pyri similis, εκ μικρων ανθων συγκειμενον, (umbella ex multis floribus, κηρωδης, (quorum superficies plana favi aperturas imitatur; vid. Lex. Theophr.) fructus rubri coloris, Diospyri similis; magn. Κυαμου, (Pisi antiquorum.) N. B. Italis "Maraschino?" (nucleus Διοσπυρου, σκληρος; Cerasi, μαλαχος.) Hab. in irriguis ad ripas fluvium, iii. 13. arbor gummosa, ix. 1.

ΚΕΡΚΙΣ. *Decandr.*

Arbor Populi albi similis canitie foliorum: folium Hederæ simile; αγωνιον εκ του αλλου, μερους? (vid. γωνια,) την δε μιαν, (γωνιαν,) venam sc. intermediam folii prominentem, (προμηκη,) color superioris et inferioris folii partis idem; pedunculis foliorum longis, tenuibus, unde folia inclinantur; cortex scaber, maculatus, iii. 14. N. B. Forfan spec. alia *Class. incert.*

ΚΕΡΩΝΙΑ. *Polygam.*

Fructus in filiqua, i. 18. fructificatio in apicibus, i. 23. arbor in Ionia sic dicta; ex caudice summo fructificans; item ex apicibus, iv. 2.

ΚΗΛΑΣΤΡΟΝ. }
ΚΤΛΑΣΤΡΟΝ. } *Pentandr.*

Frutex sempervirens, i. 15. incultus, i. 6. in planis Macedoniæ, iii. 4. fructus ante hyemem decidit, iii. 6. amat frigida loca, iv. 1. cum Junipero; usus ad baculos, "the Staff-tree," Ang. v. 3.

ΚΗΡΙΝΘΟΝ. *Pentandr.*

Inter flores æstivos cum Lychnide, et Diantho *Armeria*. Desc. nulla, vi. 7.

KINNAMOMOS.

Enneandr.

Hab. India, Arabia, Syria, iv. 6. Fruticosa species, ib. cum Olibano et Casia enumeratur, ix. 4. frutices ambo ramulis Vitis, Agni casti similibus; cortex furculorum optimus, ix. 5. inter aromata recensetur, ix. 7.

ΚΙΣΤΟΣ.

Polyandr.

Φρυγανον ανακανθες, (frutex inermis,) cum Spiræa, Cneoro, &c. vi. 1. Spec. duæ: αρρήν. δηλυσ. 1. folio majore, rigidiores, magis nitente; flore purpurascens, haud absimili flore Rosæ, caninæ; αμφω ασμοι, vi. 2.

ΚΙΤΤΟΣ.

Pentandr.

Frutex, i. 4. sempervirens, folia juniora angulosa; annosa, subrotunda, i. 15. pedunculis longis, ib. flos stamineus, i. 21. peculiari modo, i. 22. δενδρουται χαρακος παγουσης, (si palum admoveas, brevi crescit sine fulcro.) (N. B. Hoc expertus sum,) ii. 1. bacca inedulis, iii. 6.

Genera 3: 1. K. λευκος. 2. K. μελας. 3. K. έλιξ. Spec. 1^{ma}. baccis albis? 2^{da}. foliis minoribus, fructu laxo corymbofo, vel in sphaeram collecto, (κορυμβια dict.) spec. secunda minus variat. spec. tertia (έλιξ) maxime ab aliis differt parvitate, et ευρυθμια foliorum, et raritate fructus; ουκ αποκιττουται, (non habitum amittit, vid.) Spec. Έλικος tres. 1. Έ. χλοερα, η ποωδης. 2. Έ. λευκη. 3. Έ. ποικιλη, vel Thracica. Κιττος εκ των βλασων αφιησιν αι ριζας ανα μεσον των φυλλων, αις, ωςπερ ενδυεται τοις δενδροις, και τοις τειχοις, (radiculæ caulinae,) bacca Κιττου λευκου επιγλυκυσ; Κιττου μελανος, σφοδρα πικρος, iii. 18. lign. θερμον; opp. ψυχρω.

Κιττου λευκου σπερμα προς το γονιμον ειναι, (adversus sterilitatem,) ix. 19.

ΚΙΧΩΡΙΟΝ. }

ΚΙΧΩΡΗ. }

Syngen.

Folia radicalia, i. 16. λαχανον αρουραιον, (cultā? an inter fetes?) vii. 7. vere caulescit et floret, vii. 8. επικαυλοφυλλος, άματαις εκφυσεσι ακρεμονικαις, (simul ex divaricatione ramorum ad apices,) εκφυει και τ' ανθος, (florem producit,) vii. 9. successive

floret, vii. 10. caulis magnus, ad apicem ἀποφυσείς emittens, radice magna, vii. 11.

ΚΛΗΘΡΑ.*Monæc.*

In humidis æque ac in aridis, i. 7. in planis Macedoniae, iii. 4. quibusdam in locis ἀκαρπος, iii. 5. βλασάνει μετα ζεφυρον, (fructificat autumnus,) iii. 6. cito crescit, iii. 7. Sp. simplex, sterilis; lignum molle, medulla intus; furculi tenues, cavi intus: folia Pyri, sed majora, et magis nervosa: cortex scaber; interior ruber, tinctorius: radices super terram, in aquosis, iii. 14. cum Salice, iv. 9.

ΚΑΤΜΕΝΟΝ.*Diadelph.*

Pl. medicinalis; καρπὸς colligendus primo mane πρὶν ἡλίου ἐπι-
βαλλεῖν, ix. 9. radix ad abortiones, ix. 19.

ΚΝΕΩΡΟΝ.*Octandr.*

Frutex crassifolius, i. 16. ἀνακανθῆς cum Cisto, Spiræa, &c. vi. 8. Spec. duæ: 1. K. λευκόν. 2. K. μελάν. Sp. 1^{ma}. foliis coriaceis, oblongis, Oleæ foliis similibus. Planta humilis, fragrans. Sp. 2^{da}. foliis Myricæ; habitus elatior, odor nullus: florent ambo æquinoctio autumnali: flos durat; radices magni; ramuli densi, vi. 2.

ΚΝΗΚΟΣ.**ΚΝΙΚΟΣ.***Syngenes.*

Flos femini infidet, i. 22. ἀκανθώδη φύσιν ἔχει, (in ceteris partibus spinosa est,) τὸ δὲ σπερματικόν, (ἀκάνον, pericarpium) οὐχ ὁμοίως, (non similiter spinosum,) vi. 3. ἀποφυσείς ἔχει, (caulis supra ramosus,) ib. Spec. duæ: 1. K. ἀγρία. 2. K. ἡμέρα. Prioris etiam sp. duæ. 1^{ma}. εὐθυκαυλοτάτη; adeo ut πηνίοις (fufis) mulieribus inserviat; καρπῷ (pericarpio) magno, nigro, amaro. 2^{da}. villosa, caule Sonchi; foliis procumbentibus, vi. 4.

ΚΟΙΞ.*Monæc.*

Καλαμοφυλλος, i. 16. Planta bulbosa; recte Κοῖξ scribitur sed Ald. Lect. κυῖξ. forf. vox Ægyptia?

ΚΟΚΚΟΣ ΚΝΙΔΙΟΣ. *Class. incert.*

Fructus rotundus, ruber, grano Piperis major, ισχυροτερος πολυτη θερμότητι, adeo ut succus urat fauces: an Capficum, *baccatum?* ix. 22.

ΚΟΚΚΥΓΡΙΑ. *Pentandr.*

Cum Arbuto et Andrachne enumeratur; foliis Ανδραχνης, δενδρον μικρον καρπος εκπαππουμενος, (fructificatione *rapposa*,) ιδιον τουτο, (peculiare hoc est,) ουδ' αφ' ενος ακηκουαμεν αλλου δενδρου; recte, iii. 16.

ΚΟΚΚΥΜΗΛΕΑ. *Icosandr.*

Fructus carnosus, i. 18. succus fructus aquosus, i. 19. flos quinquepetalus, i. 21. superus, i. 22. radices super terram numerosæ, iii. 7. arbor maxima; Mespili habitu: πυρηνι στρογγυλω, (bacca rotunda,) floret vere; maturat fructum Octobri; arbor semper-virens. Hab. Thebais.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΗ. *Monæc.*

Cum Cucumere enumeratur, succus υδαρης, (aquosus,) i. 19. flores superi, i. 22. semen pullulat 6 vel 7 diebus, vii. 1. βραχυρριζα, vii. 3. varietates plurimæ; semina non durant longum tempus, vii. 6. inter culta enumeratur.

ΚΟΛΟΥΤΕΑ. *Diadelph.*

Sp. 1. Arbor filiquosa, i. 18. foliis εγγυθεν τοις της Ιτεας? ramosissima: ib. καρπος ελλοβος, ωσπερ τα χεδρόπα λοβοις πλατεσι, ου σενοις, (i. e. secundum species diversas,) semine parvo, molliusculo; filiquis sparsis; arbor rara, iii. 14. Hab. M. Ida.

Sp. 2. Species peculiaris juxta Liparam. Arbor ευμεγεθης: semine in lobis magnitudine Φακου, (Fabæ,) cujus usus in pecoribus saginandis mirus, et ideo feritur.

Sp. 3. fruticosa πολυμασχαλος, (vid.) foliis Lauri, sed rotundioribus, et Pyri *Mali* similibus; parte superiore viridibus; inferiore glaucis, venis multis, cortice Vitis, sine flore, vel fructu, sed solummodo καχυι κορυνωδει. Desc. obscura, si non textus corruptus.

ΚΟΜΑΡΟΣ. }
ΚΩΜΑΡΟΣ. }

Decandr.

Ῥηξιφλοιός, ὥς ἐκπιπτειν, (cortice lacerato, decidente,) i. 8. sem-
pervirens, i. 15. φερεῖ μίμαικυλα ἐδωδιμα (fraga, sc.) Arb. med.
magn. cortice tenui, instar Myricæ; folio inter Prinum et Lau-
rum; floret Octobri; flores ἀπο μίας κρεμασρας, (ex uno pedi-
culo penfili,) ἐπ' ἀκρον, βοτρυδον (in apice, racematim dispositi,)
floris Myrti magn. ἀφυλλοὶ δὲ, (sc. monophylli,) καὶ κοιλοὶ,
ὥσπερ ὠον ἐκκεκολλημένον, (ut ovum excavatum,) τὸ στομα
δὲ ἀνεωγμένον· ὅταν δ' ἀπανθήσῃ, ἡ προσφυσις τετρυπῇται, (flore
delapso, fructus enascens stigmate perforatus,) τὸ δ' ἀπανθήσαν
(fructificatio, flore delapso) λεπτόν, ὥσπερ σφονδύλος περὶ ἀτρα-
κτον, (ut verticillus circa fufum,) ἡ Καρνεῖος Δωρικός, (vid.
καρν.) fructus ἐνιαυτῷ πεπαινέται ὥς συμβαίνει ἅμα τοῦτον δ'
εἶναι, καὶ τὸν ἕτερον ἀνθεῖν; optime, iii. 16.

ΚΟΜΗ ἡ.

Syngen.

Radice fusiformi, Bot. gustu dulci: foliis Croci, sed longioribus:
caule brevi; καλυκὶ μεγάλῳ, (perianthio magno,) πωγωνί ἐξ ἀκροῦ
πολῳ, (de capitulo papposo, unde nomen τραγοπωγων,) vii. 8.

ΚΟΝΤΖΑ.

Syngen.

Inter ποώδη ἀνακάνθη cum Thymbra, Origano, &c. vi. 1.
Spec. duæ: 1. Κ. ἀρρήν. 2. Κ. θηλεία. 1. foliis majoribus, caule
amplo, (παχέι,) magis ramoso; flore speciosiore; odore pungenti.
2. foliis tenuioribus: habitus συνεσθηκώς, (compressus Bot.) odor
βαρὺς; adversus insecta utilis, vi. 2.

ΚΟΡΙΑΝΝΟΣ.

Pentandr.

Ποώδης· feritur cum Ἀνηθῷ καὶ Καρδαμῳ ἐν πρώτοις αἰστοῖς,
(vid.) vii. 1. radix lignosa, γυμνοσπέρμος, (vid.) vii. 3. genus sim-
plex, vii. 4. semen durat, vii. 6.

ΚΟΡΟΝΟΠΟΥΣ.

Tetrandr.

Ἐπιγείοφυλλος, cum Anthemio, Anchusa, &c. vii. 9.

ΚΟΡΧΟΡΟΣ.

Syngen.

Inter λαχανα ἄβρωτα proverbialiter amarus, vii. 7.

ΚΟΣΤΟΣ. *Monandr.*

Inter aromata Indica, ix. 7.

ΚΟΤΙΝΟΣ. *Diandr.*

Sylvestres meliores, i. 7. κραδας in trunco generat, (vid.) κοιλο-
τητες ιδιοι in trunco, i. 13. opp. Ελαια, i. 24. ii. 3. iv. 14. lign.
densum album, v. 4. incorruptum, v. 5. aptum malleis, και τερε-
τριοις πυρειας, (vid.) v. 9.

ΚΟΨΙΜΟΣ ἡ. *Class. incert.*

Affinis Κραταιγου· καρπω στρογγυλω. Vel spec. diversa, iii. 15.

ΚΟΥΚΙΟΦΟΡΟΣ. *Palma.*

Similis Φοινικι trunco et foliis; sed capite diviso, ραβδοις
(spathis) brevibus, raris; fructus χειροπληθης, rotundus, flavus,
gustu dulcis; non congregatim sed separatim; nucleo durissimo
intus: lign. a Palma valde diversum: sc. non fibrosum, sed
solidum ponderosum. Hab. Persia.

ΚΡΑΝΕΙΑ. *Tetrandr.*

Lign. durum, i. 9. in maribus nodosum, i. 13. in planis Ma-
cedoniæ, iii. 4. Germinat προ ζεφυρου; fructum maturat περι τρο-
πας θερυνας, iii. 6. cito crescit, iii. 7. Spec. duæ: 1. αρρήν. 2. θη-
λεια: habitu solum differentes, ambo foliis Amygdali, sed pingui-
oribus, et magis crassis; cortice tenui fibroso; trunco subgracili;
οζοις fimilibus Viticis, Agni casti. Lign. Θηλυκρανειας molle, me-
dulla intus nulla. Αρρήν ακαρπος; Θηλυκρανεια, καρπιμος, drupa
edulis; nucleo intus, instar Olivæ, duro; fructus racemosus.
N. B. Duæ certe species diversæ, et ita a Linneo enumerantur,
vid.

ΚΡΑΝΙΟΝ. *Cryptog.*

Fungus; cum Hydno, i. 9.

ΚΡΑΤΑΙΟΓΟΝΟΝ. }
ΚΡΑΤΑΙΟΓΟΝΟΣ. } *Didyn.*

Fructus solum numeratur inter roborativa; sine desc. N. B. Fa-
bulosa forsan planta. Vires generativæ, ut nomen græcum denotat.
Vid. Ger. em. ix. 19.

ΚΡΑΤΑΙΓΟΣ. }
ΚΡΑΤΑΙΓΩΝ. }

Icosandr.

Folio Mespili τετανω, (rigido; vid. τετανος) latiore, longiore; margine simplici, non ferrato; arbor mediæ magn. lign. subflavum, ποικιλον, (maculatum?) cortice Mespili: καρπω (drupa Bot.) σρογγυλω, simili Κοτινου, per maturitatem arefacto in arbore; et nigro, iii. 15.

ΚΡΙΘΗ.

Triandr.

Πυκνορρίζα, i. 9. πρωϊσπορος, viii. 1. αναφύεται μονοφυλλα, (monocotyledon Bot.) viii. 2. maturat semen 40 dies post inflorescentiam, viii. 3. γυμνη, (non glumis involuta,) σοιχειωδης, (grana in ordine collocata,) sc. δισιχοι, τρισιχοι, &c. viii. 4. amat solum ψαφαρες (vid.) Κ. Ετεοκριθη. de C. Pl. iii.

ΚΡΙΝΟΝ.

Hexandr.

Inter σεφανωτικά cum Narcisso: coloribus variant, item habitu; μονοκαυλα· δικαυλα σπανιως; sed in eodem scapo flos unicus, vel plures: radix ampla, σαρκωδης, (carnosa,) καρπος æque ac radix ad propagandum inserviens, vi. 6.

ΚΡΙΟΙ.

Diadelph.

Κρ. οροβιαιοι var. Οροβου, viii. 5.

ΚΡΟΚΟΣ.

Triandr.

Radix σαρκωδης, (bulbus non tunicatus?) i. 10, 11. foliis σενοις, (linearibus,) τριχοφυλλος, ευθυσ άμα τοις φυλλοις το ανθος (optime,) φιλει πατεισθαι, (conculcari,) vi. 6. Inter flores autumnales. Spec. duæ: 1. Κ. ορεινος, ευοσμος. 2. Κ. ήμερος. vi. 7. radix βαλανωδης, (glandiformis,) όμαλης, vii. 9. καυλω ανθους, (scapo Bot.) forsan Cr. aureus Fl. Græc. t. 35. var. Κρ. ορεινης. Inter aromata, ix. 7.

ΚΡΟΜΜΟΝ.

Hexandr.

Bulbus tunicatus. i. 8. corticatus etiam, i. 10. folia radicalia, intus cava, i. 16. propagatur ex bulbis, vii. 2. ακροκαρπον, vii. 3.

Var. cultæ: 1. Κ. Σαρδιον. 2. Κνιδιον. 3. Σαμοθρακιον. 4. Σητανιον. 5. Σχισον. 6. Ασκαλονικον. N. B. Posteriores tres dif-

ferunt ab aliis : n. 4. μικρον, et γλυκυ ευ μαλα. n. 5. κατω σχι-
ζεται. n. 6. αγονος (bulbos non producit) επι ταις ριζαις, Allium
Schænoprasum, Ang. "Cives," vii. 4. amat loca irrigua, iv. 5.
λειοκαυλος, (vid.) iv. 8.

ΚΡΟΤΩΝ.

Monæc.

Folia junioris plantæ rotunda, senioris angulosa; contrarium
evenit in Hedera, i. 16. annon Ricini spec. arborefcens. de C.
Pl. ii.

1. ΚΤΑΜΟΣ.

Gynandr.

Species paludosa et fluviatilis : caulis 4 cubitos altus, magn.
dactyli; καλαμοειδης, mollis, non geniculatus διαφυσεσιν ενδον, (ca-
vitatibus medullosis,) in apice caulis κωδια, (pericarpium,) παρο-
μοια σφηκιω περιφερει, (vespæ nido,) και εν ἐκαστω των κυτταρων,
(in singulis cellulis,) κυαμος, (femen,) μικρον ὑπεραιρον αυτου, (le-
viter supereminens in receptaculo,) feminum numerus circiter 30.
Flos papaveraceus, coloris rosei, aquis innatat; folia ampla lo-
ricæ Thettalicæ, fimilia; radix ampla; planta edulis. Hab. Æ-
gypto.

2. ΚΤΑΜΟΣ.

Diadelph.

Πωδης, πολυχρονιος τη ανθησει, vii. 3. cum Ερεβινθω et
Πισω, viii. 1. πρωισπορος, (vid.) Dicotyledon, viii. 2. foliis subro-
tundis; caule lignoso; ramis ex lateribus: solus inter χεδροπα
σοδοκαυλος, (optime,) viii. 3. corculum feminis Bot. prominens,
viii. 5. ου ταχυ βλασταιει, v. 10.

ΚΥΚΑΣ.

Palma.

Hab. Æthiopia; species θαμνωδης, truncis pluribus simul
junctis ad basim: ραβδοις (spathis?) cubitalibus: foliis latis, ὥσπερ
εκ δυοιν συγκειμενοις, (plicatis,) καρπω σρογγυλοτερω, μειζονι, ἥττον
γλυκει· maturatur anno tertio: ex his conficiuntur panes, ii. 8.

ΚΥΚΛΑΜΙΝΟΣ.

Pentandr.

Bulbus cortice tectus, vii. 9. Vires medicæ in morbis pulmo-
num; mulieribus εν προσθετοις; (vid.) adversus ulcera, και προς
τω μεθυσκειν, (ad providendum adversus ebrietatem,) ix. 10.
Desc. nulla.

ΚΥΜΙΝΟΝ. *Pentandr.*

Γυμνοσπερμον, cum Anetho ; semen στενον, γραμμωδες, (lineare Bot.) δειν καταραν σπειραντας ! vii. 3. variat, vii. 4.

ΚΥΝΟΡΟΔΟΝ. *Icosandr.*

Το όλον φυτον ὁμοιον τοις Κυνοροδοις, iv. 5. syn. pr. Κυνοσξατου vel Rosa, *canina* L.

ΚΥΝΟΣΒΑΤΟΣ. *Icosandr.*

Ορδοφυης, και ὑψος εχων, καρπω ὑπερυθρῳ ὁμοιω τῳ της ῥοδης, δενδρου και θαμνου μεταξυ. Rosa, *Canina*, "Dog-rose, or Hip-tree," Angl. Fructus κατ' ανεμον colligendus; ει μη' κινδυνον ειναι των οφθαλμων; anne ex filis quæ grana involvunt; an spec. peculiaris, ix. 1.

ΚΥΝΩΨ. *Tetrandr.*

Pl. κιχωριωδης, cum Aphaca et Buprestis, vii. 8. βλαστανει ἅμα τοις πρωτοις ὑετοις, ib. an diversus ab Αχυνωψ, vii. 10. Error, ut suspicor, textûs in hoc loco.

ΚΥΠΑΡΙΤΤΟΣ. *Monœc.*

Procera arbor, i. 8. radicibus horizontalibus, i. 9. μονοσελεχης, i. 14. sempervirens, i. 5. σαρκοφυλλος, i. 16. maxime in Ida, iii. 3. et in Cyrenaica, iv. 3. Creta, Lycia, Rhodo, iv. 6. ex ligno fiebant statuæ una cum Cedro, v. 5. Lign. incorruptum, ib.

ΚΥΠΕΙΡΟΣ. *Triandr.*

Cum Sparganio ὁμαλοτητι ιδια, (polita maxime,) radice fingulari, i. 10. γωνιοφυλλος, (vid. γωνια,) i. 16. planta locustis λοχυωδης, (vid.) iv. 9. In Lacu Orchomeni, iv. 11. radice maxime fingulari, sc. inæqualis magnitudinis; pl. δυσολεθρος, ib.

1. ΚΥΤΙΣΟΣ. *Diadelph.*

i. 9. lign. durissimum, arbor vivax, iv. 20. lignum Ebeni simile, colore excepto, v. 4.

2. ΚΥΤΙΣΟΣ. *Diadelph.*

Species parasitica vel scandens, quæ plantas alias crescendo enecat: a quibusdam Cytisus Maranta dicta, Medicago, *arborea*, L. Semel occurrit, iv. 20.

ΚΩΜΑΚΟΣ. }
 ΚΩΜΑΚΟΝ. } *Class. incert.*

Fructus et succus Κωμάκου solum occurrit, ix. 7.

ΚΩΝΕΙΟΝ. *Pentandr.*

Caulis carnosus, i. 8. ναρθηκωδης, (fistulosus item,) vi. 2. σπος
 lethalis, ix. 8. Hab. Sufis, ix. 15.

Λ.

ΛΑΘΥΡΟΣ. *Diadelph.*

Inter χεδροπα: foliis longioribus, viii. 3. επιγειοκαυλος, (pl.
 repens,) ib. femina obnoxia vermi, σκωληκι dicto, όταν υγρανθωσι,
 viii. 10.

ΛΑΚΑΘΗ. *Icosandr.*

In planis Macedoniæ, iii. 4. Sine desc.

ΛΑΚΑΡΑ, vel Λευκαρά. *Class. incert.*

An idem cum præcedente? Arbor cito crescens, cum Φηγω,
 Αρκευθω, Σφενδαμνω, in udis crescens, iv. 7. Error forsan textûs.

ΛΑΠΑΘΟΣ. }
 ΛΑΠΑΘΟΝ. } *Hexandr.*

Caulis carnosus, i. 8. μονορρίζος; pl. επισπορά: seminatur cum
 Τευτλιω, Θριδακι &c. Spec. culta; an Rumex acetosa? vii. 1. radix
 1½ ped. longa, vii. 2. carnosâ vel potius ξυλωδης, vii. 3. genus
 simplex, vii. 4. crudæ inedules, vii. 7.

ΛΕΙΜΩΝΙΑ, Ανεμωνη.

Vid. Ανεμωνη, vi. 7.

1. ΛΕΙΡΙΟΝ, vel Ναρκισσος. *Hexandr.*

Foliis radicalibus, Asphodeli similibus, sed latioribus; scapo
 nudo, viridi; flore spatha membranacea involuto in apice, vi. 7.
 Floret vere.

2. ΛΕΙΠΙΟΝ.

Hexandr.

Λειριον ἕτερον dict. planta autumnalis, cum Croco montano, vi. 7.

ΛΕΜΝΑ.

Monæc.

Ὁ προσαγορευουσι Λεμνα. Spec. fluviatilis. Τοῦτο πλεον το κατ' ὕδατος εἶν, (aquis pars major supernatat,) fine desc. ut maxime omnium communis, iv. 11.

ΛΕΥΚΑΚΑΝΘΑ.

Syngen.

Inter spinosas capitulo, (ακανῶ) inermi? vi. 6. foliis solummodo spinosis, ib.

ΛΕΥΚΗ.

Diæcia.

Folia juniorum diversæ formæ a foliis seniorum, i. 16. σρεφετα ὑπτια των φυλλων μετα τροπας, ib. Vid. Ελαια, p. 19. amat irrigua loca: propagatur απο παρασπαδων, (vid.) vel καταπηγνυμενος, iii. 1. in planis Macedoniae, iii. 4. πρωῖβλασος, iii. 6. in aquosis cito crescens, iii. 7. Spec. montana, iii. 10. cum Populo, cui affinis habitu; ανανθη αμφω, iii. 14. βραχυβιος, iv. 14. Historia mirabilis Λευκης εν Σταγειροις, εν τω Μουσειω, iv. 19.

ΛΕΥΚΟΙΟΝ.

Hexandr.

Planta bulbosa cum Sifyrinchio; bulbis rotundis, tunicatis, vii. 13. N. B. Λωτος λευκοιος, alia planta cum Anthemio enumerata, vii. 9. vid. Λωτος. Diadelph.

ΛΕΥΚΟΙΟΥ ανθη δενδρον. *Class. incert.*

Semel occurrit, iv. 9.

ΛΙΒΑΝΟΣ.

Class. incert.

Οπος δακρυωδης; cum Cedro, Abiete, Pinu, ix. 1. An idem cum sequente?

1. ΛΙΒΑΝΩΤΟΣ.

ΛΙΒΑΝΩΤΙΣ.

Class. incert.

Odorifera pl. ex India, Arabia, Syria, cum Σμυρνη, Casia, &c.

iv. 6. Gummi obtinetur post germinationem, ix. 2. in M. Arabum; arbor med. magn. ramosissima, folio Απις, sed minore; fature viridi, ut Πηγανου: φλοιος λειος, ως Δαφνης, ix. 4.

2. ΛΙΒΑΝΩΤΙΣ. *Pentandr.*

ix. 12. N. B. Libanoti spec. duæ: 1. Λ. καρπιμος. 2. Λ. ακαρπος. Prioris fructus in usu; posterioris, radix: fructus vocatur καχρυς.

1. Folio Έλειοσελινου, sed majore; caule cubitali; radice crassa, alba; odore Libanoti; fructus albus, scaber, oblongus.

2. Folio Θριδακινης amaræ, sed magis scabro; radice brevi, ix. 12.

ΛΙΝΟΝ. *Pentandr.*

Φυλλα λιπαρα, (pinguia, nitentia,) viii. 7.

ΛΙΝΟΣΠΑΡΤΟΝ. *Triandr.*

Cortex πολυλοπος, cum Tilia, Vite, &c. i. 8. (vid.)

ΛΥΧΝΙΣ. *Decandr.*

Inter flores æstivos cum Diantho Armeria, Lavandula, &c. vi. 7.

1. ΛΩΤΟΣ. arb. *Polygam.*

Cortex trunci ασαρκος, cum Cedro et Cypressso, i. 8. medulla ligni dura, i. 9. lignum præ duritie enode, i. 13. Arbor in Libya frequens et optima, iv. 3. magnitudine Pyri; foliis εντομας εχουσι πρινωδεις, (marginibus ferratis,) lignum nigrum: fructus magn. Κυαμου, mutans colorem in maturando, ut uva; situ alternus, instar baccarum Myrti; dulcis gustu; eibus Lotophagorum. Species plures, iv. 4. lign. Ebena prox. v. 4. ex quo statuat, v. 5.

2. ΛΩΤΟΣ. Nymphæa. *Polyandr.*

Caulis similis Ari, Colocasias, και οι πετασοι (folia, ita ex forma πετασου, vid. vocata,) ωσαντως, πλην ελαττους, επιφυεται δ' ομοιως ο Λωτος τω τε Κυαμω, (error, ut suspicor, textus: vid. ex desc. Κυαμω supr.) παραφυεται δε φυλλον μεγα παρ' εκασου των κυαμων: flos albus, petalis angustis, liliaceis, dense stipatis, quæ cum fol occultatur intus sese inflectunt, et discum floris occultant, μετ' απανθησιν καταδυει, iv. 10. inter aromat. ix. 7.

3. ΛΩΤΟΣ. herb. *Diadelph.*

Πωδης cum Picride et Anthemio, επικαυλοφυλλος, vii. 19. genera plura, quæ differunt caulibus, floribus, foliis. Qu. an Lotus Linn. vel Trifolium, *Melilotus* ejusdem, vii. 14.

M.

ΜΑΓΥΔΑΡΙΣ. *Class. incert.*

Vox Ægyptia; cum Σιλφίω enumeratur. Vires medicæ in radicibus, i. 11.

ΜΑΛΑΧΗ. *Monadelph.*

Cultura δεινδρῶται, (Lavatera forsan arborea L.) i. 4. inter αρβραιας quæ λαχανη vocantur: δει πυρωσεως, (igni coquatur necesse est,) cum Τευτλιδι et Λαπαθῶ, vii. 7. επετειοκαυλος, vii. 8.

ΜΑΛΙΝΑΘΑΛΛΗ. *Triandr.*

Foliis Cyperi; radix bulbosa, magnitudine Mespili, sine nucleo, vel cortice crasso; gustu dulcis; edulis, vel cocta in jure, vel in τραγημασι, (bellariis.) Hab. Ægypt. iv. 10.

ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ. *Pentandr.*

Ναρθηκωδης, cum Helleboro, vi. 2. Vires foliorum in ulceribus; radicis ad morbos cutaneos; succûs in podagra, ix. 10.

ΜΑΡΑΘΡΟΝ. *Pentandr.*

Γυμνοσπερμον, i. 18. vii. 3. succus fragrans, i. 19. ναρθηκωδες, (caule fistuloso,) νευροκαυλον, (striato,) vi. 1. cum Κωνειῶ et Mandragora, vi. 2.

ΜΕΛΑΜΠΤΡΟΣ Ποντικός. *Didynam.*

Crescit una cum Tritico, viii. 8.

ΜΕΛΑΝΙΟΝ. *Syngen.*

Vid. Ιον, Ιωνια. Inter σεφανωτικά πωδη, vi. 6. inter æstivos flores, cum Oenanthæ, vi. 7.

ΜΕΛΕΑ.*Diand. et Polygam.*

Hab. in planis Macedoniæ, iii. 4. fructificat æstate, cum Σφενδαμνω, iii. 6. cito crescit, iii. 7. πυκνορρίζα, ib.

Spec. duæ : 1^{ma}. M. ευμηκης. 2^{da}. M. ταπεινότερα. iii. 11. folia amborum, φυλλορρόεντα αφ' ἑνός μισχου, (pinnata, cum lobis decidentia,) φυλλα (lobi finguli) Lauri fimiles, apice acutiores, et margine ferrato, περι μίαν, οἶον κατὰ γόνυ, συζυγίαν, (ex adverso, pedunculo communi juncta,) τὰ φυλλα δὲ καθ' ἑκάστον πεφυκε, (lobi separatim producuntur,) συχῶν ισχυσῶν τῶν συζυγιῶν, (crebris paribus lorum,) ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῆς Οἰης. Fructus in lobo tenui compresso, φέρει δ' ἕτερόν τε ἀλλὰ, οἶον βρύα· ἑκάστα καθ' αὐτὸ σφαιροειδῆ, (sc. flores masculi,) τὰ μὲν περι τῶν καρπῶν· τὰ δ' ἀπηρτημένα πολυ, (valde distantia.) N. B. Fraxinus secundum Linn. floribus hermaphroditis et fœminis; apud Botanicos recentiores, ut Genus Diandrum.

1. M. ευμηκης· ξυλῶ, λευκῶ, ευῖνῶ, (vid.) ανοζοτέρῳ, σκληρῶ.

2. M. ταπεινότερα, ἡττον ευαυξῆς, ξυλῶ ξανδοτέρῳ τραχυτέρῳ.

N. B. Prior vocatur Βημελία, Fl. Græca, fasc. 1.

ΜΕΛΙΑΣ σίτος.*Octandr.*

Inter ποωδή cum Loto L. semel occurrit; variat habitu secundum loca, vii. 14.

ΜΕΛΙΛΩΤΟΣ.*Diadelph.*

Enumeratur cum Loto; herba varians habitu secundum loca, vii. 14. de C. Pl. l. vi.

ΜΕΛΙΝΟΣ.*Triandr.*

Inter σιτωδή, cum Cenchro, viii. 3.

ΜΕΛΙΣΣΟΦΥΛΛΟΝ.*Polyandr.*

Inter ποωδεις ανακανθας, quæ foliis maxime differunt, cum Conyza, &c. vi. 1.

ΜΕΣΠΙΛΗ.*Icosandr.*

Spec. tres. 1. M. ανθηδων. 2. M. σητανειος. 3. M. ανθηδονοειδης.

1. Drupa major, luteo-alba, laxa, (χαυνα.)

2, 3. Drupa minore, saporis melioris, sed succo astringenti. Omnium flores amygdalini, albi; folia πολυσχιδη, (lobata,) και επ' ακρω σελινοειδη, μειζοσι σχημασι, τετανα, (divisuris σελινου, sed majoribus) περικεχαραγμενα ολον, (undique ferrata,) pedunculo tenui, longo: lign. firmum; folia rubescunt valde autumnno, iii. 12.

ΜΗΔΙΚΗ.*Diadelph.*

Μισοκοπρος, viii. 8.

ΜΗΚΩΝ.*Polyandr.*

Sempervirens, i. 15. Αγγειοσπερμος, 1. 18. succus spissus, (οπωδης,) i. 19.

ΜΗΛΕΑ ΜΗΔΙΚΗ.*Polyadelph.*

Ανθες ηλακατη, (pistillo Bot.) in medio, i. 22.

ΜΗΛΕΑ ΠΕΡΣΙΚΗ.*Polyadelph.* i. 22.**ΜΗΛΕΑ.***Icosandr.*

Arbor μονοσελεχης, (trunco simplici,) αγωγη μονον, ("by training,") i. 5. cortice lævi, i. 8. medulla carnosæ; ολιγορριζα και επιλολαιορριζα, i. 19. οζοι ομοιοι θηριων προσωποις, (in venis ligni, ut videtur? vel facie externa) εις μεγαλος και περι αυτον, πλειονες, i. 13. foliis carnosis, Pyri longioribus, i. 16. flos φυλλωδης, (polypetalus,) i. 21. flos superus, Bot. i. 22. fructificatio εκ των ενων κλαδων, (ex furculis prioris anni,) i. 23. varietates plurimæ, cultæ, i. 24. Spec. duæ, verna et ferotina, ii. 1. ferendo degenerat, ii. 3. προμοσχευεται επ' αυτων των δενδρων, (infitione propagatur,) ii. 7. Hab. in planis Macedoniæ, iii. 4. οψιελασος, ib. fructus maturatur αμα πρωτοις ψυχροις, iii. 6. Lignum vermibus minus obnoxium, iv. 16. Hab. Ponto, iv. 4.

ΜΗΛΩΘΡΟΝ.*Class. incert.*

Inter φρυγανα ανακανθα, cum Cisto; fine desc. vi. 1.

ΜΗΝΙΑΝΘΕΣ.*Pentandr.*

Palustre gen. in paludibus lacûs Orchomeni, iv. 11. fine desc.

ΜΙΛΟΣ.*Diæcia.*

In montibus Macedoniæ, iii. 4. οψιελασος, iii. 6. magn.

maximæ, iii. 7. Genus simplex, foliis Ελατης, (Fir-tree,) πολυμασχαλος, (vid. μασχαλη,) lignum flavo-rubescens, totum cor; fructus ruber, Piso major, tener: folia equis lethalia; non tamen pecoribus, iii. 10. amat umbrosa loca, iv. 1. lign. ad opera sculptilia, v. 8.

ΜΙΝΘΑ.

Didynam.

Cum Sifymbrio et aliis, quorum folia et ramuli odoriferi, vi. 7.

ΜΝΑΣΙΟΝ.

ΜΝΑΤΣΙΟΝ.

Class. incert.

Pl. ποωδης, edulis, gustu dulcis: affinis Σαρι, iv. 9. N. B. Ambo voces Ægyptiacæ.

ΜΤΑΚΑΝΘΟΣ.

Class. incert. vi. 4.

ΜΤΚΗΣ.

Cryptog.

Caulis όμαλης? forsan lævis et fungosus. Spec. Agarici, vel Boleti stipitati, cum Hydno, i. 8.

ΜΤΚΗΣ λιθινος.

Lithoph.

Απολιθεται υπό τῆς Ἡλίου. Hab. Mare Rubrum, iv. 8.

ΜΤΟΦΟΝΟΝ.

Class. incert.

Caulis fistulosus, vi. 2. Μαραθρου affinis species, ib.

ΜΤΡΙΚΗ.

Diœcia.

Sempervirens, i. 15. iii. 4. crassifolia, i. 16. N. B. Species arborea occurrit in insula Maris Rubri, Τυλος dict. v. 6.

ΜΤΡΡΙΣ.

Class. incert.

Λαχανον ευσομον; enumeratur cum Anetho et Fæniculo; de C. Pl. vi.

ΜΤΡΡΙΝΟΣ.

ΜΤΡΤΟΣ.

Icosandr.

Frutex, i. 4. sempervirens, 1. 15. flores superi, Bot. i. 22. in

fureulis anni prioris, i. 23. var. plurimæ, 1. 24. germinat εκ τῶν ἀκρῶν καὶ εκ τῶν πλαγιῶν, iii. 7. baccæ vinosæ. Spec. Μικρομυρτος dict. de C. Pl. vi.

ΜΩΛΥ.*Hexandr.*

Radix bulbosa, instar Κρομμυς; foliis Scyllæ. Hab. M. Cyllenio, et ad Pheneum, ix. 15.

N.**ΝΑΙΡΟΣ.***Class. incert.*

Hinc fit unguentum ναιρον dict. ix. 7. Differt a Ναρδῳ, quia in eodem catalogo simul recensentur, ib.

ΝΑΠΥ.*Tetradyn.*

Succus δριμύς, (austerus, pungens,) i. 19. spec. επισπορά, (vid.) vii. 1. ελλοβοσπερμον, (angiospermus,) cum Ραφανιδι καὶ Γογγυλιδι, vii. 3.

ΝΑΡΔΟΣ.**ΝΑΡΤΟΣ.***Polygam.*

Andropogonis spec. ex India: vid. Act. Soc. Reg. Londini 1790. Semel occurrit. Unguentum ναρτη dict. ix. 7.

ΝΑΡΘΗΞ.*Pentandr.*

Pl. affinis Καλαμου, μητρὰ ὑμένωδει, (medulla caulis dissepimentis divisa,) caule fistuloso striato; μονοκαυλος, γονατωδής; foliis amplexicaulibus, πολυσχιδεσι, (profunde et multum divisis,) ὥς εἶναι τριχωδῆ, (linearia Bot.) Flores lutei, parvi, Anethi similes. Caulis ἐξ ἀκροῦ σχίζεται, (sursum ramosus est,) καρπῷ ἐν τοῖς παρακαυλίζουσι, (ramulis lateralibus?) radix fusiformis Bot. vi. 2.

ΝΑΡΘΗΚΤΙΑ.*Pentandr.*

Affinis, sed minor, vi. 2.

ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ.*Hexandr.*

Affinis Λειριου; foliis radicalibus Asphodeli similibus, sed lati-

oribus; καυλος (scapus) αφυλλος, ανθει εξ ακρου εν υμενι τινι, (spatha membranacea Bot.) καθαπερ εν αγγειω καρπος (pericarpium) magnum, oblongum; radix carnosa, oblonga, vi. 6. floret vere primo cum Λειριω και Βολβοκωδιω, vi. 7. vii. 12.

ΝΗΛΕΙΑ?

Class. incert.

N. B. Semel occurrit. Suspicio ibi legendum pro Ανδραχνη, Νηλεια; Ανδραχνη ελεια; A. paludosa, i. 8.

ΝΗΠΕΝΘΕΣ.

Class. incert.

Nomen Poeticum, ut videtur: Plantæ narcoticæ, forsan Papaveris, somniferi Linn. Hab. Τυρρηνια, ix. 15.

ΝΥΜΦΑΙΑ.

Polyandr.

Succus dulcis: hab. in lacubus et aquosis Orchomeni, Creta, Bæotia &c. ab Ægyptiis Μαδωναίιν vocatur. Bulbus edulis; folia rotunda, natantia; vires stypticæ, ix. 13.

Ξ.

ΞΕΙΡΙΣ. }
ΞΙΡΙΣ. }

Triandr.

Vid. Ιρις, ix. 9. si non Genus diversum.

ΞΙΦΙΟΝ. }
ΞΙΦΟΣ. }

Triandr.

Enumeratur cum Asphodelo: folia ensiformia; radix bulbosa, vii. 12.

Ο.

ΟΗ. }
ΟΙΗ. }
ΟΥΗ. }

Icosandr.

Fervori solis exposita ακαρπος γινεται, ii. 3. statu sylvestri fructus dulcior, iii. 3. επιπολαιοριζος, iii. 7. Spec. duæ: 1. Ο. αρ-

ῥην. 2. Ο. Σηλεια. Fructus variat figura, oblonga, ovata, rotunda ; folia pinnata ; flores in racemo, iii. 12.

OINANΘΗ.*Hexandr.*

Spec. ποωδης. Inter σεφανωτικά cum Ιωνια, Διος ανθει, Ἡμερο-καλλιδι, vi. 7.

OINAPOS ?*Class. incert.*

Affinis Andrachnes, sempervirens, ramorum partibus inferioribus nudis, i. 15. Forfan legendum Ανδρ. οιναρως.

OINOΘΗΡΑ.*Class. incert.*

Foliis Amygdali, sed latioribus ; floribus rubris, vel rosaceis ; radice magna, rubra. Radix exsiccata vinum olet, unde nomen, ix. 21. Hab. in montibus, ib.

OΙΣΟΣ, vel Ισος.*Pentandr.*

Spec. duæ : 1. Ο. μελας. 2. Ο. λευκος ; ita dict. a colore fructûs, iii. 17. foliis et ramulis tenuioribus, ib. N. B. In Cod. Aldini legitur Ισον.

ΟΚΙΜΟΣ.**ΟΚΤΜΟΣ.***Didyn.*

Radix lignosa, i. 9. caulis foliosus, i. 16. inter επισπορα τριτοις αροτοις, (quæ feruntur ter in anno,) vii. 1. propagatur απο βλα-των, (" slips,") vii. 2. radix fusiformis, ib. floret successive ; τα κατω πρωτον, vii. 3. εμφλοιουσπερμος, (vid.) vii. 3, 6.

ΟΛΙΒΑΝΟΣ.*Class. incert.*

Enumeratur inter plantas balsamiferas Arabiæ, ix. 4. Forfan legendum ὁ Λιβανος. Gummi vocatur Olibanum.

ΟΛΟΣΧΟΙΝΟΣ. vid. Σχοινος.**ΟΛΤΡΑ.***Triandr.*

Habitu Tritici, πρωϊσπορος, viii. 1. καρπος πολυλοπος, (semen

glumis numerosis tectum,) cum Τιφη, viii. 4. μαλακωτέρα και ασθενεστερα Βρομου και Ζειας, viii. 9.

ONOKIXΛΗΣ. *Class. incert.*

Pl. ποωδης : cum Αφακη et Κιχωριω : floret successive, vii. 10.

ΟΝΩΝΙΣ. *Diadelph.*

Caule spinoso, πτορθακανθος, (spinis caulinis,) foliis πηγαγωδεσι, (rutæformibus,) ὡς περ σεφανου την ὁλην μορphen, (radiatim, coronæ ad instar,) flore papilionaceo; semine lobato, lobis fine dissepimento, Bot. N. B. Planta Agricolis infesta, vi. 1, 4, 5.

ΟΞΥΑ. *Monæc.*

Λεπτορρίζος, iii. 7. cortex lævis; truncus enodis: lignum ευχρουν, (bene coloratum,) firmum, venosum; folia indivisa, apice acuminata, (unde forsan nomen,) fructus lævis, βαλανωδης εν εχινω, (pericarpio fetaceo,) πλην ουχ ὡς Διος βαλανος, (non aculeis; aut non æque rigidis ac Fagi, Castaneæ,) iii. 10. ξυλον ὑγροτατον, cujus usus εις κλιναρια ενδιδοντα, (lectulos elasticos?) v. 8.

ΟΞΥΑΚΑΝΘΑ. *Icosandr.*

Sempervirens i. 15. hab. in planis Macedoniæ; floret primo vere; fructum maturat προς Πλειαδων δυσιν, iii. baccæ speciosæ, et in fertis usitatae, vi. 7.

ΟΠΟΒΑΔΣΑΜΟΝ. *Class. incert.*

Cum Libanoto, Smyrna, &c. iv. 6. N. B. Forfan vox composita ex οπος (succus) et βαλσαμον. Vid. Βαλσαμον.

ΟΡΕΟΣΕΛΙΝΟΝ. *Pentand.*

Differt ab Ἰπποσελινω et Ἐλειοσελινω, foliis similibus Κωνειου; radice tenui; fructu Anethi simili, vii. 6.

ΟΡΙΓΑΝΟΣ. *Didyn.*

Sempervirens, i. 15. succus δριμυς, (acris, astringens,) i. 19. ποωδης, ανακανθος, vi. 1.

Spec. duæ : 1. Ο. λευκη, καρπιμη.
2. Ο. μελαινα, ακαρπος.

Semen germinat 30 diebus, vii. 1. propagatur etiam a ramulis, vii. 2.

‘OPMHNON. }

‘OPMINON. }

Diandr.

Seritur vere cum Cenchro, &c. viii. 1. semen nigrum Cumini simile, amarum, viii. 7.

ΟΡΟΒΑΓΧΗ.

Class. incert.

Φθερει Οροβους δια το περιπλεκεσθαι, (circumvolvendo suffocat;) ut spec. quædam herbaceæ scandentes, sc. Polyganum, Fumaria, &c. Semel occurrit. de C. Pl. 1. v.

ΟΡΟΒΟΣ.

Diadelph.

Pl. σιτωδης, leguminosa, οψισπερμος, viii. 1. femina proxime collocata in legumine, (συμψαυουσι αλληλους,) viii. 5.

N. B. Infecti species Φαλαγγιον dicta, Orobi peculiaris, viii. 10. Siliqua cylindrica, viii. 5.

ΟΡΟΒΙΑΙΟΙ ΚΡΙΟΙ.

Diadelph.

Genus intermedium inter Ερεβινθον et Οροβον, viii. 5. nisi textus fit corruptus: hinc Linnei, Cicer, *Arietinum*, ib.

ΟΡΥΖ.

Syn. Αρνογλωσσου, vii. 10.

ΟΡΥΖΟΝ.

Hexandr.

Pl. Indica, ζων πολυν χρονον εν υδατι, (diu sub aquis vivens,) εξ ου το εψημα, (juscum vel pulmentarium Indicum conficitur;) semen simile Ζεας, εν φοβη (gluma) bivalvi; valvula exteriori cava, (vid. annot. in Ελυμον,) iv. 5. non spicata, ut Κερχρος.

ΟΡΧΙΣ.

Gynandr.

Foliis Scillæ; radice duplici, bulbiformi: quorum major mas, minor fœmina vocatur, ix. 19.

ΟΣΤΡΥΑ.

ΟΣΤΡΥΙΣ.

Monæc.

Arbor trunco nodofo, i. 13. Hab. in planis Macedoniæ, iii. 4.

ευανξης, iii. 7. affinis Fagi; folia Pyri similia, πολυῖνα, (costata, "ribbed,") semen parvum grano hordei simile: lignum durum, iii. 10.

ΟΥΗ. Vid. Οη, Ουη.

ΟΥΙΓΓΟΣ. *Class. incert.*

Fructu sub terra cum Arachidna, i. 1. radix magna carnosā; βλασος βραχυσ (statura humilis,) καρπος (tuberculum) in deliciis apud Ægyptios, i. 11.

ΟΥΙΠΠΟΣ? }
ΟΥΙΤΤΟΣ? } *Class. incert.*

Syn. prioris, i. 10. N. B. Pronuntiandum forsan Vingos, Vippos; voces Ægyptiacæ. Error textus, ut videtur.

Π.

ΠΑΔΟΣ. *Icosandr.*

Umbra gaudet, ut Μιλος, iv. 1. Semel occurrit.

ΠΑΛΙΟΥΤΡΟΣ. *Pentandr.*

Frutex, i. 4. caule spinoso, i. 8. ramulis etiam spinosis, i. 16. Hab. in planis Macedoniæ, iii. 4. pullulat primo vere, iii. 6. καρπος εν λοβω τινι, (loculo quodam,) granis 3 vel 4; folia et λοβοι προς βηχας, (adversus tussēs,) iii. 17. optimi in Libya, iv. 3. folia Loti vel Cercidis similia: fructu rotundo, rubro, iv. 4. in paludosis, iv. 9, 13. cum Βατω, (πτορθακανθος,) vid. vi. 1.

ΠΑΝΑΚΕΑ. }
ΠΑΝΑΚΕΣ. } *Pentandr. ix. 12, 15.*
ΠΑΝΑΞ. }

Spec. tres: 1. π. Ασκληπειον.

2. π. Ἡρακλειον.

3. π. Χειρωνειον.

π. 1. Foliis Θαψιας, crassis; caule nodoso: radice longa, simplici; vires eædem, ac Θαψιας.

π. 2. Foliis latioribus; radice dactyli magn. *δικρανὴ ἢ τρικρανὴ*, (bi- vel tri-cipiti,) succus pharmaceuticus, adv. *ἰσραν νόσον*, (Epilepsiam.)

π. 3. Foliis *Λαπαθοῦ* hirsutis; flore aureo; radice longa, tenui, ix. 12.

Hab. Psophidi in saxosis. N. B. *Παναξ* forsan succus inspissatus.

ΠΑΝΤΑΔΟΥΣΑ. *Class. incert.*

Planta spinosa cum Ononide, Tribulo: sine desc. vi. 4.

ΠΑΠΥΡΟΣ. *Triandr.*

Planta aquatica in profundis fluvii Nili crescens, radice carpo manûs magn. prælonga; caule (*Παπυρος* vocato) triquetro, 4 cubitos longo; *κομὴ* (panicula, *Bot.*) *αχρεία*, *ασθενεὶ καρπῷ οὐδενί*; usûs varii; ad victum humanum, ad navigia, vela, vestimenta, stragula, funes, &c. iv. 9. *ναρθηκώδης* (fistulosus) modo peculiari, vi. 2.

ΠΕΛΕΚΙΝΟΣ. *Diadelph.*

Species affinis *Αφακῆς*; ita dict. ex forma filiquæ *πελεκεως* simili, i. e. viii. 8.

ΠΕΝΤΑΠΕΤΕΣ. }
ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟΝ. } *Icosandr.*

Foliis Vitis, sed minoribus; caule tenui, repente; *κνημαῖς πυκναῖς*, (flexuris numerosis,) radice rubra, quadrangulari, ix. 14.

ΠΕΠΕΡΙ. *Diandr.*

Spec. duæ: 1. fructu rotundo: *κελύφει* (pericarpio) *σαρκώδει*, *ερυθρῷ*. 2. fructu oblongo, nigro; feminibus papaveraceis. N. B. Ambo *δερμαντικά σφοδρά*, ix. 22. Usus in medicina cum *Κωνεῖω*, ib.

ΠΕΡΔΙΚΙΟΝ. *Polygam.*

Genus herbaceum; radice magna, carnosâ, fibris numerosis: affinis *Σπαλακος* et *Κροκου*, i. 11. N. B. Ita vocatur quia perdices amant *εγκυλισθαι* αὐτῷ, ib. Nomen hodiernum Græc. *Περδικάκι*, Fl. Græc. Prodrom.

ΠΕΡΣΕΑ.

Class. incert.

Δενδρον μεγα και καλον εν Αιγυπτω, simile Pyri foliis et flore ; sempervirens, και πασαν ωραν καρπον πεπαινει, (fructus successive maturatur,) iv. 2. Enumeratur cum Συκαμινω, Βαλανω, Ακανθω, ib. fructus oblongus magn. Pyri, viridis, nucleo intus, saporis dulcis, et maxime salutaris. Lignum, ut Loti, nigrum, ib.

ΠΕΡΣΙΚΑ μηλεα.

Polyadelph.

Foliis Ανδραχνης : spinis Απιου, vel Οξυακανθης, lævissimis tamen et prælongis. Pomum quod fert inedule, sed valde fragrans, utpote et folia, quæ, cum vestibus sint reposita, vermes arcent : fructus successive maturatur. N. B. Hab. Medea, Persia. Spec. altera Μηλεα Μηδικα dicta, iv. 4. N. B. Vid. Μηλεα Μηδικα, p. 49.

ΠΕΡΣΙΚΑ ΚΑΡΥΑ. Vid. Καρυα.

ΠΕΥΚΕΔΑΝΟΝ.

Pentand.

Pl. pharmaceutica : hab. in M. Pelio, Parnasso, Laconia, Tegyæ, Clitoria, Telethrio, ix. 15. semen inutile ; sed succus in usu : Σερμαντικός valde, ix. 22.

ΠΕΥΚΗ.

Monæc.

Sylvestris naturæ, i. 6. ορδοφυης, οζωδης, (vid. οζος,) i. 8, 13. μητρα ξυλωδης· μονορριζος, μια ριζα μεγαλη, μικραις δ' απο ταυτης πλειοσι· απαραβλαστικός, i. 9. sempervirens, i. 15. σπαθοφυλλος, (foliis basi vaginatis,) i. 16. apice pungentibus, ib. femina oleosa, succus refinofus, i. 19. propagatur solum ex semine, ii. 2. iii. 1. non degenerat ferendo, ii. 3. iii. 3, 4. Dubia res apud antiquos an flos ullus, sed κυτταρου (iuli, vel amenti, Bot.) mentio, iii. 6. etiam καχρυος, iii. 7. αποκοπεισα ου βλασανει, i. 8.

Spec. duæ : 1. π. αγρια.

2. π. ήμερα.

II. αγριας. Etiam varietates duæ.

1. π. Ιδαια.

2. π. Παραλιας.

1^{ma}. Arbor procera magis et ampla.

2^{da}. Foliis tenuioribus, cortice læviore : strobilo rotundiore, cito dehiscente, iii. 10. N. B. Var. alia ακαρπος dicta ab Arcadibus

Πιτυς, ib. Folia Πευκης αυχμωδη, πεφρικοτα, (arida, erecta,) lign. ad navium latera, v. 8. etiam ad carbones, v. 10. οπος δακρυωδης, ix. 1. ῥητινη optima, ix. 2.

ΠΕΥΚΗ κωνοφορος.

iii. 10. de C. Pl. l. i. Spec. peculiaris ; forsan Pinus, *Cedrus* L.

ΠΕΥΚΗΣ τι γένος. *Monæc.*

Spec. decidua, i. 15. N. B. In hoc capite Πευκης τι γένος (quædam species Pinûs) αειφυλλον : ergo datur species decidua. Pinus, *Larix* L.

ΠΗΓΑΝΟΝ. *Decand.*

Δενδρολαχανον, i. 4. sempervirens, i. 15. propagatur απο βλα-
των, (vid.) vii. 2. nullæ species, vii. 4. μισοκοπρος, vii. 5.

ΠΙΚΡΙΣ. *Syngen.*

Πωδης, cum Anthemio et Cichorio ; επικαυλοφυλλος, vii. 9. floret per totam æstatem : succus gustu amarus valde, unde nomen, viii. 1.

ΠΙΛΟΣ. *Cryptog.*

Σφαιριον εριωδες μαλακον, iii. 8.

ΠΙΝΗ. *Cryptog.*

N. B. Πινη ut nomen generale Fungi. de Cauf. Pl. l. iii.

ΠΙΣΟΣ. *Diadelph.*

Αρχη (principium germinationis in femine) εκ του αυτου, (sc. Corculum et Plumula, Bot. ex eodem puncto,) viii. 1. επιγειο-
καυλος, foliis oblongis, viii. 3. λοβος αδιαφρακτος, (filiqua sine dissepimento, feminibus alternatim utrinque,) viii. 5. obnoxius vermi, σκωληκι, (vid.) viii. 10.

ΠΙΤΥΣ. *Monæc.*

Μητρα ξυλωδης, i. 9. arbor sempervirens, i. 15. σπαθοφυλλος, (foliis 2 vel 3 basi vaginatis,) apice pungentibus, i. 16. femina

oleosa, i. 19. propagatur ex femine, ii. 2. non degenerat ferendo, ii. 3. arbor Julifera *Bot.* iii. 6, 7. succisa perit, iii. 8. folia instar Πευκης (vid. supr.) Conus minor, i. 10. Usus ligni ad navium latera et carbones, v. 10. ῥητινη (succus "Tar" dict.) εντομας (incisionibus) extrahitur, ix. 1, 2. N. B. Πευκη κωνοφορος ita dicta forsan ex magn. Coni. Πιτυς φθειροφορος ex parvitate, ii. 3. de C. Pl. l. i.

ΠΙΤΤΙΝΗ.

Class. incert.

Περιολλοκαυλος, (planta scandens,) cum Ακαρινη, vii. 8.

ΠΙΤΤΟΥΣΑ.

ΠΙΤΤΩΝ.

Class. incert.

Inter βολβωδη cum Βολβινη, Σισυριγχιω &c. vii. 13.

ΠΛΑΤΑΝΟΣ.

Monœc.

In aquosis, i. 7. κραδαις (vid.) obnoxia; πλατοφυλλος, i. 16. βλασανει απο παρασπαδων, ("cuttings,") iii. 1. πρωϊβλασος, iii. 6. arbor rara in Italia, iv. 7. et in Ægypto, iv. 9. Specimen celebre ab Agamemnone plantatum, iv. 14. cortice ablato non moritur, (N. B. Ipse expertus sum,) ib. Lign. ψυχρον, v. 4. ad τορνειας navium, (vid.) v. 8.

ΠΟΑ.

Triandr.

Pl. paludosa in Ægypto miræ fertilitatis, iv. 10.

ΠΟΛΙΟΝ.

Class. incert.

Σαρκοφυλλον, i. 16. sempervirens; cum Heliotropio enumeratur. N. B. Nomen ex canitie foliorum.

ΠΟΛΥΠΟΔΙΟΝ.

Cryptog.

Radix hirsuta, habens κοτυληδονας, (tentacula,) ὡςπερ Πολυποδος πλεκταναι, (cirrhi,) ix. 14. folia Πτεριδος, (vid. infr. Πτερις) ου φυει σπερμα: sc. nudo oculo visibile, ix. 22.

ΠΡΑΣΙΟΝ.

Didyn.

Θαμνος πολυκλαδος, ὑποδασυς, (foliis sub-pubescentibus,) λευκος, (incanis,) foliis εντομας βαθειας (ferraturas profundas) εχουσι: ραβδοις τετραγωνοις ανδρσιν εκ διασηματων επι των καυλων,

(floribus ad intervalla verticillatim dispositis,) vi. 1, 2. Var. duæ:
1. π. πωωδης, foliis majoribus. 2. π. αυχμωδης, foliis minoribus,
glaucis, ib.

ΠΡΑΣΟΝ. *Hexand.*

Affinis Γηθου et Κρομμυου; bulbis propagatur, vii. 1.

ΠΡΑΣΟΝ ΠΟΝΤΙΟΝ. *Cryptog.*

Πλατυφυλλον παλαισιαιον, θαυμασου μεγεθους, iv. 7.

ΗΡΙΝΟΣ. *Monæc.*

Μητρα σκληροτερα, i. 9. sempervirens, i. 15. foliis παρακανθι-
ζουσι, (margine spinosis,) i. 16. Hab. montibus Macedoniæ, iii.
4, 5. ενιαυτοφορος, iii. 6. βαθυριζοτατος, iii. 7. κοκκος (galla)
rubra? iii. 8. cortex λειοτερος, (aliis) lign. compactum, tenax;
fructus βαλανωδης, sed minor glande Quercûs; ὁ νεος περικα-
ταλαμβανει τον ἐνον, (fructus recens prodit antequam fructus prio-
ris anni deciderit,) φερει παρα την βαλανον κοκκον φοινικουν, (v.
supr.) iii. 16. v. 7. lignum ad axes, et alia, v. 8.

ΠΡΟΥΜΝΟΣ. }
ΠΡΟΥΜΝΗ. } *Icosandr.*

Gummofa arbor, ix. 1. οπος δακρυωδης hujus arboris, cum Κε-
ρασω et aliis, ib.

ΠΤΕΛΕΑ. *Pentandr.*

Truncus κραδαις (vid.) obnoxia, i. 13. σρεφονται τα ὑπτια των
φυλλων μετα τροπας, i. 16. vid. Ελαια. Spec. φιλυδρα· βλασανει
απο παρασπαδων, (furculos ex radicibus emittit,) iii. 1. Hab. in
planis Macedoniæ, iii. 4. Ambigebatur de fructu Πτελεας, utpote
et Salicis et Populi, iii. 6. πρωῖβλασος, ib. παρυδρα, και ευαυξης,
iii. 7. præter folia fert βοτρυν, και θυλακωδες τι, (Perianthium
monophyllum turbinatum Linn. G. Pl. 316.) primo vere, ante-
quam folia prodeant. N. B. Θυλακος folliculus, iii. 3.

Spec duæ: 1. Πτελεα.

2. Ορειπτελεα.

ex loco natali. Folia Ulmi κεχαραγμενα ησυχη, (leviter ferrata,)

τραχεα δε, και ου·λιαν, (sub-aspera.) Arbor magna, ligno flavo, firmo, fibroso; γλισχρω (lento) totum cor; variis usibus inferviens. Spec. sterilis, αλλ' εν κωρυκεσι, (id. q. θυλακοις?) το κομμι, και θηρια αττα κωνωποειδη, (vid. Κωνωψ,) τας δε καχους ιδιας εχει πολλας, μικρας, μελαινας· εν δε ταις αλλαις χωραις ουκ επισκεπτεται, iii. 14. lignum ασραβεσατον, (vid.) ασαπες εν αερι, qu. v. 4, 5. ad cardines ligneos, v. 8. οπος δακρυωδης εν κωρυκεσι, ix. 1.

ΠΤΕΡΙΣ.*Cryptog.*

Μισοκοπρος· απολλυται δε επικοιμωμενων των προβατων, viii. 8. radix pulverisata adversus tæniam, ("tape-worm.") Hab. Ægyptia, Arabia, &c. ix. 22. Desc. nulla, sed nomen certe ex forma folii πτερυγα æmulante.

ΠΥΓΟΣ ?*Class. incert.*

Semel occurrit, et, ut videtur, ex errore textûs, pro Φηγος. Enumeratur cum Πυξω, iii. 4.

1. ΠΥΞΟΣ.*Monæc.*

Lign. ponderosum, i. 8. fine μητρα, i. 9. ανοζος, i. 13. semper-virens, i. 15. ευαυξης, iii. 4, 7. foliis Myrti, iii. 15. amat frigida et montuosa loca, ib. Flores abundant melle, sed pravi saporis, ib. Lign. in aqua subsidens, v. 4. utile ad statuas faciendas, v. 5. item εις αξονας, και ἐλκηθρα τοις αροτοις, (vid.) v. 8.

2. ΠΥΞΟΣ.*Cryptog.*

Cum Μυκητι, (Agarico L.) Κρανιω, (Lycoperdoni L.) i. 9.

ΠΥΡΟΣ.*Triandr.*

Caulis ινοφλοιος, (cuticula fibrosa,) i. 8. πυκνορριζος, i. 9. ενυμενισπερμος, (femen in gluma membranacea,) i. 18. mutatio fabulosa in Αιραν, ii. 5. πρωϊσπορος, viii. semen germinat ἑκατερον εξ ἑκατερου του ακρου, (Corculum ex uno apice, plumula ex altero Bot.) viii. 2. maturatur semen 40 dies μετ' απανθησιν, viii. 3. semen εν χιτωσι πολλοις, (glumis) σαχυσ ασοιχος, (opp. ordine regulari feminum in spica hordeacea,) viii. 11. Var. cultæ Tritici hæ.

π. Λιβυκος.

π. Αλεξανδρειος.

π. Ποντικός.

π. Ασσυριος.

π. Θρακικός.

π. Αιγυπτιος.

π. Καγχρυδίας.

π. Σικελικός.

N. B. π. Σικελικός omnium βαρυτατος, viii. 4, 5. Grana Πυ-
ρου fervantur 30 vel 40 annos.

P.

ΠΑΜΝΟΣ ἡ.

Pentandr.

Fruticosa. Spec. duæ: 1. ῥ. λευκή. 2. ῥ. μελαινα; fructûs co-
lore discrepantes: ambo spinosæ, iii. 17. αειφυλλος. de C. Pl. i.
Lignum durum ad εσχαραν πυρείας utile, (vid.) v. 10.

ΠΑΦΑΝΙΣ.

Tetradyn.

Δενδρου φυσιν εχων, i. 4. radix σαρκωδης, i. 9. vii. 3. corticata,
i. 10. inter λαχανα culta, cujus satio μετα τροπας χειμερινας,
vii. 1. radix μια, μακρα, παχεια, ορθη, αποφυσεσι μικραις, (radi-
culis lateralibus,) vii. 2. φλοιος αφαιρετος, (avulso facilis,) ib.
caulis πλαγιοκαρπος, (fructum ferens in ramulis lateralibus,) vii.
3. Var. cultæ plurimæ.

1. ῥ. Καρινθια.

4. ῥ. Κλεωνια.

2. ῥ. Λειοθαλασσια.

5. ῥ. Ευζωμος.

3. ῥ. Βοιωτια.

N. 1. Ευαυξεσατης, ῥιζα γυμνη, i. e. εξω της γης.

N. 2. Aliter λειοθασια vel Θρακικα; var. ισχυρος adversum
hyemem.

N. 3. Radice orbiculari, succo dulci.

N. 4. Radice μακρα, (longa.)

N. 5. Foliis Ευζωμου.

N. B. Species, foliis lævioribus, dulciores. vii. 4.

ΠΑΦΑΝΟΣ.

Tetradyn.

Μονορριζος, (sed non σαρκορριζος,) i. 9. sempervirens, i. 15.

σαρκοφυλλος, i. 16. αλλον τροπον σαρκωδης· εν πλατει, ουκ εν
 σρογγυλοτητι, (folia carnosā, cum expansione,) ακροκαρπος, και
 πλαγιοκαρπος, i. 23. odor noxius Viti, iv. 20. feritur μετα πρω-
 τοις αροτοις, vii. 1. Var. tres.

1. ρ. ουλοφυλλος.

2. ρ. λειοφυλλος.

3. ρ. αγρια.

Foliorum προσδεσις πλατεια, (ima pars pedunculi folii expan-
 ditur, et caulem amplectitur,) vii. 6.

‘ΡΟΔΟΝ. }

‘ΡΟΔΩΝΙΑ. }

Icosandr.

Frutex sempervirens, i. 15. Flores superi Bot. i. 22. πτορδα-
 κανδος, (ramis spinosis,) vi. 1. propagatur quandoque ex semine :
 sæpius κατακοπτοντες τον καυλον εμφυτευουσι, vi. 6. Var. plu-
 rimæ.

1. πενταφυλλα.

3. εικοσιφυλλα.

2. δωδεκαφυλλα.

4. εκατονταφυλλα.

‘ΡΟΔΟΥ ανθει δενδρον. *Class. incert.*

Arbor πολυφυλλος, flore Rosæ, nocte clauditur ; unde dicitur
 καθευδειν, iv. 9.

‘ΡΟΙΑ. }

‘ΡΟΑ. }

Icosandr.

Arbor mediæ magn. cum Μηλεα, i. 4. βραχυσελεχης, i. 8.
 μητρα σαρκωδης ; radices horizontales, i. 9. truncus parte supe-
 riore major, i. 14. σενοφυλλος, i. 16. sapor fructus acidus, i. 19.
 flores punicei, i. 21. superi, i. 22. floret in furculis prioris anni,
 i. 22, 23. Pericarpium vel fructus, humidus, εχων τα ανω μυ-
 χωδη, (de loculamentis Pericarpii. L. G. Pl. 618^a.) Var. plurimæ.
 Serendo degenerat, ii. 3. Germinat bis in anno, iii. 7. βραχυ-
 ξιος, iv. 14. πτορδακανδος statu sylvestri, vi. 1.

^a Φανερωτατα δε τη κιχωρισθαι τα (περικαρπια) της ‘Ροιας, (de Pomo Puni-
 cæ novemloculari L. G. Pl. 618.) i. 18.

ῬΟΥΣ.*Pentandr.*

Spec. duæ: 1. ῥ. ἀρρήν. 2. ῥ. θηλεία. Folia amborum ὅμοια Πτελέας, sed longiora, pubescentia, τῶν δὲ κλωνίων τῶν νέων ἐξ ἴσου τὰ φύλλα εἰς δύο, (foliis pinnatis per paria opposita,) καταληλά δὲ, (folia ipsa alterna,) βαπτουσι τέτοις οἱ σκυτοδεψικοὶ τὰ λευκά δερμάτα, (coriarii utuntur hisce ad coria depilanda,) ὀλιγορρίζος, ἐπιπολαιόριζος. Lign. sine medulla, iii. 18.

ῬΥΤΡΟΣ.*Class. incert.*

Planta ἀκάνθωδης, Κνίκου affinis, ἀνωθεν ἀποφύσεις ἔχων, (vid. ἀποφύσεις,) semel occurrit, vi. 3.

Σ.**ΣΑΡΙΤΟ.***Triandr.*

Vox Ægyptia: Pl. palustris, cum Πάπυρω et Μνάσιω; nascitur post Nili inundationem: radix dura, contorta; caulis (σαρίον dict.) bicubitalis, magn. pollicaris, triqueter. Panicula laxa, instar Papyri: succus dulcis, manducando ab incolis expressus: radix ad carbonandum optima, iv. 9.

ΣΕΛΙΝΟΝ.*Pentandr.*

Sempervirens, i. 15. caulis foliosus, i. 16. ευωδής, i. 19. affinis Anethi et Fænicali; radix fusiformis, i. 9. Planta herbacea, loca irrigua amans, iv. 9. feritur μεθ' ἡλίου τροπᾶς, δευτέροις αῤοτοῖς, (autumno,) semen δυσφύεσται παντῶν, (tardissime germinans,) vii. 5. non transplantatur, ib.

ΣΕΣΕΛΙ.*Pentandr.*

Enumeratur cum Aristolochia et Hipposelino: vires pharmaceuticæ. Hab. montibus Arcadiæ, Tegeæ, Clitoriae, Telethrii, ix. 15.

ΣΗΜΥΔΑ.

Monæc.

Arbor mediæ magn. cum Alno: foliis Coryli, sed augustioribus: cortex verficolor: lignum leve ad baculos faciendos, iii. 14.

ΣΗΣΑΜΟΝ.

Didyn.

Pericarpium peculiare, i. 18. Inter ανωνυμα κοινή προσηγορία cum Κεγχρω et Ελυμω, viii. 1. semen germinat cito; cum Eryfimo enumeratur, ut affinis, ανθει φυλλωδει, (flore monopetalo, in quo differt a Κεγχρω, cujus flos χνοωδης,) πολυκαρποτατος, viii. 3. femina non comeduntur cruda, viii. 7.

ΣΙΔΗ.

Class. incert.

Species aquatica, ita vocata ex similitudine fructûs σιδιω, vel pomo Mali, granati. Pericarpium desc. ὡς κυτινωδες τι τοιουτον πλην μειζω, (vid. κυτινος,) μεγαθει δε ὅλος ὁ ογκος ἡλικον μηλον· φυλλοις ποωδεσι εξωθεν παραπλησια τοις των Ῥοδων, τετταρα τον αριθμον. Intus κοκκας ερυθρους εχει, rotundos, parvos; succus aquosus. Flos ὁμοιος Ῥοδου καλυκι, (q. an calyci?) sed duplo major, aquis innatans utpote et folium. Pericarpium maturum κατακλινει εις το ὕδωρ και συναπτει επι τη γη, unde femina germinant, iv. 11.

ΣΙΚΤΑ.

Monæc.

Δενδρου ὕψος εχει, (sp. habitu valde luxurians et altissime scandens loco natali.) de C. Pl. l. v. Cum Σικυω, i. 22.

ΣΙΚΤΟΣ.

Monæc.

Succus aquosus, i. 19. flores superi, l. 22. feritur æstate, vii. 1. semen germinat diebus sex, ib. βραχυριζος, (radicibus tenuibus,) floret longum tempus, και επιβλασκει, (ramulos novos profert,) vii. 3. Var. cultæ.

1. σ. Λακωνικη.

2. σ. Σκυταλεα.

3. σ. Βοιωτικη.

Irrigatione gaudet, vii. 4, 5. κονιορτώ maturatur. Vid. κονιασις. de C. Pl. iii.

ΣΙΚΤΟΣ αγριος. *Monœc.*

Spec. perennis, vii. 10.

ΣΙΑΦΙΟΝ. *Pentandr.*

Radix magna, carnosâ, pharmaceutica, i. 11. fylvestr. naturæ, iii. 3. Hab. Cyrene, iv. 3. caulis fistulosus peculiari modo: habitus Papyri, vi. 2. radix cubitum longa: folia, μασπετα dict. Σελίνου similia, sed majora: semina lata, φυλλωδη, (membrana cincta,) vii. 3. επετειοκαυλον, (perenne.) Vere comeditur salutis causa, cruda, vel cocta. Porcos mire faginat. Succus duplex respectu virium; caulinus et radicalis. Athenis in vasibus farinâ mixtus venditur. Hab. Libya περι την Συρτιν, ὑπ' Ευεσπεριδων, vi. 3. semen latum Ανδραφαξυος simile, membrana ad margines, vii. 3.

ΣΙΣΤΜΒΡΙΟΝ. *Tetrandr.*

Ανθος ἄπλον τοις εἶδεσι, (forsan unicolor, vel herbaceus,) enumeratur cum Ἐρπυλλῶ et Ἐλενιῶ, vi. 6. raro provenit ex femine, vi. 7.

ΣΙΣΤΡΙΓΧΙΟΝ. *Triandr.*

Enumeratur cum Asphodelo; folia radicalia, i. 16. Planta bulbosa, bulbis non tunicatis: affinis Leucojo, vii. 13.

ΣΙΤΟΣ. *Triandr.*

Πρωσει τη ὑπαρχουση αυξανεται, (sensim, et sine nova germinatione, εξ ακρου sese producit crescendo,) iii. 7. Vid. Πυρος.

ΣΚΑΜΜΩΝΙΑ. *Pentandr.*

Amat loca frigida; enumeratur cum Absinthio, Helleboro, et aliis montanis, iv. 6. φαρμακωδης τη ρίζα, ib. radix gummosa, ix. 1. gummi, vel σπος inter medicamenta, ix, 10, 22.

ΣΚΑΝΔΙΞ.

Pentandr.

Planta herbacea, επετειοκαυλος, (perennis,) cum Σικυω αγριω, vii. 8.

ΣΚΙΛΛΑ. }

ΣΚΥΛΛΑ. }

Hexandr.

In marinis, et arenosis prope mare, i. 7. radix corticata et tunicata, i. 10. vii. 9. folia αμισχα, (sessilia, Bot.) longa, nitentia, Asphodeli latiora, ευδιαιρετα, vii. 12. Spec. duæ: 1. σ. φαρμακωδης. 2. σ. επιμενιδειος, vii. 11.

ΣΚΟΛΤΜΟΣ.

Syngen.

Foliis non spinosis, vi. 3. radix edulis cruda et cocta: optima hyeme, vi. 4. floret vere cum Σικυω αγριω, viii. 10. ακολουθα τα ασρα, ut Heliotropium, vii. 14.

ΣΚΟΛΤΜΩΔΗΣ τις. *Class. incert.*

Οποσεικστιατικός, (maniam inducens.) Hab. Tegea, ix 13.

ΣΚΟΡΟΔΟΝ.

Hexandr.

Enumeratur cum Κρομμυω, Σκιλλα, &c. i. 16. Var. plurimæ, distinguendæ foliis et radicibus, vii. 4. sc.

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 1. σκ. πρωϊον. | 4. σκ. αλευ γελχιδων, ib. |
| 2. σκ. οψιμον. | 5. σκ. λειοκαυλον. vii. 8. |
| 3. σκ. Κυπριον. | |

ΣΚΟΡΠΙΟΣ.

Class. incert.

Cum Asparago sylvestri enumeratur, florens autumnno: flos εν τω σαρκωδει τω εξοιδεντι υπο το ακρον της ακανου, (textus corruptus: forf. επι το ακρον, sc. ex summitate Pericarpium,) vi. 3. flores primo albi, dein purpurascens: radix simplex brevis, intorta Scorpii caudæ similis, unde nomen. Vires alexipharmacæ, ix. 14.

ΣΚΥΘΙΚΗ ΠΙΖΑ. *Class. incert.*

Forſan Glycyrrhiza L. ſuccus dulcis; Ευδυγλυκεια alio nomine;
vires ad aſthmata et tuſſes. Hab. Mæotis. Deſc. nulla, ix. 13.

1. ΣΜΙΛΑΞ.*Diæcia.*

Species επαλλοκαυλος, (vid.) caule ſpinoſo; ſpinis rectis; foliis
hederaceis; νοτηρῶ τινι κατὰ τὴν τε μίſχῃ προσφυſιν, (glandula
ad baſin pedunculi?) ἰδίον δε, ὅτι τὴν διαμέσθ ῥαχίν (nervum folii
intermedium) εἶχει, καὶ τὰς ſημνίδς διαληψείς, (nervos ſtamíneos,
vel intermedios,) ἐκ ἀπο ταύτης, (non pervenientes ex ipſo nervo
centrali,) ἀλλὰ περὶ αὐτὴν περιφερῶς ἡγμένας, (lineis concentricis
ductos,) ἰούλος ἐλίκτος, (cirrhus volubilis,) ἀνθός ευωδής, λειρίνον
καρπός ſφυφνς, in ſummis ramulis, iil. 18. folia εἰς ὄξυ προηκόντα
παρακάνθιζοντα, i. 16.

2. ΣΜΙΛΑΞ.*Diæc.*

Spec. Quercus ab Arcadibus ſic dicta; ἀνάμεſον Πρίνς καὶ
Δρυός, iv. 7.

ΣΜΥΡΝΑ.*Class. incert.*

Arbor odorifera maxime; hab. India, Arabia, Syria, iv. 6. ὀπός
δακρυώδης, (gummoſus,) ix. 1. colligitur ὑπο Κυνά, (“in the
Dog-days,”) ix. 2. cum ſucco Λιζανώτς; arb. mediæ magn. trunco
nodoſo, flexuoſo; furæ magn. cortice ſpinoſo, ſcabro; folio Oleæ-
formi, ix. 4, 7.

ΣΟΓΧΟΣ.*Syngen.*

Planta ακανθώδης, ακανῶ (capitulo) lævi, affinis Στρεβίου,
vi. 3. radix carnoſa, edulis; ακανός oblongus, poſt florefcentiam
εκπαπθμενός, (pappo coronatus,) folium arefactione διαχέεται,
(laxum fit,) καὶ οὐ κεντεῖ, iv. 4.

ΣΠΑΛΑΞ.*Class. incert.*

Enumeratur cum Croco et Περδικίῳ, radice magna, carnoſa,
i. 11. an id. quod Αſπάλλαθος? cujus ſuccus aromaticus, ix. 7.

ΣΠΕΙΡΑΙΑ.*Class. incert.*

Spec. ακροκαρπος cum Ερεικα, i. 23. affinis Marrubii, &c.
vi. 1.

ΣΠΟΔΙΑ.

Syn. Κοκκυμηλιας.

ΣΤΕΛΕΦΟΥΡΟΣ.*Triandr.*

Spica cylindrica, æquali, florens simul per totam spicam, ut
Triticum; nomen ex figura spicæ: enumeratur cum Alopecuro,
vii. 10.

ΣΤΕΛΙΣ.*Class. incert.*

Cum Ιξια et Υφρατι. de C. Pl. ii. p. 155.

ΣΤΟΙΒΗ.*Syngen.*

Foliis carnosiss, i. 16. παρ' ακανθαν ετερον εχων φυλλον, a qui-
busdam dicta Φεως, vi. 1. Enumeratur cum Ononidi, Tribolo,
ib.

ΣΤΡΟΥΘΙΟΣ.*Class. incert.*

Species φυλλακανθωδης: capitulo lævi, ut Σογχος, vi. 3.

ΣΤΡΥΧΝΟΣ.*Pentandr.*

Ab aliis Ευηπατον radix edulis cocta et cruda, vii. 6. Var.
tres.

1. Fr. dulci, eduli.

2. Fr. narcotico.

3. Fr. lethali, vel maniam ind. vii. 14.

N. 1. non describitur.

N. 2. Radix recens alba; arefacta rubra: foliis Tithymalli:
vires in cortice radicis.

N. 3. Dicta Θρυορος, radice magna, intus cava, ix. 12. Hab.
M. Pelion, Ossa, Tegea.

ΣΤΥΡΑΞ.*Monæc.*

Enumeratur inter aromata Mediæ et Indiæ. Fructus, vel Gum-
mi solum occurrit, ix. 7.

ΣΥΚΑΜΙΝΟΣ.

Monœc.

Μητρα σκληρότατα, utpote et lignum totum; instar Ebeni et Loti, i. 9. arbor decidua, bacca οινωδει, i. 19. flos flamineus, i. 21. εν αυτοις τοις ὅλοις περικαρπιοις; non in apicibus, ουδ' εν τοις περι-
ειληφοσι καθ' ἑκάστων, ἀλλ' εν τοις παραμεσον, ib. Textus hic
corruptus valde. De fructu tenello Mori, *nigræ* L. cum flosculis
fœmineis granulis singulis insidentibus? Comparatur cum Hede-
ra, i. 22. ex ligno *θερμῷ* (vid.) arb. hujus fiunt terebra *πυρρείας*,
(vid.) *ικρία* navium, (opera sculptilia,) *και σεφαναι*, v. 7, 8.

1. ΣΥΚΗ.

Polygam.

Amputatione eget, i. 5. *βραχυσελεχης*, *λειοφλοιός*, cortice *μό-
νολοπῷ*: (vid.) lignum carnosum, molle, porosum, i. 8. Medulla
carnosa; radix horizontalis, i. 9, 11. lignum trunci sine nodis,
i. 13. *πλατυφυλλος*, i. 16. fructus saporis mellei, *οπωδης*, (*spis-
sus*;) ut *Papaveris*, i. 19. fructificat ex furculis ejusdem anni,
i. 23. Cultura eget, ut *aliæ fructiferæ spec.* i. 22. Serendo dege-
nerat, ii. 3. *προμοσχευεται επ' αυτων των δενδρων*, (inferendo cul-
tæ species propagantur,) *φυτευεται δε* (etiam furculis propagatur,
vel ex ramis, vel *κραδαις* trunci, ii. 7.) *secunda germinatio ευδη-
λος*, iii. 6, 7. Differentia inter *Συκήν* et *Κοτινον*, (*sylvestrem et
cultam*;) iv. 14. Lign. minus obnoxium vermibus, iv. 16. Si
truncus scindatur, non perit, iv. 19. lign. *ισχυρον*, v. 7. de C. Pl.
l. v. ubi tres differentiæ occurrunt.

1. σ. *Λακωνική*.2. σ. *Λευκομφαλίδς*.3. σ. *Οπισθοκαρπιος*.De C. Pl. l. v. morbus peculiaris *ψωριασις*, vid.

2. ΣΥΚΗ Αιγυπτια.

Polygam.

Καρποφορει εκ του σελεχους, i. 23. habitus prioris; differt ta-
men modo fructificandi; fructus magn. *ficûs*, succo dulcedine
ολινθοις simili, sine granis: *επικνισθεις* (vid.) maturatur citius, ar-
bor *πολυσπος σφοδρα*; lign. utile, si statim submergatur, iv. 2.

3. ΣΥΚΗ Κυπρια.

Polygam.

Species affinis Σ. Αιγυπτιας, sed non fructificans εκ *σελεχους*,
ἀλλ' εκ *βλαστοις αφυλλοις*, ("spurs;") *δενδρον μεγα*, iv. 2.

4. ΣΥΚΗ Ινδική.

Dodecand.

Radices agit ex ramis summis, i. 12. Radices hæ terram attin-
gentes sursum sese attollunt, ποιουντες ὡσπερ δρυφρακτον, (sepi-
mentum,) ὡς γινεσθαι καθάπερ σκηνην; hoc modo arbor exten-
ditur ἐπὶ δύο σταδια: folia ampla orbiculata, clypei parvi magni.
fructus συκοειδης parvus, iv. 5. Hab. Fluvio Acefine.

5. ΣΥΚΗ Ποντια.

Mollusc.

Αφυλλος, μεγαλει ου μεγαλη, iv. 7.

ΣΦΑΙΡΙΟΝ.

1. σφ. πιλος vocat. εριωδες, μαλακον, περι πυρηνης σκληροτε-
ρον, (forf. περιπυρηνιον σκληρ. Ald.) ὡ χρωνται προς τους λυχνους,
iii. 8.

2. σφ. κομην εχον (vid.) αχρειον τ' αλλα, επιβαπτον δε χυλω
μελιτηριω κατα την ἀφην, (morbum cutis, an Lepra?) και γευσιν,
(vid.) ib.

3. σφ. αμισχον, η κοιλομισχον· ιδιον και ποικιλον· τας γαρ
εσπανηκοτας ομφαλους (εχει) επιλευκους, η επισιγμενους μελανι,
και το αναμεσον κοκκοβαφες, (sensus obscurus; sed ομφαλοι for-
san cancelli) Clathrus, cancellatus hic describi videtur, ib. Vid.
Bull. Fungi.

4. σφ. φυλλικον, συμπεπιλημενον, προμηκες, (super foliis nas-
cens? dense stipatum.)

5. σφ. λευκον, διαυγες (pellucidum) ὕδατωδες ὅταν ἀπαλον η
(primo statu gelatinosum) τελειουμενον δε σκληρυνεται, ut sæpe fit
in Boletis &c. ib.

ΣΦΑΚΕΛΟΣ.

Diandr.

Inter φρυγανα λαχανήρα fine spinis, cum Ελελισφακω, Θυμ-
ερα, Κόνυζω, vi. 1. Σφακελος, foliis minoribus, odore minus acri,
(Salvia officinalis?) Ελελισφακος e contra folio majore, odore βα-
ρυτερω. (Vid. not. ad Tab. System.) vi. 2.

ΣΦΕΝΔΑΜΝΟΣ.

Polygam.

Hab. in montibus Macedoniæ, cum Ζυγία, iii. 4. spec. sylves-
tris dicitur ανανθη ειναι, iii. 6. ευαυξης, iii. 7. ολιγορριζος, ib.
Spec. tres:

1. σφ. αγρια.

2. σφ. ζυγια.

3. σφ. κλινοτροχος.

N. 1. Lign. inutile.

N. 2. Lign. flavum, ελον, (molle? tortuosum?)

N. 3. Lign. album ευϊνον, (opp. ελω, fibris rectis,) foliis omnium lobatis instar Platani, τετανοις, (rigidis?) sed non æque carnosus, iii. 11. apice acuminatis, ib. cortice haud æque lævi ac Tiliæ, &c. υποπελιω, (leviter maculato,) radicibus paucis, horizontalibus. Hab. in locis irriguis circa Idam; flos incognitus: fructus Χαλιερη similis. N. 3. aliter Γλεινος, voc. hyemē cæditur, v. i, 4.

ΣΧΟΙΝΟΣ.

ΣΧΙΝΟΣ.

Triandr.

Planta ενυδρος. Species tres:

1. σχ. αρρήν.....οξύς, ακαρπος.

2. σχ. μελαγκρανιος } καρπιμος.
μελαγκρανις

3. σχ. ὀλοσχοινος....ευσαρκης, (folio rotundo crasso,) cujus usus maxime προς πλεγματα, ("platted Rush-work,") κερυνα δε ὁ καρπιμος, (sc. n. 2.) ἐξ αὐτου του γραμμωδους εξοιδησας, (ex medio scirpi linearis intumescens,) κα'πειτα εκτικτει καθαπερ ωα, η σρογυλοτητας, επισχαζουσας, (Pericarpia subglobosa apicehiantia,) semen nigrum ακιδωδης, (cuspidi sagittæ simile, triquetrum, acuminatum Linn. G. Pl. 67.) radix longa, crassa, iv. 13.

2. ΣΧΟΙΝΟΣ Καλαμος. Hexandr.

Radix miræ suavitatis. Hab. in Lacu Orchomeni et in Αὐλῶνι της Συριας, ix. 7. N. B. Σχοινος καὶ Καλαμος ut genera diversa notantur. de C. Pl. i. vi.

3. ΣΧΟΙΝΟΣ Λιθινος. Corall.

Haud dignoscendus a Σχοινω ipso, iv. 8.

T.

TEPEBINΘΟΣ. }
TERMINΘΟΣ. } *Diæcia.*

Species duæ : 1. τ. ἀρρῆν, ἀκαρπός.

2. τ. θηλεία,

N. 1. Arbor excelsa. Hab. mont.

Macedoniæ.

} sempervirentes, i. 15.

N. 2. Arb. humilis.

φυλλοῖς περι ἓνα μισχόν πλειοσι, (foliis pinnatis, paribus numerosissimis,) κατὰ συζυγίαν αγωνιωτέρον τῆς Οἰῆς, (vid. γωνία) τοῦ ἐξ ἀκροῦ περιττον, (folio impari, Bot.) ἀνθεῖ τῷ τῆς Ελαίας? sed coloris rubri. Ligno γλισχρῷ (vid.) utpote et fructu; succo resinoso; φερεῖ δὲ κωρυκωδὴ τινὰ κοίλα κατὰ πρὸς ἡ Πτελεα, (de amento laxo squamulis ovatis Linn. G. Pl. 1108.) τινὶ ῥητινωδὲ ἐντός, sed non inde Resina officinarum colligitur, iii. 15. ῥητινὴ ἀπέπτως λευκή, ib. Germinat primo vere, iii. 6. lignum resinosum ad alia inutile, v. 8. Incisione æstate media resina obtinetur. Mons tota in Syria Terebinthis cooperta, ix. 2.

TERMINΘΟΥ ὁμοῖος. *Class. incert.*

Similis Τερμινθε, fructu excepto. Fructus amygdaloides, gustu gratus, iv. 5.

TETPAΓΩΝΙΑ. *Pentandr.*

Οψιβλαστοτάτος· enumeratur cum Aria, iii. 6. sic dictus a forma quadrangulari Pericarpium, ib.

TETPAΛΙΞ. *Class. incert.*

Cardui species ex ordine loborum folii per paria opposita, Bot. æstate florens cum Ιξινῇ, vi. 3.

ΤΕΤΤΛΟΣ.

ΤΕΤΤΛΟΝ.

ΤΕΤΤΛΙΟΝ.

ΤΕΤΤΛΙΣ.

} *Pentandr.*

Cultura lignescit, i. 15. caulis carnosus, i. 8. radix fusiformis,

i. 9. folia *carnosa*, succo dulci, i. 16. επισπορος, (vid.) vii. 1. εμ-
φλοισσπερμος, (feminibus membranaceis tenuibus, compressis ca-
lyce involutis, Linn. G. Pl. 310.) Var. plurimæ inter cultas, vii 4.
coctione eget ad usus culinarior, vii. 6, 7.

ΤΙΓΡΙΝΟΝ ξυλον. *Class. incert.*

Ex insula Τυλω in Arabia: βαρυ σφοδρα: striis in ligno, ut
in pelle Tigridis. Usus ad baculos, v. 6.

ΤΙΘΥΜΑΛΛΟΣ. *Dodecand.*

Spec. quatuor: 1. τ. παραλιας. 3. τ. μυρτιτις.
2. τ. αρρήν. 4. τ. Συριακος.

omnes communi nomine ut plantæ πανακεις cum Στρυχνω, sc.
οι Στυχνοι, καὶ οι Τιθυμαλλοι, ix. 12. τ. παραλιας vocatur κοκκος,
folio subrotundo; caule magn. σπιθαμης; fructu albo, ib. τ. αρ-
ρήν, folio Oleæ; altitudo caulis διπηχυαιος, (bicubitalis.) τ. μυρ-
τιτις, aliis τ. λευκος, folio Myrti magn. apice spinoso: ramulis
sparsis per terram: fructus vocatur καρνον, ix. 12. τ. Συριακος,
alias Πανακης, hab. Syria: vires φαρμακευτικαὶ σφοδρα, ix. 8.
Hab. n. 1, 2, 3. Pelion, Ossa, Tegæa, Telethrium, ix. 15.

ΤΙΦΗ. *Triandr.*

Enumeratur cum Πυρω ut πυκνορρίζος, i. 9. mutatio fabulosa,
ii. 5. πρωϊσπορος æque ac Πυρος, Ζεια, Κριθη, viii. 1. maturat
femen 40 dies μετ' απανθησιν, viii. granum (vel forsan spica)
omnium maxime leve, ib.

ΤΙΦΤΟΝ. Vid. Ιφυον.

ΤΟΞΙΚΟΣ. Vid. Καλαμος.

ΤΡΑΓΑΚΑΝΘΑ. *Diadelph.*

Enumeratur cum Ιξια, ut species gummifera, ix. 1. Gummi
sponte fluit, ix. 8. Hab. Laconia, ix. 15.

ΤΡΑΓΟΠΩΓΩΝ. *Syngen.*

Caule brevi; perianthio magno; barba (πωγων) pappo longo,
πολιω, Bot. vii. 7.

1. ΤΡΙΒΟΛΟΣ. *Tetrandr.*

Species fluviatilis, εν ελωδεσι των ποταμων, (in profundis et limosis fluviorum,) folia aquis innatant, in quorum medio fructus: folia similia Πτελεας, pedunculis longissimis: caulis superne crassus, inferne tenuis, εχων αποπεφυκοτα τριχωδη, (stipulas Bot. lineares,) τα μεν πλειστα παραλληλα, (opposita,) τα δε και παραλλαττωντα, (alterna,) το μεν παραβλασημα εστι, ωσπερ καυλος αλλος, (caules secundarii magn. æquales primario,) fructus ater, και σκληρος σφοδρα, iv. 11.

2. ΤΡΙΒΟΛΟΣ. *Decandr.*

Provenit in novalibus, iii. 1. εχων παρ' ακανθον φυλλα, (spinis a folio separatis,) vi. 1. spinis ad caules, et in foliis, vi. 3. επετειοκαυλος, (species perennis,) vii. 8.

ΤΡΙΟΖΟΣ. Vid. Ακανθα.

ΤΡΙΠΟΛΙΟΝ. *Class. incert.*

Planta pharmaceutica decantata ab Homero et Hesiodo. Radix in usu, quæ nocte effodienda est εις παν πραγμα σπουδαιον (antequam res magni momenti aggredienda sit.) Desc. nulla, ix. 21.

ΤΡΙΧΟΜΑΝΕΣ. *Cryptog.*

Caule Adianti nigri; folia parva admodum, και πυκνα.

ΤΥΦΗ. *Monæc.*

Caulis αδιαφρακτος, (sine nodis,) hab. in Lacu Orchomeni, i. 8. enumeratur cum Σχοινω ιδιωτατον γενος; foliis nullis; radicibus paucis; εχων εις τα κατω την ὀρμην, (profunde radicata,) iv. 11.

Υ.

ΥΑΚΙΝΘΟΣ. *Hexandr.*

Inter σεφανωτικα. Species duæ:

ὁ. αγρια.

ὁ. σπαρτη.

Flos διαμενει, vi. 7. Hab. in montosis.

ΥΑΝΟΝ.

Cryptog.

Sub terra degit, cum Ασκιω, Ουιτω, sine radice, i. 9, 10.

ΥΛΗΜΑ τι.

Polygam.

Παθος συμβαινον αυτω ιδιον, (sensibilitas, vel irritatio peculiaris,) εαν τις αψηται των κλωνιων, τα φυλλα, ωσπερ αφαιρουμενα συμπιπτει, ειτα μετα τινα χρονον αναβιωσκει, και θαλλει. (Descriptio accuratissima του παθους *Mimosæ*, *sensitivæ* L.) folia pinnata, ramis spinosis, iv. 3.

ΥΠΟΧΟΙΡΙΣ.

Syngen.

Inter olera culta κιχωριωδη, vii. 7. foliis lævibus; succo haud æque amaro ac Cichorii: successive floret; semina φοβη (capfula vid.) involuta. Spec. ad usus humanos, vii. 11.

ΥΦΕΑΡ.

Class. incert.

Species parasitica, in arborum truncis. Enumeratur cum Ιξια, ut affinis. Amat meridionale latus; Ιξια προς βορραν, iii. 16.

Φ.

1. ΦΑΚΟΣ.

Diadelph.

Leguminis gen. Indicum, ita a Græcis sub Alexandro magno vocatum, iv. 5.

2. ΦΑΚΟΣ.

Diadelph.

Leguminis gen. οψισπορος, viii. 1. πλαγιοκαυλος: enumeratur cum Erebintho et Οροβω: omnium πολυκαρποτατος, viii. 3.

Spec. duæ: 1. φ. λευκος.

2. φ. μελας.

Prioris semina dulciora, viii. 5.

ΦΑΣΓΑΝΟΝ. Vid. Ζιφιον, vii. 11, 12.

ΦΑΣΚΟΣ.

*Cryptog.*Ὅμοιος τοῖς βραγχιοῖς ἰχθυῶν, ("Gills,") *Anne Lichen* ? iii. 9.

ΦΕΛΛΟΔΡΥΣ. }

ΦΕΛΛΟΣ. }

Monæc.

Cortice aspero, i. 8. *sempervirens*, i. 15. σρεφονταῖ τα ὑπτια τῶν φυλλῶν μετὰ τροπᾶς, (vid. *Ελαια*, p. 19. et *Lex. Theophrast.*)

Spec. duæ: 1. φ. *Αρκαδων*.2. φ. *Τυρρῆνων*.

N. 2. *arbor decidua*, iii. 16. *cortex duplex*; *exteriore αφαιρομενω* *ευθενει το δενδρον*, iv. 18.

ΦΕΩΣ.

Class. incert.

Caule et foliis spinosis, vi. 3. *folio carnosio*, cum *Ononide*, *Tribulo* &c. vi. 4.

ΦΗΓΟΣ. Vid. *Δρυς*.

ΦΙΛΑΤΡΑ.

Diandr.

Sempervirens, i. 15. λεπτοφλοιος· σρεφει τα ὑπτια τῶν φυλλῶν, (vid. *Ελαια*, p. 19.) i. 16.

ΦΙΛΥΚΗ.

Class. incert.

Species sempervirens, i. 15. hab. in mont. *Macedoniæ*, iii. 4. *fero germinat*, iii. 6. *lign. ευεργοτατον, μαλακον*, v. 7.

ΦΙΛΥΡΑ.

Polyand.

Lign. ευκαμπτον, i. 8. *folia gustu dulcia*, *fructus autem αζρωτος*, i. 20. *Καχυρας εχει*, (vid. *infra*) iii. 7.

Spec. duæ: 1. φ. *αρρην*.2. φ. *δηλεια*.N. 1. *fine fructu*; *ligno duro*, *enodi*.

N. 2. *ανθος καλυκωδες (apetalus)* παρα τον του φυλλου μισχον, (*ex pedunculo folii enascens*,) και παρα την εις νεωτα καχυρον εφ' ἑτερον μισχον, (*an de calyce deciduo*? *Linn. G. Pl.* 660.)

Fructus pisiformis; pedunculo longo: γωνιαις πεντε, (eminentiis, Angl. "ridges?") οἷον ἰνέσι προεχουσαῖς, femina intus plura, parva; folia subrotundo-acuminata, πλὴν ἐκ προσαγωγῆς μαλλον ἢ περιφέρεια, καὶ τὸ πρὸς μισχὸν κυρτοτάτον, (inferior pars versus basin brevior,) iii. 10. folia margine ferrato, ib. hyeme lign. cæditur, substantia μάνα, (porosa,) v. 4, 6. πρὸς σανιδώματα νεων, (vid.) v. 8.

ΦΛΟΓΙΜΟΝ.*Class. incert.*

Forfan ex colore flammeo? οἱ σεφανηπλοκοὶ χρωνταὶ πολὺ ἐκτρέχει τῶν ἀλλῶν, (omnium præcoccissimum,) vi. 7.

ΦΛΟΜΟΣ.*Class. incert.*

Species Φλομῶς, μελαινα dicta. Obiter mentio fit per comparisonem, ix. 15.

ΦΛΟΞ.*Class. incert.*

Inter σεφανωτικά αόσμα cum Διὸς ἀνθεῖ, vi. 6.

1. ΦΟΙΝΙΞ.*Palmæ.*

Amat maris littus, i. 7. ἀπαράβλαστος, i. 13. τραχυφλοιός, ξυλωγνῶδες, i. 8. μητέρα nulla, i. 9. μονοσελεχος, εἰς μήκος μόνον αὐξητικός, (magn. fere æquali,) i. 14. sempervirens, i. 14, 15. καλαμοφυλλός, καὶ γωνιοφυλλός, (vid.) i. 16. εὐθύς σπέρμα μετὰ τὸ περιέχον, (nucleus immediate infra corticem,) succus fructûs μελιτωδής, i. 19. ἀκροκαρπός, i. 23. propagatur σπέρμασι μόνον, ii. 2, 3. amat arenosa salina. Spec. sex:

1. φ. Βασιλικός.

4. φ. Αἰγυπτίος.

2. φ. Κυπρίος.

5. φ. Κυκας.

3. φ. Βαβυλωνίος.

6. φ. Χαμαιρεφής.

N. B. Dantur etiam species διφυεῖς καὶ τριφυεῖς, (bi-tri-cipites, ii. 8.) Hab. Nafamone juxta Hammonis templum, iv. 3. et Inf. Delos, iv. 14. Decacuminatione moriuntur, iv. 19. lign. in usu ad statuas faciendas, v. 4. lign. ἰσχυρόν, ἀναπαλιν γὰρ ἡ κάμψις, ἢ τοῖς ἄλλοις, (de elasticitate ligni?) τὰ μὲν γὰρ εἰς τὰ κατὰ κάμπεται ὁ δὲ Φοινῖξ εἰς τὰ ἀνω, v. 7. δυσκαπνός ἰδίᾳ φύσει, (an

ad ignem concipiendum, vel respectu carbonationis ?) v. 10. methodus propagandi ex spatha. de C. Pl. i.

2. ΦΟΙΝΙΞ ΠΟΝΤΙΟΣ. *Lithoph.*

Βραχυελεγχης σφοδρα. εκφυσει ραβδων (ramuli secundarii) ευθειαι & κυκλοθεν, καθ'απερ των ραβδων οι ακρεμονες· αλλ' ως εν πλατει, (habitus fursum complanatus, Bot.) κατα μιαν συνεχεις, (serie continua,) iv. 7.

ΦΥΚΟΣ. *Cryptog.*

Nomen generale plantarum marinarum. Dividuntur in προσγεια (littoralia) et ποντια (pelagica :) item in πλατυφυλλα et τριχοφυλλα.

1. Πλατυ τετανοειδες, radice tunicata, hirsuta, iv. 7.
2. Δρυς ποντια, επι λιθοις προσπεφυκια, sine radice; ωςπερ λεπαδες ad basin caulis, ib.
3. Ελατη ποντια σαρκοφυλλα; sed ramis longioribus, ib. v. 20.
4. Αμπελος ποντια, fructu rotundo, uvæ magn. ib. v. Vid. supr.
5. Πρασον ποντιον, affine, n. i. ib. Vid. supr.
6. Έτερον πρασον ποντιον, cujus longitudo bicubitalis ad columnas Herculis, ib.
7. Φυκος βαπτικος. Hab. in littoribus Cretæ, ib.
8. Φ. ωςπερ Μαραθρον, ib.
9. Φ. όμοιον Αγρωσε, caule nodoso, ib.
10. Φ. όμοιον Θριδακιναις, πλην ρυτοδεσερων (rugosiores) spec. acaulis, ib.
11. Συκη ποντια, αφυλλος, μεγαθει & μεγα, coloris φοινικης. Vid. supr. p. 72.
12. Φοινιξ ποντια, ib. N. B. n. 11. inter Molluscas Linn. n. 12. inter Lithophyta? Vid. supr. p. 79.

ΦΥΛΛΟΝ ΤΟ. *Class. incert.*

Spec. duæ: φ. αρρενογονον.

φ. δηλυγονον.

X.

ΧΑΛΒΑΝΗ.

Pentandr.

Planta gummosa, cujus odor βαρύς, ix. 7. Gummi vocatur Χαλβανόν, item Γαλβανόν, ix. 1.

ΧΑΜΑΙΔΡΥΣ.

Didynam.

Foliis Quercûs, fragrantibus : species humilis ; vires alexi-pharmacæ, ix. 10. folia tunsa ulceribus applicantur αργεμασι, (vid.) fructus καθαιρει χολον, ib. Alt. σπιθαμιαίος.

ΧΑΜΑΙΛΕΩΝ.

Syngen.

Affinis Atractylidis, Cnici, &c. 8 φυλλακανθης, vi. 3.

Species duæ : 1. χ. λευκός.

2. χ. μελᾶς.

N. 1. Foliis Σκόλυμβ' ακανῶ (pericarpio) μεγαλῶ ὅπῳ γλυκεῖ, vi. 3.

N. 2. Foliis fimilibus, sed minoribus ; radice crassa, coloris flavi ; ὅπῳ βαρεῖ. Hab. in montosis frigidis. Canes et fues necat, ix. 13.

ΧΑΜΑΙΡΕΦΗΣ. Vid. Φοινίξ.

ΧΑΜΑΙΒΑΤΟΣ. Vid. Βατός.

Spec. repens ; ἔρπων ἐπὶ τῆς γῆς, ἥ συναπτει.

ΧΑΡΑΚΙΑΣ. Vid. Καλαμός.

ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΝ.

Polyandr.

Affinis Heliotropii et Scolymi, ἀμα τῇ Χελιδωνί ανθεῖ ἡ αἰτία φυσικῇ, ἡ συμπτωματικῇ, vii. 14.

ΧΟΝΔΡΙΛΛΑ.

Syngen.

Inter λαχανα, vii. 11.

Ψ.

ΨΕΥΔΟ-ΔΙΚΤΑΜΝΟΣ. *Didyn.*

Dictamni affinis. Hab. in asperis montium Cretæ, ix. 16.

Ω.

ΩΚΙΜΟΝ. Vid. Οκιμον.

ΩΧΡΟΣ.

*Diadelph.*Species leguminosa, folio longiore, cum Piso, Lathyro, viii. 3.
επιγειοκαυλος, ib. obnoxius σκωληκι, viii. 10.

Vegetabilia, Græco sermone, fere semper Masculini, vel Femininei generis; Fructus autem, Gummi, Succus, aliudve quoddam inde natum, semper Generis neutri. Exempla quæ sequuntur ex Theophrasto, et inter legendum occurrentia, sisto.

ΑΜΥΓΔΑΛΗ, Arb.	KINNAMOMON, Cortex vel
ΑΜΥΓΔΑΛΟΝ, Nux.	Oleum.
ΑΠΙΟΣ, Arb.	KRANEIA, Arb.
ΑΠΙΟΝ, Fructus.	KRANION, Fructus.
ΕΛΑΙΑ, Arb.	MHΛEA, Arb.
ΕΛΑΟΝ, Fructus.	MHΛΟΝ, Fructus.
ΕΡΙΝΕΟΣ, Arb.	ΟΤΗ, Arb.
ΕΡΙΝΟΝ, Fructus.	ΟΟΝ, Fructus.
ΙΩΝΙΑ? Planta.	ΠΑΝΑΚΗΣ, Planta.
ΙΟΝ, Flos.	ΠΑΝΑΞ, Succus inspissatus.
ΚΑΡΔΑΜΟΣ, Planta.	ΟΛΙΒΑΝΟΣ? Arb.
ΚΑΡΔΑΜΟΝ, Semen.	ΟΛΙΒΑΝΟΝ, Gummi.
ΚΑΡΥΑ, Arb.	ΡΟΙΑ, Arb.
ΚΑΡΥΟΝ, Nux.	ΡΟΟΝ, Fructus.
ΚΑΣΤΑΝΟΣ, Arb.	ΡΟΔΩΝΙΑ ^a ? Planta.
ΚΑΣΤΑΝΟΝ, Nux.	ΡΟΔΟΝ, Flos.
KINNAMOMOS, Arb.	

^a Vide notam p. 13.

Vegetabilia, Graeco sermone, hoc scriptis Maffius, per se
 minus generis; Fungus autem, Gummi, Sucus, cinchus
 quoddam in se natum, semper Generis vocatur. Exemplis
 quae sequuntur et Theophrastus, et inter legendum occur-
 rent, hinc.

AMTAAH, Arb.	KINNAMON, Cortex vel
AMTAAON, Nux.	Os.
ATHOZ, Arb.	KPANEIA, Arb.
ATHON, Fructus.	KPANION, Fructus.
EAIA, Arb.	MHARA, Arb.
EAON, Fructus.	MHAY, Fructus.
EPHROZ, Arb.	OTI, Arb.
EPHON, Fructus.	ON, Fructus.
INIA, Herba.	HANAKIZ, Fructus.
ION, Fructus.	HANAE, Sucus inspissatus.
KAPAZON, Planta.	QALANOT, Arb.
KAPAZON, Semen.	QALANON, Gummi.
KATA, Arb.	TOIA, Arb.
KATON, Nux.	TOON, Fructus.
KAZANOT, Arb.	POZONIA, Planta.
KATANON, Nux.	POZON, Flos.
KINNAMONOT, Arb.	

TABULA SYSTEMATICA,
LINNEANA,
PLANTARUM THEOPHRASTI.

TABELLA SYSTEMATICA

LINNEANA

PLANTARUM THEOPHRASTI

TABULA SYSTEMATICA,
LINNEANA,
PLANTARUM THEOPHRASTI.

<i>Monandria.</i>	
ἈΛΙΜΟΝ. <i>Salicornia, fruticosa</i> ? iv. 20. de C. Pl. vi.	<i>fior</i> , iii. 11. iv. 9.
ΑΜΩΜΟΝ ^a . <i>Amomum</i> ? ix. 6, 7.	ΕΛΑΙΑ. <i>Olea, Europæa</i> , i. 4, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23. ii. 7. iii. 3, 5, 8. iv. 15, 19. v. 4, 5. vi. 2.
ΚΑΡΔΑΜΩΜΟΝ ^b . <i>Amomum, Cardamomum</i> ? ix. 7.	ΕΛΕΛΙΣΦΑΚΟΣ ^c . <i>Salvia, officinalis</i> , vi. 1, 2.
ΚΟΣΤΟΣ. <i>Costus, Arabicus</i> , ix. 7.	ΚΟΤΙΝΟΣ ^d . <i>Olea, sylvestris</i> , i. 7, 13, 24. ii. 3. iv. 14. v. 4, 9.
<i>Diandria.</i>	
ΒΟΥΜΕΛΙΑ. <i>Fraxinus, excel-</i>	ΜΕΛΙΑ ^e . <i>Fraxinus, Ornus</i> , iii. 4, 6, 7, 11. iv. 14. v. 8.

^a Fructus solum inter unguentaria memoratur.

^b Incertum an *A. Cardamomum* L. cujus nulla apud Bauhinum mentio: fors. *A. gran. Paradisi* Bauh. Pin. 413. An id. cum priore?

^c *Salvia* L. genus amplissimum, cujus in Syft. Pl. Linn. ed. 3. spec. 32; in ed. D. Willdenow, A. D. 1797. 76 enumerantur. Spec. duæ solum apud Theophr. occurrunt, *Ελελισφακος* et *Σφακελος*. Flor. Græc. fasc. 1^{mo}. 13 *Salviæ* species accuratissime delineantur. Notandum est *Salvias* scabritie foliorum, nec non odore, adeo inter se convenire, ut non, nisi a Botanicis systematicis, ita subtiliter eas partiri opus fuerit.

^d Nulla specifica differentia inter *Ελαιαν* et *Κοτινον* in Syft. Linn.

^e Vid. Flor. Græc. fasc. 1. t. 4. N. B. Nulla mentio *Βουμελίας* in hoc opere.

ὈΡΜΙΝΟΝ. *Salvia, borminum*,
viii. 1, 7.

ΠΕΠΕΡΙ. *Piper, nigrum*, ix.
22.

ΣΦΑΚΕΛΟΣ. *Salvia, bortensis?*
vi. 1, 2.

ΦΙΛΑΤΡΑ^a. *Phillyrea, latifolia*,
i. 8, 15.

ΧΑΜΑΙΔΡΥΣ^b. *Veronica*,
Chamædrys, ix. 10.

Triandria.

ΑΓΡΩΣΤΙΣ^c. *AGROSTIS*, i. 10.
iv. 11^d.

ΑΙΓΙΛΩΨ. *Avena, fatua*, vii.
7, 8, 9, 11, 12.

ΑΙΡΑ. *Lolium, temulentum*, i. 8.
viii. 4. 9.

ΑΛΩΠΕΚΟΤΡΟΣ^e. *ALOPEC-*
CURUS? vii. 10.

ΒΡΟΜΟΣ^f. *Secale, Cereale*, iv.
9. viii. 4, 11.

ΔΟΝΑΞ^g. *Arundo, Donax*, iv.
12.

ΕΛΤΜΟΣ. *Panicum*, viii. 10.

ΖΕΙΑ^h. *Triticum, monococcum*,
viii. 1, 9.

ΙΡΙΣⁱ. *Iris, Florentina?* iv. 6.
vi. 7. vii. 12. ix. 7.

ΚΑΛΑΜΟΣ. *ARUNDO*, i. 8, 9,
10, 16. iv. 9, 12. vi. 2.
ix. 5.

κ. αυλητικός.

κ. βομβυκίας^k.

κ. επιγυιος.

κ. δοναξ.

κ. πλοκίμος^l.

^a Diosc. Φιλλυρεα, unde nomen Latinum; vid. iconem nitidiff. Flor. Græc. t. 2.

^b Inter Veronicas L. extat gen. V. Chamædrys dict. inter Φαρμακώδεις recensetur. (vid. Didynam.) apud Linn. Teucrii gen. Chamædrys vocatur.

^c Nomen graminis generale αγρα-εις, (campi vestis,) sed l. iv. 11. spec. paludosa Ægypti describitur.

^d Αιγίλωψ Dioscor. aliud genus. Vid. Fl. Gr. t. 93. Spec. hæc Βρομος Diosc.

^e Ex forma spicæ; sed non Alopecurus Linn. In Fl. Græc. sub nomine Phlei, *eriniti*, delineatur spec. cujus spica caudam Vulpinam accurate refert.

^f Bromus Theophr. differt a Bromo L. ut ex descriptione constat. Inter *ειτωδεις* enumeratur; spica omnium maxime paleacea, viii. 4. Ὁμοιοπυρος vocatur, viii. 9. (spica simplici, non paniculata, Bot.)

^g Vid. Καλαμος.

^h Vox Zea occurrit inter syn. Tritici, *Speltæ*, et *Monococci*. Zea monococcos et dicoccos. Bauh. Pin. 21. 22.

ⁱ Iridis spec. octo in Græcia occurrunt; quarum tres barbatae; quinque imberbes: prioribus annumeranda Iris hæc: posterioribus Σισυριγγιον. Vid. Prodr. Fl. Græc. N. B. In fasc. 1^{mo}. Fl. Græc. Irides barbatae, I. *Florentina*, et I. *Germanica*: imberbes, I. *tuberosa*, et I. *Sisyrinchium*, accurate delineantur.

^k In Classi sexta, Bambusa, *arundinacea* L.

^l Arundo, *Phragmitis*.

κ. τοξικός.	ΛΙΝΟΣΠΑΡΤΟΝ. Lygeum,
κ. χαρακίας.	<i>spartum</i> , i. 8.
ΚΝΕΩΡΟΝ. CNEORUM? i. 16.	ΜΑΛΙΝΑΘΑΛΛΗ ^c . Cyperus,
vi. 1, 2.	<i>esculentus</i> , iv. 8.
ΚΡΙΘΗ ^a . Hordeum, <i>vulgare</i> ,	ΜΕΛΙΝΟΣ ^f . Panicum, <i>Itali-</i>
i. 9. viii. 1, 2, 3, 4.	<i>cum</i> ?
κρ. δισυχός.	ΞΙΡΙΣ. Vid. viii. 1, 3. An <i>Iris</i> ?
κρ. τρισυχός.	ix. 9.
κρ. τετρασυχός.	ΞΙΦΟΣ ^g . } GLADIOLUS, vii.
κρ. πεντασυχός.	ΞΙΦΙΟΝ. } 12.
κρ. ἑξασυχός.	ὈΛΟΣΧΟΙΝΟΣ. Vid. Σχοῖνος.
κρ. παραβλασικός.	ΟΛΥΤΡΑ ^h . Hordeum, <i>Zeocriton</i> ?
κρ. εἰσικριθής. de C. Pl. iii.	viii. 1, 4, 9.
ΚΡΟΚΟΣ ^b . CROCUS, i. 9. vi. 6,	ΠΑΠΥΡΟΣ ⁱ . Cyperus, <i>Papyrus</i> ,
7. vii. 9, 12. ix. 7.	iv. 9. vi. 12.
κρ. ορεινός.	ΠΟΑ ^k . Ροα? nomen generale.
κρ. ἡμέτερος.	ΠΟΑ. Spec. palustris, iv. 10.
ΚΥΨΕΙΡΟΣ ^c . Cyperus, <i>longus</i> ,	in Ægypto.
i. 8, ^d 10, 16, iv. 9, 11. ix. 7.	ΠΥΡΟΣ. Triticum, <i>æstivum</i> , i.

^a Hordei culti apud L. species 4: H. *vulgare*, H. *distichon*, H. *hexastichon*, H. *zeocriton*. Gramina hordeacea 4. N. B. Κριθὴ παραβλαστικός, forsan Triticum *compositum* L.

^b Croci L. species duæ: sativus et vernus. Var. officinalis a Theophr. sub nomine κρ. ἡμέτερου indicari videtur. Inter unguentaria aromatica, ix. 7. occurrit; pistillum sc. Extat icon Croci *aurei*, fasc. i. t. 35. Flor. Græc. An. Κρ. ἡμέτερος Theophr. (vid. καυλὸν ἀνδρός,) vii. 9.

^c Cyperi L. spec. quatuordecim, apud Græcos decem. Prodr. Fl. Græc.

^d Ex singulari habitu radicis, i. 10. C. *comosus* Flor. Græc. i. t. 44. innui videtur.

^e Forsan Μαλοναθαλλὰ ex forma tuberis: a Plinio vocatur Malum Anthallium.

^f Forsan Milium *paradoxum*, sed inter σιτωδὴ culta recensetur: nomen ex gustu melleo seminis.

^g Vid. Fl. Græc. t. 37. N. B. Var. occurrit ibi Gladioli, t. 38. labiis inferioribus litteris A. A. signatis. Vid. Athen. Deipnos. 15.

^h Spec. σιτωδὴς ὁμοιοπυρρος (spica simplici) apud Homerum ut pabulum equinum occurrit, una cum Κρι (κριθὴ) λευκῶ. A quibusdam Secale, *Cereale* L.

ⁱ Aliis Βέλος.

^k Vox ποα pro viridi, vel herbacea plantæ parte: quandoque pro gramine in genere.

ΣΙΣΥΜΒΡΙΟΝ^a. SISYMBRI-
UM? ii. 5. vi. 6.

ΤΡΙΒΟΛΟΣ^b. *Tropa, natans*,
iv. 11.

Pentandria.

ΑΓΧΟΥΣΑ. *Anchusa, tinctoria*,
vii. 9.

ΑΚΤΗ^c. { *Sambucus, nigra*,
i. 8, 9, 13. iii.
ΑΚΤΕΟΣ. { 6, 13, 14. v.
4.

ΑΜΠΕΛΟΣ. *Vitis, vinifera*, i.
8, 9, 16, 19, 21, 22, 23, 24.
ii. 3, 4, 7. iii. 7. 11. iv. 6, 7,
14. v. 4. ix. 21.

α. αγρια^d.

α. ήμερη.

α. Ιδαία.

α. καπνια.

α. λευκομφαλία.

α. μανομενα. de C. Pl. i.

ΑΝΗΘΟΝ. { *Anethum, bor-*
ANΗΣΟΝ. { *tense*, i. 17. vi.
2. vii. 1, 3. ix.
21.

ΑΝΔΡΑΦΑΞΙΣ.

ΑΤΡΑΦΑΞΙΣ.

{ *Chenopo-*
dium, Bo-
nus Henri-
cus, i. 23.
vii. 1, 2, 3,
4, 6.

ΑΣΚΛΗΠΙΑΣ^e. *Thapsia, Af-*
clepium, ix. 12.

ΑΦΑΡΚΗ^f. *Rhamnus, Alater-*
nus.

ΓΑΛΒΑΝΟΝ. Vid. *Χαλζανον*.

ΕΛΕΙΟΣΕΛΙΝΟΝ^g. *Apium*,
graveolens? vii. 6.

ΕΛΙΞ^h. *Hedera, Helix*, iii. 18.
vii. 8.

i. ποικίλη.

i. ποωδης.

i. χλοερα.

ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΝ. *Heliotropi-*
um, Europæum, vii. 8, 9, 10,
14.

ΘΑΨΙΑⁱ. *THAPSIA*? ix. 9,
10, 22.

ΘΡΑΥΠΑΛΟΣ. *Viburnum, O-*
pulus, iii. 7. iv. 1.

ΘΡΥΑΛΛΙΣ^k. *VERBASCUM*?

^a *Menthæ species videtur, et idcirco inter Didynamias.*

^b *Vox τριβολος, Tribulum terrestrem indicans, occurrit inter Decandrias.*

^c *Forfan Samb. racemosa.*

^d *Haud satis constat ex desc. an spec. diversæ sub nomine Α. αγριας et Ιδαίας; folia enim non lobata. N. B. Haud crediderim cum Linn. Vaccinii speciem esse.*

^e *Vox Ασκληπιας; ut trivialis Panaces, L. vid. Πανακη: forfan Asc. vince-*
toxicum L. vel potius Thapsia, Asclepium, Prodr. Fl. Græc.

^f *Forfan Celastrus Clusii.*

^g *Tria occurrunt Σελινα, quorum duo ex loco natali nominata; Ελειο, Ορσο;*
N. B. Ίπποσελινον, forfan Selinum palustre L. et Bauh.

^h *An gen. diversum a Κιστρω? Vid. infr.*

ⁱ *Seseli, turpith. L. et Bauh. 148.*

^k *Genus ex orbe novo sub nomine Thryallis apud Linn. parum caute enu-*
meratur.

ΙΑΣΙΩΝΗ ^a . Convolvulus, <i>se-</i> <i>pium</i> ? i. 21.	<i>num</i> , i. 18. vii. 3, 4. viii. 10.
ΊΠΠΟΜΑΡΑΘΡΟΝ. Ferula, <i>communis</i> , vi. 1.	ΚΩΝΕΙΟΝ. Conium, <i>macula-</i> <i>tum</i> , i. 8. vi. 2. ix. 1, 8, 15, 18.
ΊΠΠΟΣΕΛΙΝΟΝ. Smyrnium, <i>olusatrum</i> , i. 15. vii. 6. de C. Pl. v.	ΛΙΒΑΝΩΤΙΣ. (herba) ΑΘΗ- ΜΑΝΘΑ. <i>λ. καρπιμος.</i> <i>λ. ακαρπος.</i>
ΚΑΤΚΑΛΙΣ. CAUCALIS, vii. 7.	ΛΙΝΟΝ ^c . Linum, <i>usitatissimum</i> , viii. 7.
ΚΗΛΑΣΤΡΟΣ. CELASTRUS, i. 6, 15. iii. 2, 6. iv. 1. v. 8.	ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ. Atropa, <i>Mandragoras</i> . vi. 2. ix. 10.
ΚΗΡΙΝΘΟΝ. Cerinthe, <i>aspera</i> , vi. 7.	ΜΑΡΑΘΡΟΝ ^d . Anethum, <i>Fæ-</i> <i>niculum</i> , i. 18, 19. vi. 1, 2. vii. 3.
ΚΙΤΤΟΣ ^b . HEDERA, i. 4, 15, 16, 22. ii. 1. iii. 6, 18, 20. v. 4. vi. 1. ix. 19.	ΜΗΝΙΑΝΘΗΣ. Menyanthes, <i>trifoliata</i> , iv. 11 ^e .
<i>κ. λευκη.</i> <i>κ. μελαινα.</i> <i>κ. ιλιξ.</i> <i>κ. επιγειος.</i>	NAPΘΗΚΤΙΑ ^f . { Ferula, <i>Fe-</i> NAPΘΗΞ. { <i>rulago</i> ? i. 9. vi. 1, 2.
ΚΟΚΚΥΓΡΙΑ. Rhus, <i>Cotinus</i> , iii. 16.	ΟΙΣΟΣ. } Ribes, <i>Grossularia</i> , ΙΣΟΣ. } iii. 17.
ΚΟΡΙΑΝΝΟΝ. Coriandrum, <i>fativum</i> , vii. 1, 3, 4, 6.	ΟΡΕΟΣΕΛΙΝΟΝ ^g . Athaman- <i>ta</i> , <i>Oreoselinum</i> , vii. 6.
ΚΥΚΛΑΜΙΝΟΣ. Cyclamen, <i>Europæum</i> , vii. 9. ix. 10.	ΠΑΛΙΟΤΡΟΣ ^h . Rhamnus, <i>Spina Christi</i> , i. 4, 8, 16. iii.
ΚΥΜΙΝΟΝ. Cuminum, <i>cymi-</i>	

^a Aliis *Aquilegia vulgaris*; sed petalum expresse dicitur *μονον ειναι*. Vid. Dioscor. item Cat. Alph. p. 28.

^b Genus *Hedera* L. spec. duas continet: *H. Helix*, *H. quinque-folia*: var. tamen tres enumerantur: *H. Poetica*, *H. sterilis*, *H. humi repens*. N. B. *H. Helix* Theophrasti, syn. *H. sterilis Bauhini*. *H. επιγειος*, syn. *H. humi repentis* ejusdem: *Hederæ* fructu albo apud Theophr. iii. 18. mentio fit sub nomine *Κιττου λευκης*: de qua inquirendum.

^c Lin. *fativum* Bauh.

^d Forfan var. β. Linn. *Fæniculum vulgare, Italicum*, Bauh.

^e Forfan *M. Nymphæoides*: vid. Prodr. Fl. Græc.

^f Genus ita denominatum ex caule nodoso, fistuloso. Antiqui internodiis caulinis *Ferulæ* vice phialarum utebantur. *Ναρθηξ* major; *Ναρθηκυσια* minor.

^g Vid. supr. notam in *Ελειοσελινον*.

^h Forf. Rh. *Paliurus* L.

4, 6, 17, iv. 3, 4, 9, 13. vi. 1.	ῬΟΥΣ ^g . <i>Rhus</i> , <i>Coriaria</i> , iii. 18. ῥ. ἀρρήν. ῥ. θηλυσ.
ΠΑΝΑΚΕΑ ^a . } LASERPITI- ΠΑΝΑΚΕΣ. } UM, ix. 12, 15. π. Ασκληπιάς ^b . π. Ἡρακλεία. π. Χειρωνεῖον.	ΣΕΛΙΝΟΝ ^h . <i>SELINUM</i> ? i. 9, 15, 16, 19. iv. 9. vii. 1, 5. ΣΕΣΕΛΙ. <i>Tordylium, officinale</i> , ix. 15.
ΠΕΤΚΕΔΑΝΟΝ ^c . <i>Peucedanum, officinale</i> , ix. 15, 22.	ΣΙΛΦΙΟΝ ⁱ . <i>LasERPitium, latifolium</i> , i. 11. iii. 3. iv. 3. vi. 2, 3. vii. 3. ix. 1, 2.
ΠΙΤΤΙΝΗ ^d . <i>Cressa, erratica</i> ? vii. 8.	ΣΚΑΜΜΩΝΙΑ. <i>Convolvulus, Scammonia</i> , iv. 6. ix. 1, 10, 22.
ΠΤΕΛΕΑ. <i>Ulmus, campestris</i> , i. 13, 16. iii. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 14. iv. 7. v. 4, 5, 8. ix. 1. πτ. πτελία. πτ. ορειπτελία ^e .	ΣΚΑΝΔΙΞ ^k . <i>Scandix, Pecten</i> ? vii. 8.
ῬΑΜΝΟΣ ^f . <i>RHAMNUS</i> ? iii. 17. v. 10. ῥ. μελαινα. ῥ. λευκη.	ΣΤΡΥΧΝΟΣ ^l . <i>SOLANUM</i> ? vii. 6, 14. ix. 12, 15, 21. στ. ἡμερος, vel φονικος. στ. μελας, vel ὑπνωτικος. στ. θρυορος, vel μανικος.

^a Prior forsan planta; posterior gummi. Vid. Obs. ad fin. tab.

^b Vid. Ασκληπιάς supr. N. B. π. Ἡρακλεία, *Heracleum, Panaces*. π. Χειρωνεῖον *LasERPitii spec.*?

^c An *P. officinalis* var. β?

^d *Chamaepetys, incana* forsan *Bauhini*.

^e *Ulmus, campestris* var. nullae apud Linn. Attamen recenter *Ulmus, Abelliciae* mentio fit Aët. Linn. Lond. v. 9. ex specimine in Herbario Linn. a cl. Prof. J. E. Smith, et in Prodr. Fl. Græc.

^f *Rhamni, cathartici* baccæ nigræ. Ῥαμνος Græcorum hodie *Lycium, Europæum*. Vid. Prodr. Fl. Græc. 155.

^g Nullae var. ap. Linn. An spec. duæ?

^h Vid. supr. Ἐλαιοσελίον, &c. forsan *Selinum, sylvestre* L. Anne *Apium, Petroselinum* antiquis notum inter λαχανα?

ⁱ Nulla *Silphii* mentio ap. Linn. forsan ex desc. *Ferulæ spec. F. nodiflora*, vel *F. Affasætida*.

^k Semel occurrit sine desc.

^l Στρυχνου tres species Theophr. tria genera Linn. constituunt: 1. στ. ἡμερος, *Solanum, Melongena*. στ. ὑπνωτικος, *Physalis, somnifera*. στ. μανικος, *Atropa, Belladonna*. Vid. Prodr. Fl. Græc.

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΑ^a. Euonymus,
Europæus, iii. 6.

ΤΕΤΤΛΙΟΝ. { Beta, *vulgaris*, i.
5, 8, 9, 16. vii.
ΤΕΤΤΛΟΝ. { 1, 3, 4, 6, 7.

ΧΑΛΒΑΝΗ^b. Bubon, *Galbanum*, ix. 1.

Hexandria.

ΑΚΟΡΟΣ^c. Acorus, *Calamus*?
i. 22.

ΑΜΑΡΑΚΟΣ. ASPHODELUS,
vi. 7.

ΑΝΕΜΩΝΗ Λειμονία^d. Narcissus, *Pseudo-Narcissus*, vi.
7.

ΑΝΘΕΡΙΚΟΣ. Asphodelus, *luteus*, i. 7. vi. 2.

ΑΣΠΑΡΑΓΟΣ. { Asparagus,
ΑΣΦΑΡΑΓΟΣ. { *apbyllus*, i.
16. vi. 1, 3.

ΑΣΦΟΔΕΛΟΣ^e. Asphodelus,
ramosus, i. 16. vii. 9, 11,
12.

ΒΟΛΒΙΝΗ. Scilla, *unifolia*, vii.
13.

ΒΟΛΒΟΚΩΔΙΟΝ^f. Bulbocodium, *vernum*, vi. 8.

ΓΗΘΥΟΝ. } ALLIUM, i. 4, 5,
ΓΗΤΕΙΟΝ. } 16. vi. 1, 3.

ΚΡΙΝΟΝ^g. Liliun, *album*, vi.
6, 8.

ΚΡΟΜΜΥΟΝ. Allium, *Cepa*,
i. 8, 10, 16. vii. 2, 3, 4, 5,
8.

κρ. Ασκαλονικον^h.

κρ. Κνιδιον.

κρ. Σαμοδρακικον.

κρ. Σαρδιον.

κρ. Σητανειον.

κρ. Σχισον.

ΚΡΟΜΜΥΟΓΗΤΕΙΟΝ. AL-
LIUM, iv. 7.

ΛΑΠΑΘΟΣ. Rumex, *acetosa*,
i. 8, 9. vii. 1, 2, 3, 4, 7.

ΛΕΙΡΙΟΝ. vid. *Ναρκισσος*, vi.
6, 7.

ΛΕΙΡΙΟΝⁱ ἑτερον, vi. 6.

ΛΕΥΚΟΙΟΝ. Leucoium, *vernum*, vii. 9, 13.

ΜΩΛΥ. Allium, *Moly*, ix. 15.

ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ. NARCISSUS? vi.
6, 7. vii. 12.

ΟΙΝΑΝΘΗ. CONVALLARIA,
vi. 7.

ΟΡΥΖΟΝ. Oryza, *sativa*, iv. 5.

^a Ex forma fructus quadrangulari.

^b Gummi χαλβανον vel γαλβανον.

^c Ex situ cum Cnico, suspicor genus hoc Carduis affine esse, sed ita a Linn. acceptum.

^d Ανιμωνη, simpliciter, Anemonem L. indicat; vid. Polyandr.

^e Ασφοδελος et Ανθερικον proxime stant in Syst. Linn.

^f Forfan Narcissus minor L. vel bulbocodium. Datur etiam Ixiæ spec. bulbocodium dict. L. Flor. Græc. t. 56. N. B. Omnes (ex voce κωδια) bulbis lanosis, vel gossypinis extus.

^g Genus Crinum L. antiquis ignotum.

^h Ang. "Shallott," sono Græcæ vocis retento. N. B. Haud satis liquet respectu κρ. γητειου, et κρ. σχισου, an All. ampeloprasum, et schænoprasum.

ⁱ Forfan Narcissus, Poeticus, vel Pseudo-Narcissus L.

ΠΡΑΣΟΝ. *Allium, Porrum*, vii. 4, 8.

ΣΚΙΛΛΑ. { *SCILLA*, i. 7, 10,
ΣΚΥΛΛΑ. { 16. vii. 9, 12.

σκ. *Diosc. Scilla, maritima.*

σκ. *Επιμενιδεία, Scilla, Italica.*

ΣΚΟΡΟΔΟΝ^a. *Allium, Scorodoprasum*, vii. 4, 8.

ΎΑΚΙΝΘΟΣ^b. *Hyacinthus, comosus* ?

Heptandria.

Mirum videbitur nullam *Æsculi Hippocastani* L. apud Theophrastum mentionem incidisse : Clusius refert Constantinopoli Viennam delatam.

Octandria.

ΕΡΕΙΚΗ^c. *ERICA*, i. 23.

ΚΝΕΩΡΟΝ^d. *Daphne, Cneorum* ? i. 16. vi. 1, 2.

κν. λευκον.

κν. μελαν.

ΜΕΛΙΑΣ^e. ΣΙΤΟΣ. *Polygonum*,

Fagopyrum, vii. 14.

Enneandria.

ΔΑΦΝΗ. *Laurus, nobilis*, i. 8, 9, 13, 5, 19, 24.1 iii. 4, 6, 8. iv. 6, 8, 20. v. 3, 4, 8, 10.

ΔΑΦΝΗ^f αγρία, iv. 8.

ΚΑΣΙΑ. *Laurus, gracilis* g, ix. 4, 5.

ΚΙΝΝΑΜΩΜΟΣ^h. *Laurus, Cassia*, ix. 7.

ΘΗΣΕΙΟΝⁱ. *Rheum, Rhabonticum*, vii. 11.

Decandria.

ΑΝΔΡΑΧΝΗ. *Arbutus, Andracbne*, i. 8, 15. iii. 4, 6. 7, 16. v. 8.

α. αγρία.

α. ήμισυα.

ΒΑΛΑΝΟΣ. η. *Guilandina, Bencduc*, i. 17. iv. 2.

ΔΙΟΣ ΑΝΘΟΣ^k. *Dianthus Caryophyllus* ? vi. 1, 6, 7

^a Forfan A. Scorodopraf. var. β.

^b Spec. Hyacinthi apud L. 13 ; quarum 10 Bauhino notæ. Forfan Hyacinthus Theophrasti ? H. *Poeticus* L. apud nos frequentissima. N. B. Omnium pulcherrima species in hortis nostris H. *orientalis*, antiquis ignota.

^c Semel occurrit ut frutex apice florifero : nomen usurpatur a Bauhino, Clusio, et Linn.

^d Incertum an Daphne : forfan Cneorum L. Chamælea Bauh. Vid. Triandr.

^e Ex colore grani : forfan P. *Convolvulus* ; Convolv. niger Dodon.

^f L. *nobilis* nulla datur var. Spec. hæc Viburnum, *Tinus* Bauh. rectius Viburnum *Lantana* ; vid. Prodr. Fl. Græc.

^g *Laurus, Cinnamomum* antiquis ignota.

^h Cortex, vel oleum solum inter unguentaria.

ⁱ Mallem sane Rheum, *palmatum* Thesæi nomine insigniri, sed locus natalis prohibere videtur.

^k Aliis Agrostemma *Flos Jovis* L. vel *coronaria* L.

ΚΕΡΚΙΣ. *Cercis, filiquastrum*,
iii. 14.

ΚΟΜΑΡΟΣ. *Arbutus, Unedo*,
i. 8, 15. iii. 16. v. 10.

ΛΥΧΝΙΣ^a. *LYCHNIS*.

ΠΗΓΑΝΟΝ. *Ruta, graveolens*,
i. 4, 15. vii. 2, 4, 5, 9.

ΣΤΡΟΤΘΙΟΝ. *Gypsophila*,
Struthium.

ΤΡΙΒΟΛΟΣ^b. *Tribulus, ter-*
restris.

Dodecandria.

ΑΕΙΖΩΟΝ. *Sempervivum, ar-*
boreum, i. 16. vii. 14.

ΣΥΚΗ ΙΝΔΙΚΗ^c. *RHIZO-*
PHORA, i. 12. iv. 4.

ΤΙΘΥΜΑΛΛΟΝ^d. *EUPHOR-*
BIA, ix. 8, 12, 15.

τ. παραλιος.

τ. αέρην.

τ. μυρτιτις.

Icosandria.

ΑΜΥΓΔΑΛΗ. { *Amygdalus*,
 communis, i.
ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ. { 18, 19, 21,
 23. ii. 3. vii.
 12. ix. 12.

ΑΠΙΟΣ. *Pyrus, communis*, 1, 4,
16, 19, 21, 23, 24. ii. 3, 7.
iv. 6, 14, 16.

ΑΡΙΑ. *Crataegus, Aria*, iii. 6,
16. v. 1, 4, 5, 6, 10.

ΑΧΡΑΣ^e. *Pyrus, sylvestris* sta-
tu, i. 7, 24. ii. 3. iii. 4, 6,
7. iv. 14.

ΒΑΤΟΣ^η. *RUBUS*, i. 2, 8, 15,
16. iii. 18.

β. ορθοφύης. *R. fruticosus*.

β. χαμαιδατος. *R. Chamæmorus*.

β. κυνοσδατος. *R. Idæus*.

ΚΑΚΤΟΣ. *Cactus, Opuntia*, vi.
4.

ΚΕΡΑΣΟΣ. *Prunus, Cerasus*,
iii. 13. ix. 1.

1. ΚΟΚΚΥΜΕΛΙΑ^f. *Prunus*,
Laurocerasus ? i. 18, 19, 21,
22. iii. 7. iv. 3.

2. Κ. ΣΠΟΔΙΑ, iii. 7. *incert*.

ΚΡΑΤΑΙΓΟΣ. *Crataegus, tormi-*
nalis, iii. 15.

ΚΥΝΟΣΒΑΤΟΣ. *Rubus, Idæus*,
iii. 18. Vid. Βατος.

ΛΑΚΑΘΗ. *Prunus, Mabaleb*,
iii. 4.

ΜΕΣΠΙΛΗ. *MESPILUS*, iii. 12.

^a Ex medulla in caule lucernis apta?

^b Duo sub nomine τριβολος occurrunt genera. Vid. Tetrand.

^c Incertum an *Rh. conjugata*, vel *gymnorhiza* L.

^d Plurima dantur genera apud antiquos sub nominibus *Tithymalus*,
Esula, *Apios*, *Peplus*. Vid. Ger. em. 498. Sp. 1^{ma} *Euph. Paralias*: 2^{da} *Euph.*
Amygdaloides Dioscor. 3^{ta} *Euph. Myrsinitis*.

^e *P. Pyrafter* L. *P. sylvestris* Bauhin. Οχνη.

^f Incertum ex desc. nulla tamen vocis Κοκκυμελίας apud Bauh. vel Clu-
fium mentio. N. B. *Prunus, Laurocerasus* L. Anglice "Laurel" vocatur; Lau-
rus autem nobilis L. "Sweet Bay." Κ. σποδια spec. sylvestris, ignota.

μ. ανθηδων. *Cratægus Azarota*.
 μ. σατανειος. *M. Germanica*.
 μ ανθηδωνοιδης. *Crat. Oxyacantha*.
 ΜΗΛΕΑ^a. *Pyrus, malus*, i. 4, 8,
 9, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 24.
 ii. 1, 3, 7. iii. 4, 6. iv. 16,
 19.

μ. οψια.
 μ. καρινη.

ΜΥΡΡΙΝΗ. { *Myrtus, commu-*
nis, i. 4, 15,
 ΜΥΡΡΙΝΟΣ. { 16, 22, 23,
 24. iii. 4, 6, 7.

ΜΥΡΤΟΣ. id. i. 9.

ΟΞΥΑΚΑΝΘΑ. *Cratægus, Py-*
racantha, i. 15. iii. 4, 6. vi.
 7.

ΟΥΗ. } *Sorbus, domestica*, ii. 3.
 ΟΗ. } iii. 3, 7, 12.

ΠΑΔΟΣ. *Prunus, Padus*, iv. 1.

ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟΝ. { *TORMEN-*
 ΠΕΝΤΑΠΕΤΗΣ. { *TILLA*,
 ix. 4.

ΠΡΟΥΜΝΗ. *PRUNUS*, ix. 1.

ΡΟΔΟΝ^b. } *ROSA*, i. 15, 22.
 ΡΟΔΩΝΙΑ. } vi. 1, 6, 7.

ρ. πενταφυλλ. vel κυνοροδον. *R. Can-*
nina.

ρ. δεκαφυλλ. *incert.*

ρ. εικοσιφυλλ. *R. Cinnamomea*.

ρ. εκατονταφυλλ. *R. Centifolia*.

{ *Punica, granata*, i. 4,
 ΡΟΙΑ. { 8, 9, 14, 16, 19, 21,
 ΡΟΑ. { 22, 23, 24. iii. 7. iv.
 6, 14. vi. 1

ΣΤΡΟΥΘΙΟΝ. *Pyrus, Cydonia*,
 ii 3^c.

ΣΠΟΔΙΑ. vi. 3. Vid. Κοκκυ-
 μηλια.

ΧΑΜΑΙΒΑΤΟΣ. Vid. Βατος.

Polyandria.

ΑΚΟΝΙΤΟΝ. *Aconitum, Ly-*
coctonum, ix. 16, 17.

ΑΝΕΜΩΝΗ^d. *ANEMONE*, vi.
 7. vii. 8.

ΑΤΡΑΓΕΝΗ^e. *Clematis, Ori-*
entalis?

ΓΑΥΚΤΣΙΔΗ. Vid. Παιωνια,
 ix. 9.

ΕΛΕΒΟΡΟΣ. *HELLEBORUS*,
 iv. 6. vi. 2. ix. 9, 11, 15.

i. μελας^f.

i. λευκος.

ΚΑΠΠΑΡΙΣ. *Capparis, spinosa*,
 i. 6. iii. 3, 5, 1. vii. 8.

^a *Pyrus, malus* statu sylvestri non notatur (Ang. "Crab-tree.")

^b *Rosa, canina* L. *Κυνοροδον* Theophr. N. B. Vox *Ροδωνια* fere semper *rosetum* indicat, ut et *Ιωνια* violetum; sed quandoque, ut suspicor, plantam ipsam.

^c *Στρουθίου* genera duo, quorum alterum *Gypsophila, Struthium*, L. Vid. *Decandria*.

^d Vid. *Ανεμωνη Λειμωνια* Hexandr. sed secundum alios *Ανεμωνη* simpliciter, *A. hortensis*. *A. λειμωνια*, *A. pratensis* vel *nemorosa*.

^e Genus *Atragene* Linn. apud Bauhin. vocatur *Clematis*. N. B. Planta hæc forf. *Clematis, Vitalba* L.

^f Icones nitidissimæ plantarum Corollarii Tournefortiani, ab ipso depictæ in *Annalibus Musei Hist. Nat. Parisiis* nuperrime prodire. Inter has *H. niger, Orientalis*, vel *H. niger* Theophrasti accurate delineatur, "foliis Pla-

ΚΙΣΤΟΣ^a. *Cistus*, vi. 2.
 ΛΩΤΟΣ^b. *Nymphæa*, *Lotus*,
 iv. 10.
 ΜΕΛΙΣΣΟΦΥΛΛΟΝ^c. *Melit-*
tis, *Melissophyllum*.
 ΜΗΚΩΝ. *Papaver*, *Oriente*,
 i. 15, 18, 19.
 ΝΥΜΦΑΙΑ^d. *Nymphæa*, *Ne-*
lumbo, ix. 13.
 ΦΙΛΥΡΑ^e. *Tilia*, *Europæa*, i.
 16, 20. iii. 4, 6, 7, 9, 10.
 v. 1, 4, 6, 8.
 ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΝ. *Chelidonium*,
majus, vii. 14.

Didynamia.

ΑΓΝΟΣ. *Vitex*, *agnus castus*, i.
 4, 21, 22, 23.
 ΑΙΜΑΔΩΡΟΝ^f. *Orobanche*?
 viii. 8.
 ΑΜΑΡΑΚΟΣ. *Origanum*, *Æ-*
gyptiacum.
 ΓΛΗΧΩΝ. } *Mentha*, *Pule-*
 ΒΛΗΚΩΝ. } *gium*, vii. 5.

ΔΙΚΤΑΜΝΟΣ. *Origanum*,
Dictamnus, ix. 16.
 ΕΡΠΥΛΛΟΝ. *Thymus*, *serpyll-*
um, i. 15. vi. 1, 6, 7.
 ΕΥΖΩΜΟΝ^g. *Satureia*, *borten-*
sis, i. 9. vii. 1, 3, 6.
 ΘΥΜΒΡΑ^h. } *Thymbra*, vi.
 ΘΥΜΒΡΟΝ. } 1, 2. vii. 1, 6.
 ΘΥΜΟΝ. *Thymus*, *vulgaris*,
 i. 19. vi. 1, 2. viii. 1, 6.
 ΙΦΤΟΝ. } *Lavandula*, *spica*?
 ΙΦΤΣΟΝ. } vi. 7.
 ΚΡΑΤΑΙΟΓΟΝΟΝⁱ. *Euphra-*
sia, *odontitis*? ix. 19.
 ΜΕΛΑΜΠΥΡΟΣ. *Melampy-*
rum, *arvense*, viii. 8.
 ΜΙΝΘΑ^k. *Mentha*, vi. 7.
 ΟΚΙΜΟΝ. } *Ocimum*, *Basil-*
 ΟΚΤΜΟΝ. } *cum*, i. 9, 16. vii.
 1, 2, 3, 6.
 ΟΡΙΓΑΝΟΣ. *Origanum*, *majo-*
rana, i. 19. vi. 1.
 δ. λευκη.
 δ. μελαινα.

tani, sed divisuris pluribus," Turcis hod. "Zopteme." Operæ pretium erit descriptionem cel. Desfontaines perlegere, Ann. Mus. A. vi. fasc. 4. p. 278.

^a In ed. Bas. legitur Κιστος.

^b Tres Λωτοι. Vid. Diadelph. et Polygam.

^c Rectius forsan *Melissa*, *officinalis* Didyn.

^d *Nymphæa Lotus* et *N. Nelumbo* spec. ejusdem generis. Nescio an recte nominantur; ambo crescunt in Lacu Orchomeni, et in Nilo fluvio.

^e Vox Φιλλυρα Phillyream indicat, duplici λ. Vid. Diandr.

^f Parasitica pl. radici vel cauli adnascens. N. B. Vox *Orobanche* minus proprie a Linn. usurpatur. Vid. Pl. Class. incert.

^g *Eruca* quorundam. Ex suavitate et usu in jure condiendo nomen Græcum. Angl. "Winter Savoury," quod id. significat ac vox Gr.

^h An *Hyssopus*, *officinalis* L. vel *Satureia*, *Thymbra*.

ⁱ Nulla Κραταιογονου apud Linn. mentio inter synonyma. Forf. *Melampyrum*, *album* Ger. em.

^k *Menthæ* 14 spec. Linn. Sp. Pl. 204.

ΠΡΑΣΙΟΝ. Marrubium, *album*,
vi. 1, 2.

ΣΗΣΑΜΟΝ^a. Sefamum, *Ori-*
entale, i. 18. viii. 1, 3, 4, 7

ΧΑΜΑΙΔΡΥΣ^b. Teucrium,
Chamædrys? ix. 10.

ΨΕΥΔΟ-ΔΙΚΤΑΜΝΟΣ. Ori-
ganum, *Ægyptiacum*, ix. 16.

Tetradynamia.

ΓΟΓΓΥΛΙΣ. Brassica, *Rapa*, i.
9, 10. vi. 7. vii. 1, 2, 3, 4, 5,
9.

γ. ἡμερα.

γ. αγρια. vii. 6.

ΕΡΥΣΙΜΟΝ^c. Erysimum, *offi-*
cinale, viii. 3, 7.

ἙΣΠΕΡΙΣ. Hesperis, *matrona-*
lis. de C. Pl. vi.

ΚΑΡΔΑΜΟΝ. Sisymbrium, *Na-*
sturtium, i. 19. vii. 1, 4

ΝΑΠΥ. Sinapi, *nigrum*, i. 19.
vii. 1, 4.

ΡΑΦΑΝΙΣ. Raphanus, *fativus*,
i. 4, 9, 10. vii. 2, 3, 4.

ρ. Καρινθια.

ρ. Λειοθαλασσια.

ρ. Κλεωνια.

ρ. Βοιωτικα.

ΡΑΦΑΝΟΣ. Brassica, *oleracea*,

i. 9, 15, 16, 23. iv. 20. vii.
1, 4.

ρ. ουλοφυλλος, "curled Savoy."

ρ. λειοφυλλος, "smooth Cabbage."

ρ. αγρια, *B. arvensis*.

Monadelphia.

ΑΛΘΑΙΑ. Lavatera, *arborea*, ix.
15. 19.

ΕΡΙΟΦΟΡΑ. Gossypium, *arbo-*
reum, iv. 9.

ΜΑΛΑΧΗ^d. Althæa, *officina-*
lis.

Diadelphia.

ΑΡΑΚΟΣ^e. Vicia, *cracca*? viii.
8.

ΑΡΑΧΙΔΝΑ^f. Lathyrus, *am-*
phicarpus, i. 1. 11.

ΑΦΑΚΗ. Lathyrus, *Aphaca*? i.
5, 6, 10.

ΔΟΛΙΧΟΣ. Phaseolus, *vulga-*
ris, viii. 3, 10.

ΕΒΕΝΟΣ^g. Ebenus, *Cretica*,
i. 8, 9. iv. 5. v. 4, 5. ix. 22.

ΕΡΕΒΙΝΘΟΣ^h. Ervum, *Lens*,
viii. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10.

ΘΕΡΜΟΣⁱ. LUPINUS, i. 6, 12.
iii. 3. viii. 1, 2, 7, 10.

^a Sefamum inter Σιτωδη Ανωσυμα; semina forsan ad usus culinariorum.

^b Veronicae species sub nomine triviali *Chamædrys*. Vid. Diandr.

^c Inter plantas *Αρουραιας* cum Sefamo. Forfan *E. barbarea*.

^d Affinitas satis arcta inter *Αλθαϊαν* et *Μαλαχην*. Posterior forsan nominanda *Μαλακη* ex mollitie foliorum.

^e Ex sono vocis forsan Linn. nomen triviale inditum. Var. *Αρακου ομοιος* dict.

^f Error videtur textûs; forsan scribendum *Αρακιδνα* ab *Αρακα*, quia habitu affines ambo: occurrit *Αρακου ομοιος* cum *Arachidna*, i. 11.

^g Quare Ebenus *Cretica* L.? antiquis spec. certe nota. Vid. desc.

^h Inter culta *Αρουραια*.

ⁱ Lupinorum apud antiquos mentio frequens in cibis: forsan *L. fativus* flore albo Bauh.

ΚΕΡΑΣΒΟΛΟΝ. Vid. Ερεβιν-
δος.

ΚΟΛΟΥΤΕΑ^a. COLUTEA, i.
18. iii. 14, 17.

κ. Ἰδαία.

κ. περι Λιπαράν.

κ. Φρυγανώδης.

ΚΛΥΜΕΝΟΝ^b. Lathyrus, Cly-
menum ix. 9.

ΚΡΙΟΙ ΟΡΟΒΙΑΙΟΙ^c. Cicer,
Arietinum, viii. 5.

ΚΥΑΜΟΣ^d. Vicia, Faba, viii.
1, 2, 3, 5, 10.

ΚΥΤΙΣΟΣ. CYTISUS, i. 9. v.
4.

κ. δεινδρωδης. Cyt. Laburnum.

κ. Φρυγανώδης. Medicago, arbo-
rea.

ΛΑΘΥΡΟΣ. Lathyrus, sativus,
viii. 3, 10.

ΛΩΤΟΣ^e. Lotus, Melilotus, vii.
1, 9, 14.

ΜΕΛΙΛΩΤΟΣ. Trifolium, offi-
cinale. de C. Pl. l. vi.

ΜΗΔΙΚΗ. Medica, sativa, viii.
8.

ΟΝΩΝΙΣ. Ononis, Antiquo-
rum? vi. 1, 4, 5.

ΟΡΟΒΟΣ^f. OROBUS. vii. 6.
viii. 1, 5, 10.

ΠΕΛΕΚΙΝΟΣ. Coronilla, secu-
ridaca, viii. 8.

ΠΙΣΟΣ. Pisum, sativum, viii.
1, 2, 3, 5, 10.

ΤΡΑΓΑΚΑΝΘΑ. Astragalus,
Tragacantha, ix. 1, 8, 15.

ΦΑΚΟΣ^g. ERVUM? iv. 5. viii.
1, 3, 5.

ΩΧΡΟΣ. Pisum, Ochrus, viii.
3, 10.

Polyadelphia.

ΜΗΛΕΑ ΜΗΔΙΚΑ. Citrus,
Medica, i. 22.

ΜΗΛΕΑ ΠΕΡΣΙΚΑ. Citrus,
Aurantium, iv. 4^h.

Syngenesia.

ΑΒΡΟΤΑΝΟΝ. Santolina, Ros-
marinifolia? i. 15. vi. 1, 7.

1. ΑΚΑΝΘΑ ⁱ .	Atractylis, gummife- ra? iv. 5, vi. 3, 4. ix. 1.
ΑΤΡΑΚΤΥΛΙΣ.	

^a Forfan C. arborescens desc. ως δένδρον μεγα, iii. 14. Nomen ex κολουω, de actione folia colligendi, et præparandi ad usus pecorum saginandorum.

^b Κλυμενον Theophr. medicinale valde, et forfan diversum. Κλυμενον Diosc. Calendula, officinalis, secundum alios Lathyrus, Clymenum L. De viribus inquirendum.

^c Ex forma feminis caput arietis referente?

^d Κυαμος alter occurrit in Class. Gynandr. Arum, Colocasia L.

^e Tres Loti. Vid. Class. Polyandr. et Polygam.

^f Enumeratur cum Ερεβινθω; spec. culta forfan antiquitus; an Ervum, Ervilia?

^g Affinis Ερεβινθου, forfan E. hirsutum. N. B. Spec. Indica memoratur. iv. 5.

^h Dicitur inedulis esse, sed fragrans. Var. quædam ignota.

ⁱ Spec. Indica, Cardui affinis, gummifera.

2. AKANΘA AΦΤΛΛΟΣ. Spec. ignota, iv. 5.	AΦΙΑ. Caltha, <i>palustris</i> , vii. 8.
3. AKANΘA, ΔΙΨΑΣ ^a . Spec. ignota, iv. 8.	AΨΙΝΘΙΟΝ. Artemisia, <i>Ab-</i> <i>sinthium</i> , i. 19. iv. 6. vii. 9.
4. AKANΘA ΙΝΔΙΚΗ. Vid. <i>Ακανθα</i> n. i.	ΕΛΕΙΟΧΡΥΣΟΣ. Caltha, <i>pa-</i> <i>lustris</i> ? vi. 7. ix. 21.
5. AKANΘA ΚΕΑΝΩΘΟΣ. <i>Serratula, arvensis</i> , iv. 5, 11.	ΗΡΙΓΕΡΩΝ. Erigeron, <i>graveo-</i> <i>lens</i> , vii. 7, 8.
6. AKANΘA ΤΡΙΟΖΟΣ. Spec. ignota, iv. 5.	ΘΡΙΔΑΚΙΝΗ. { <i>Lactuca, sati-</i> <i>va</i> , i. 16, 19.
7. AKANΘA ΉΡΑΚΛΕΙΑ. Spec. ignota, iv. 5.	ΘΡΙΔΑΧ. { vii. 2, 3, 4, 5, 6. ix. 8.
8. AKANΘA ΧΑΛΚΕΙΟΣ. vi. 3.	ΘΡΙΔΑΚΙΝΗ <i>αγρια</i> . <i>Lactuca,</i> <i>sylvestris</i> .
ΑΚΑΡΝΑ. } <i>Carduus, Acarna,</i> ΑΚΟΡΝΑ. } i. 16. vi. 3, 4.	ΙΞΙΝΗ ^c . <i>CARDUUS</i> , vi. 3, 4. ix. 1.
ΑΝΔΡΥΑΛΙΑ ^b . <i>Andryala, inte-</i> <i>grifolia</i> ? vii. 7.	ΙΟΝ. } <i>Viola, odorata</i> , i. 15. ΙΩΝΙΑ ^f . } vi. 1, 6, 7. viii. 6.
ΑΝΘΕΜΙΟΝ ^c . { <i>ANTHEMIS</i> ? i. ΑΝΘΕΜΟΣ. { 22. vii. 9, 12, 13.	i. λευκη. i. μελαινα ^g .
ΑΤΡΑΚΤΥΛΙΣ. Vid. <i>Ακανθα</i> 1.	KENTATPEA. { <i>Centaurea,</i> KENTATPION. { <i>Centauri-</i> um, i. 19.
ΑΦΑΚΗ ^d . <i>Leontodon, Taraxi-</i> <i>cum</i> .	iv. 6. vii. 9. ix. 1.
	KIXΩΡΙΟΝ. <i>Cichorium, Inty-</i> <i>bus</i> , i. 16. vii. 7, 8, 9, 11.

^a In Lybiæ arenosis, aridissimis; herba prorsus deficiente. N. B. Spec. octo *Ακανθων* huc referuntur, etsi forsan nonnullæ nihil habeant affinitatis cum *Carduis*, spinis exceptis. A peregrinantibus sedulo investigandæ sunt hæ species.—*Ακανθα* Nov. Test. perperam interpretatur “thorn.”

^b Nulla *Andryaliæ* mentio inter synonyma Linn. Forf. *Sonchus, asper* Linn.

^c Forfan *Matricariæ*, vel *Cotulæ*, spec.

^d Datur *Lathyri* species *Αφακη* dict. vid. *Diadelph.* aliis *Απατη* dict.

^e Spec. Gummi mastiche ferens. N. B. *Ixine* Fabii Columnæ. 1.

^f Vid. not in *Ροδωνια* Cl. Icosandr.

^g Purpureo-nigra, “the dark blue double violet,” Ang.

ΚΝΙΚΟΣ. } Cnicus? i. 22. vi.	vii. 7, 11.
ΚΝΗΚΟΣ. } 3, 4.	ΧΑΜΑΙΛΕΩΝ. Carlina? vi.
ΚΟΜΗ ῃ. Tragopogon, Ori- entale? vii. 7 ^a .	3. ix. 13.
ΚΟΝΥΖΑ ^b . Conyza? vi. 1, 2.	χ. λευκος. C. acaulis.
ΚΟΡΚΟΡΟΣ. Hieracium, mu- rorum.	χ. μελας. Carthamus, corymbo- sus.
ΛΕΥΚΑΚΑΝΘΑ ^c . Onopor- dum, Acanthium, vi. 3.	ΧΟΝΔΡΙΛΛΑ ^b . Chondrilla, juncea, vii. 11.
ΜΕΛΑΝΙΟΝ. Vid. Iov, vi, 6, 7.	Gynandria.
ΠΙΚΡΙΣ ^d . Picris? vii. 9, 11.	ΑΡΙΣΤΟΛΟΧΙΑ. ARISTOLO- CHIA, ix. 13, 15, 22.
ΣΚΟΛΥΜΟΣ ^e . Scolymus, His- panicus, vi. 3, 4. vii. 10, 14.	ΑΡΟΝ. Arum, Dracunculus, i. 9, 10. vii. 9, 12.
ΣΟΓΧΟΣ. Sonchus, oleraceus, vi. 4, 3.	ΒΟΤΚΕΡΑΣ. Ophrys, nidus a- vis? viii. 8.
ΣΤΟΙΒΗ ^f . Centaurea, Stæbe, i. 16. vi. 1.	ΔΡΑΚΟΝΤΙΟΝ. Arum, macu- latum, ix. 22.
ΤΡΑΓΟΠΩΓΩΝ. Vid. Κομη supra, vii. 7.	ἙΛΛΕΒΟΡΙΝΗ ⁱ . Serapias, Helleborine, ix. 11.
ὑΠΟΧΟΙΡΙΣ ^g . HYPOCHÆRIS?	ΚΥΑΜΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑ ^k . Arum, Colocasia, iv. 9. vii. 3.
	ΟΡΧΙΣ ^l . ORCHIS.

^a Κατ' ἐξοχὴν ita dict. N. B. Ex voce κομη, rectius forsan Geropogon, glaber. Vid. infra, Τραγοπωγων.

^b Conyzæ Linn. spec. 19. valde affines Erigerontis : in loco natali investi-
gandæ.

^c Spina alba Bauhini.

^d Ita dict. ab amaritudine ; nescio an Picris Linn.

^e Radix edulis. N. B. Cynara, Scolymus Linn. Angl. "the Artichoke."
Theophr. ignota, ut videtur.

^f Genus Stæbe non occurrit apud Linn. sed Bauhinum et Clusium sequor,

^g Bis occurrit inter Cichoracea.

^h Plures Chondrillæ inter pl. affines: Sonchus, Prenanthes, Leontodon,
Hieracium, Lapsana, Erigeron, Centaurea. Videant Peregrinatores.

ⁱ Forfan Satyrium.

^k Κυαμος simpliciter Vicia, faba. Vid. Diadelph.

^l Inter 32 species Orchidis difficillimum foret feligere ; maxime communis,
Orchis, morio L.

Monœcia.

ΑΙΓΙΑΩΨ^a. *Quercus, Ægilops*, iii. 9.

ΒΑΙΤΟΝ. *Amaranthus, Blitum*, i. 23. vii. 1, 2, 3, 4.

ΒΟΤΤΟΜΟΣ^b. *SPARGANIUM?* i. 8, 16. iv. 9, 11.

ΓΛΕΙΝΟΣ. Vid. *Zygia*, iii. 4.

ΔΙΟΣ ΒΑΛΑΝΟΣ. *Fagus, Castanea*, iii. 3, 4, 6, 7. iv. 6.

ΔΡΥΣ^c. *QUERCUS*, i. 8, 9, 13. 16. iii. 4, 6, 7, 9. iv. 6. v. 5, 6, 10.

1. δ. ἡμερίς. q. *Robur*.

2. δ. αἰγίλωψ. (supr.) q. *Ægilops*.

3. δ. πλατυφυλλος.

4. δ. φηγος. q. *Esculus*.

5. δ. ἀλιφλοιος.

6. δ. φελλος. q. *Suber*.

7. δ. εὔμοδρος.

8. δ. οσπρίς. q. *Cerris?*

ΕΛΑΤΗ^d. *PINUS*, i. 6, 8, 9, 13, 15, 16. iii. 8, 10. iv. 1, 6, 7, 19. v. 1, 2, 4, 7, 8. vi. 2. ix. 1.

ε. ἀρρήν. *P. Abies*.

ε. θηλεία. *P. Picea*.

ΖΥΓΙΑ. *Carpinus, Betulus*, iii. 4, 6, 7. v. 1, 4.

ΗΡΑΚΛΕΩΤΙΚΗ, καρνα. *CORYLUS*, i. 4, 16, 17, 19. iii. 3, 4, 6, 7, 8.

ἡ. ἡμερος. *C. Colurna*.

ἡ. αργία. *C. Avellana*.

ΘΥΙΑ. *Thuja, arbylla*, i. 15. iii. 6. iv. 1.

ΚΑΡΤΑ ^e Εὐβοϊκή.	{	Juglans,
ΚΑΡΤΑ Περσική.		<i>Regia</i> , iii.
ΚΑΡΤΑ Βασιλική.		6, 7. iv.
		6. v. 5.
		8, 10.

ΚΛΗΘΡΑ. *Betula, Alnus*, i. 7. iii. 4, 5, 6, 7, 14. iv. 9.

ΚΟΙΞ. *Coix, Lachryma Jobi*, i. 16.

ΚΟΛΟΚΤΝΘΗ. *Cucumis, Colocynthis*, i. 19, 22. vii. 1, 3, 4, 6.

ΚΡΟΤΩΝ. *Ricinus, Palma Christi*, i. 16.

ΚΥΠΑΡΙΤΤΟΣ. *Cupressus, sempervirens*, i. 8, 9, 13, 14, 15, 16. iii. 3. iv. 3, 6. v. 5.

ΛΕΜΝΑ. *Lemna, triscula*, iv. 11.

^a *Ægilops graminis* spec. v. *Polygamia*.

^b Spec. affinis *Cyper*i: non *Butomus* L.

^c *Quercus* spec. apud Linn. Sp. Pl. enumerantur 14; inter quas *Q. Phellus*. N. B. Vox *Phellus* minus proprie generi novi orbis attribuitur a Linneo. δρ. ἀλιφλοιος forsan αλλοφλοιος, (cortice duplici,) syn. *Q. Suberis*. εὔμοδρος forsan. *Q. Robur*. N. B. An *Q. Ilex* L.?

^d Genus *Pinus* L. dividitur in species foliis simplicibus Ελατη; et species foliis basi unitis σπαθοφυλλοις, ut *Πευκη*, *Πιτυς*. vid.

^e *Καρνον* neutr. gen. *Nux*. Vid. not. ad finem Cat. Alph.

ΟΞΥΑ ^a . <i>Fagus, sylvatica</i> , i. 16. iii. 6, 7. v. 5, 8. vii. 13.	ΣΙΚΥΑ. <i>CUCURBITA</i> . de C. Pl. v.
ΟΣΤΡΥΑ. } <i>Carpinus, Betulus</i> , ΟΣΤΡΥΙΣ. } i. 13. iii. 4, 7, 10.	ΣΙΚΤΟΣ ^d . <i>Cucumis, sativus</i> , i. 19, 22. vii. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10. ix. 10, 15.
ΟΣΠΡΙΣ. Vid. Δρυς.	ΣΙΚΤΟΣ <i>αγριος</i> . <i>MOMORDICA</i> , vii. 10.
ΠΕΥΚΗ ^b . <i>Pinus, Pinea</i> , i. 6, 8, 9, 13, 15, 16, 19. ii. 2, 3. iii. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10. iv. 1, 6, 19. v. 1, 2, 7, 8, 9. ix. 1, 2.	ΣΜΙΛΑΞ. <i>Quercus spec.</i> ita ab Arcadibus vocata, iv. 7.
π. παραλίας. <i>P. Pinastr.</i>	ΣΤΥΡΑΞ. <i>Liquidambar, styra-</i> <i>ciflua</i> , ix. 7.
π. Ιδαία. qu.	ΣΥΚΑΜΙΝΟΣ ^e . <i>Morus, nigra</i> , i. 19, 21, 22. v. 4, 5, 7, 8.
1. ΠΙΤΥΣ. <i>Pinus, sylvestris</i> , i. 9, 15, 16, 19. ii. 2, 3. iii. 1, 4, 6, 8, 10. iv. 1, 6, 19. v. 1, 2, 7, 8, 9. ix. 1, 2.	ΤΥΦΗ ^f . <i>Typha, latifolia</i> , i. 8. iv. 11.
2. ΠΙΤΥΣ Κωνοφόρος. iii. 10.	ΦΕΛΛΟΔΡΥΣ. } Vid. Δρυς. ΦΕΛΛΟΣ. }
ΠΛΑΤΑΝΟΣ. <i>Platanus, Orien-</i> <i>talis</i> , i. 7, 13, 16. iii. 1, 6, 7. iv. 7, 9, 14, 18. v. 4, 8.	ΦΗΓΟΣ. Vid. Δρυς.
ΠΡΙΝΟΣ ^c . <i>Quercus, Prinus</i> , i. 9, 15, 16. iii. 4, 5, 6, 7, 8, 15. v. 7, 8. ix. 4.	<i>Diæcia.</i>
ΠΥΞΟΣ. <i>Buxus, sempervirens</i> , i. 8, 9, 13, 15. iii. 4, 7, 15. v. 4, 5, 7, 8.	ΑΙΓΕΙΡΟΣ. <i>Populus, nigra</i> , i. 8. ii. 3, 4, 5, 6, 7, 14. iv. 14.
ΣΗΜΥΔΑ. <i>Betula, alba</i> , iii. 14.	ΑΡΚΕΥΘΟΣ. <i>Juniperus, com-</i> <i>munis</i> , i. 15. iii. 4, 6, 7. iv. 1. v. 8.

^a Folio rigido acuto, unde nomen.

^b Difficile admodum ex Theophr. verbis distinguere inter Πευκήν et Πίτυν: annon prior *P. Pinea* vel *Cembra*? *P. Larix* obscure innuitur i. 15. ubi inter αειφυλλά, πευκής τι γένος occurrit; necesse est igitur aliud genus esse deciduum.

^c Species hæc non enumeratur inter *Quercus* Theophrasti, sed ut genus diversum, foliis utrinque acuminatis.

^d Nulla Cucumeris *Melonis* L. apud Theophrastum mentio, cujus hab. ignotum.

^e Occurrit *Ficus spec.* apud Linneum sub nomine *F. Morus*. Vid. etiam Συκαμινος Αιγυπτια. *Polygam.*

^f Occurrit hîc vox τῖφη, vitio textûs, in codd. quibusdam. Vid. Τῖφη *Triandr.*

ΔΑΦΝΗ^a Ἀλεξανδρεία. Ruscus,
hypopbyllum, i. 16. iii. 7.

ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ^b. Myrica, *Gale*,
iv. 11.

ΙΞΙΑ^c. Viscum, *album*, iii. 9,
16. ix. 1.

ΙΤΕΑ. SALIX, i. 7, 8. iii. 1, 2,
4, 6, 7, 13. iv. 7, 11, 14, 19.
v. 8, 4.

i. λευκη.

i. μελαινα.

i. ἐλικη.

ΚΕΔΡΙΣ. } Juniperus, *Sabina*,
ΚΕΔΡΙΑ. } i. 15.

ΚΕΔΡΟΣ^d. Juniperus, *Oxyce-*
drus, i. 8, 15, 16. iii. 7, 12.
iv. 6, 19. v. 5, 8, 9. ix. 1.

ΚΕΝΤΡΟΜΥΡΡΙΝΗ. Ruscus,
aculeatus, iii. 17.

ΛΕΥΚΗ^e. Populus, *alba*, i. 16.
iii. 1, 4, 6, 7, 10, 14. iv. 14,
19.

ΛΙΒΑΝΟΣ^f. Juniperus, *Lycia*?
ix. 1.

ΜΙΛΟΣ. Taxus, *baccata*, iii. 4,
6, 7, 10. iv. 1. v. 8.

ΜΥΡΙΚΗ^g. Myrica, *Cordifolia*,
i. 15, 16. iii. 4. iv. 7. v.
6.

ΣΜΙΛΑΞ. Smilax, *aspera*, i.
15, 16, 18. vii. 8.

ΤΕΡΕΒΙΝΘΟΣ. } Pistacia, *Te-*
ΤΕΡΜΙΝΘΟΣ. } *rebintbus*, i.
15. iii. 4,
6, 15. v.
8. ix. 1, 2.

Polygamia.

ΑΙΓΙΛΩΨ. Ægilops, *ovata*, vii.
12. viii. 7, 8.

ΑΚΑΝΘΟΣ^h. Mimosa, *Nilo-*
tica, iii. 4. iv. 3. vi. 1.

ΑΝΔΡΑΦΑΞΥΣ. } ATRIPLEX,
ΑΤΡΑΦΑΞΙΣ. } i. 23. vii. 1,
2, 3, 4, 6.

ΕΠΙΝΕΟΣ. Ficus, *Caprificus*,
(vid. Συκη, p. 22.) i. 24. ii.
3, 4, 6. iii. 6. iv. 14. v. 7.

ΙΣΧΑΙΜΟΣ. Andropogon, *Is-*
chæum, ix. 15.

ΚΕΡΩΝΙΑⁱ. Ceratonia, *filiqua*,
i. 18, 23. iv. 2.

^a Vide infr. Κεντρομυρρίνη ambo sub nomine, Ruscus L.

^b Chamæleagnus Dodon.

^c Fructus Ιξίας expresse vocatur diversus a fr. Ὑφειτος. Vid. Class. incert.
p. 29.

^d Cedri species omnes sub genere, Juniperus L.

^e Vid. Αιγείρος supr. Forfan Populus tremula L. nisi Europæ frigidioribus
propria.

^f Notam dubitationis adjeci. Resina Juniperi cujusdam vel Pinûs antiqui-
tus in usu inter suffimenta. N. B. Vox λιβανον (resina) solummodo occurrit,
ix. 1.

^g Vid. Ελεαγνος.

^h Hodie sub nomine Acacia in hortis et alibi; arbor speciosa.

ⁱ Observandum Ceratonia et Ficum ordinis Triœcii. L.

ΛΩΤΟΣ^a. *Celtis, Australis*, i. 8,
9, 13. iv. 3, 4.

NΑΡΔΟΣ^b. } *Andropogon*,
NΑΡΤΗ^c. } *Nardus*, ix. 7.

ΠΕΡΔΙΚΙΟΝ^d. *Parietaria, officinalis*, i. 11.

1. ΣΥΚΗ^e. *Ficus, Carica*, i. 5,
8, 9, 11, 13, 16, 19, 23,
24. ii. 3, 7. iii. 6, 7, 17. iv.
2, 6, 14, 16, 19. v. 7.

2. ΣΥΚΗ^f Αιγυπτια. *Ficus, Religiosa*, i. 23. iv. 2.

3. ΣΥΚΗ Κυπρια. *ib.*

ΣΦΕΝΔΑΜΝΟΣ^g. *Acer, campestre*, iii. 4, 6, 7, 11. v. 1, 4.

ΤΛΗΜΑ τι^h. *Mimosa, sensitiva*, iv. 3.

Palmæ.

ΚΟΥΚΙΟΦΟΡΟΣⁱ. *An Cocos?*

iv. 2.

ΚΥΚΑΣ. *Cycas, revoluta*, ii.
8.

ΦΟΙΝΙΞ. *Phoenix, Dactylifera*,
i. 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 23. ii. 2, 3, 8.

ΧΑΜΑΙΡΕΦΗΣ. *CHAMÆROPS*,
ii. 8.

Cryptogamia.

Filices.

ΑΔΙΑΝΤΟΝ^k. *ADIANTUM*.

ΗΜΙΟΝΟΣ^l. *Asplenium, Hemionitis*, ix. 19.

ΘΗΛΥΠΤΕΡΙΣ^m. *Acrosticum, Thelypteris*, ix. 20.

ΠΟΛΥΠΟΔΙΟΝⁿ. *POLYPODIUM*.

^a Vid. *Polyand. et Diadelph.*

^b Unguentum *Ναρδον* solum memoratur. Spec. Graminis diu latens, cujus radix et spica odoratissima. Vid. Act. Reg. Soc. Lond. 1790.

^c *Ναρτη* unguenti spec. diversa a *Ναρδα*. Vid. ix. 7. et *Ναιρον*, *Class. incert.*

^d Nomen adhuc servatur apud Græcos hodiernos *Περδικακι*. Vid. Prodr. Fl. Græc.

^e Vid. *Ερινης*, p. 21. N. B. Genus *Ficus*, ordinis *Triœcii*, L. Theophrastus recte observat ὅλως πολυεῖδες εἶναι το γένος των Συκων. de C. Pl. v. Genus *Ficus* in hac Classe collocatur, etsi proprie Genus *Triœcium*. N. B. *Συκη Ινδικη* *Rhizophora* L. Vid. *Dodecandr.*

^f Arbor hæc perperam vocatur *Συκαμινος*, i. 23. Vid. *Class. Monœc.*

^g Forſan A. *Pseudo-Platanus* L.

^h *Mimosa sensitiva* L. etsi sine nomine, descriptione tamen habitus, et præcipue ιδιοτητι του παθους inter plantas Theophrasto notas proculdubie enumeranda est. v. p. 77.

ⁱ *An Cocos* a *Κουκι*? *Palma, Thebaica*; *Coryphæ* affinis L. Ang. "Doom Tree," Bruce's Trav. v. 45. N. B. Non enumeratur inter sex species *Palmarum*, ii. 8.

^k *Adiantum* genus L. 19 species continens: ex textura folii humorem repellente, nomen Græcum.

^l *Hemionitis* L. Genus novi orbis.

^m Non occurrit Genus *Thelypteris* apud Linn. Planta hæc fronde indivisa (μονοκωλω.) Vid. Lex. Theophr.

ⁿ Nomen ex lobis frondis pedes *Πολυποδος* referentibus.

ΠΤΕΡΙΣ^a. PTERIS.ΤΡΙΧΟΜΑΝΕΣ. Adiantum,
Trichomanes.*Musci*.ΦΑΣΚΟΣ^b. Lichen, *pulmona-*
ris.*Algæ*.ΑΓΡΩΣΤΙΣ Ποντια. *Zostera*,
marina, iv. 7.ΑΜΠΕΛΟΣ Ποντια. *Fucus*, *na-*
tans, vel *bacciferus*, ib.ΔΡΥΣ Ποντια, *F. vesiculosus*, ib.ΕΛΑΤΗ Ποντια. *F. Abies ma-*
rina Gmel, ib.ΠΡΑΣΟΝ Ποντιον. *F. nodosus* ?
ib.ΠΡΑΣΟΝ ἕτερον. *F. loreus* ? ib.ΦΥΚΟΣ^c Βαπτικον. *F. palma-**tus*, ib. &c.ΦΥΚΟΣ Θριδακινη. *Ulva*, *Lac-*
tuca, ib.ΦΥΚΟΣ πλατυ, τετανωδης. *F.*
digitatus, vel *F. polyschides*, ib.ΦΥΚΟΣ Μαραθρον. *F. fænicu-*
laceus, ib.*Fungi*.

ΑΙΔΟΙΟΙΔΕΣ τι. PHALLUS.

ΑΣΚΙΟΝ^d. TUBER, i. 10.ΚΡΑΝΙΟΝ. *Lycoperdon*, *Bo-*
vista.

ΜΥΚΗΣ. AGARICUS ?

ΠΕΖΙΣ^e. PEZIZA ? de C. Pl.

ΠΙΝΗ. de C. Pl. iv.

ΠΥΞΟΣ. An ΠΥΓΟΣ ?

ΣΦΑΙΡΙΟΝ. PEZIZA^f ? iii. 8.

ΥΔΑΝΟΝ. HYDNUM ?

^a Α. πτερυξ, frons alato-pinnata.^b Καθαπερ τρυχος οδονιον in truncis arborum. N. B. φασκος item Galla.^c Ω, βαπτουσιν ερια περι Κρητην. Hinc Latini *fucare* pro tingere.^d In umbra, vel sub terra proveniens.^e Hinc Linnei, et aliorum nomen: synon. videtur Πυξου apud Ald.^f Quinque enumerantur species fungorum in foliis et truncis arborum crescentium, iii. 8.

ERRATA ET OMISSA.

ΑΜΠΕΛΟΣ, *Ιδαία*^a. Vacci-
nium, *Vitis Idæa*, iii. 17.

ΑΠΑΘΗ. Syn. *Αφακής*, p. 17.

ΚΑΛΑΜΙΝΘΑ. (vid. *Μινθα*,
p. 14.) de C. Pl. ii.

ΚΕΓΧΡΟΣ^b. CENCHRUS, viii.
1, 2.

ΚΥΔΩΝΙΟΣ. *Pyrus, Cydonea*,
ii. 3.

ΜΗΛΕΑ *αγρία*. P. *Malus*, fyl-

vestri statu: Angl, "Crab-
tree." de C. Pl. vi.

ΟΙΣΟΣ. *Salix, viminalis*, vi. 2.

ΟΡΜΙΝΟΝ *αγριον*. *Salvia*,
Schalaria. de C. Pl. vi.

ΟΧΝΗ. Syn. *Αχράς*, p. 12.

ΣΤΡΙΓΞ. *Species Arundinis*,
p. 4.

ΧΑΝΔΡΑΣ. Syn. *Χονδριλλας*,
p. 18.

^a Vid. *Αμπελος*, p. 7. N. B. Locus natalis περι φαλακρας καλουμενας Ιδης,
iii. 17. saxosis et calvis M. Idæ cacuminibus; utpote et altitudo πυγονιαιος,
Vaccinii speciem indicant, non obstante sententia in notula, p. 7. expressa.

^b Rectius *Panici* spec. cujus semen inter *αρουραια* et *σιτηρα*.

PLANTÆ CLASSIS INCERTÆ.

A.		ΑΠΙΟΣ ^f .	
ΑΔΩΝΙΣ. v. Ογωνις ?		ΑΣΙΝΗ ^g . de C. Pl. ii.	
ΑΙΓΕΙΠΤΡΟΣ ? ii. 9.		ΑΣΠΑΛΑΞ ^h . }	i. 11.
ΑΚΑΛΥΦΗ ^a . vii. 7.		ΣΠΑΛΑΞ.	
ΑΚΑΝΟΣ ^b . ix. 13.		ΑΣΠΑΛΑΘΟΣ ⁱ . ix. 7.	
ΑΚΑΡΝΙΚΟΣ ^c . iii. 18.		ΑΦΥΛΛΑΝΘΕΣ. vii. 9.	
ΑΛΣΙΝΗ. ix. 13.		ΑΧΥΝΩΨ ^k .	
ΑΝΑΔΕΝΔΡΑΣ ^d . de C. Pl. v.			
ANTIPPINON ^e . }	ix. 21.		
ANTIPPIZON. }			
ΑΠΑΡΓΙΑ. vii. 9.			
		B.	
		ΒΑΣΑΜΟΣ ^l . ix. 2, 6, 7	
		ΒΟΛΒΟΣ ^m . i. 10, 16. vii. 2.	

^a Spec. ποωδης cum Τευτλιδι; edulis post coctionem.

^b Vox ακανος pericarpium Carduorum indicat; sed semel, ut syn. Χαμοι-
λεοντος λευκης.

^c Forfan Hederæ spec. nomen Gentilitium. Vid. Hederæ varietates, p. 8.

^d Semel occurrit; Αναδενδρας et Συκη συντροφαι αλληλαις, ib. An Parasita
trunco Ficûs innascens?

^e Forfan planta magica, και γαρ αει ποiei ευκλειαν. forma floris ως μοσχου
ρίνος.

^f Videtur Euphorbiæ spec. Vid. Απιος. Pyrus, communis, p. 12.

^g Cum Έρφυλλα, ut species repens; an error textûs pro Απαρινη?

^h Semel occurrit, ubi radix crassa memoratur.

ⁱ Desc. nulla, sed inter Aromata vox occurrit: an fructus vel σπος Ασπαλα-
κος. Vid. Σπαλαξ.

^k Forfan legendum Κυνωψ. Vid.

^l Forfan Amyris, Gileadenfis, Encycl. Brit.

^m Allii L. genus radice bulbosa: vel Scilla unifolia Falc^r. syn. Βολβινης.
Hexandr.

ΒΟΛΒΟΣ^a Εριοφορος. vii. 13
 ΒΟΤΠΡΗΣΤΙΣ^b. vii. 8.

Γ.

ΓΛΕΙΝΟΣ^c. iii. 4.

Δ.

ΔΑΤΚΟΝ^d Δαφνοειδης. ix. 15,
 22.

ΔΕΝΔΡΟΝ^e Τιγρινον. v, 4.
 6.

ΔΡΥΠΙΣ^f.

Ε.

ΕΛΑΘΡΠΙΟΝ^g. iv. 6.

ΕΛΕΙΟΛΕΙΜΩΝΙΑ^h. vi. 4.

ΕΛΕΝΙΟΝⁱ. vi. 6, 7.

ΕΛΞΙΝΗ^k. vii. 7.

ΕΠΙΜΕΝΙΔΕΙΟΣ^l. vii. 11.

ΕΝΘΟΤΣΙΚΟΝ^m. vii. 7.

ΕΠΙΠΕΤΡΟΝⁿ. vii. 8.

ΕΥΩΝΥΜΟΣ^o. iii. 18.

Η.

ΗΔΥΟΣΜΟΣ^p. vii. 7.

Θ.

ΘΗΛΥΦΟΝΟΝ^q. ix. 19.

Ι.

ΙΕΣΙΑ^r. de C. Pl. v.

ΙΚΑΜΗ^s. } iv. 11.

ΙΚΜΗ. }

^a Spec. incognita, Hyacintho Peruviano forsan affinis, cujus bulbus *ἐχρειον ὑπο τοὺς πρώτους χιτῶνας*. vii. 13.

^b A quibusdam Bupleurum, *rigidum*.

^c Spec. Ζυγίας* ἐν τῷ ὄρει Ζυγία* ἐν δὲ πεδίῳ Γλεινός. Vid. Ζυγία Monœc.

^d Spec. venenosa, sine desc. forf. Thapsia L.

^e Arbor, cujus lignum densum et pulchre variegatum.

^f Δρυπεψ usurpatur de fructibus deciduis: vid. Lex. Theophr. Hic planta spinosa designatur. N. B. Vox Drupa, Bot. Bacca, nucleo intus.

^g Enumeratur in Catalogo cum Helleboro et Scammonia; forf. Momordica, *Elaterium* L.

^h Aliis Λυλειμωνία, palustris planta; textus certe corruptus

ⁱ Differt ab Helenio L.

^k An Polygoni scandentis spec. vel Fumaria claviculata, vel capreolata.

^l Nomen triviale spec. Σκυλλας. Vid. Cl. *hexandr*.

^m Cum Ἠδυοσμων enumeratur: anne Thymus, *maslichina* L. ex odore pungenti.

ⁿ Forfan Alchemilla, *arvensis* L.

^o Semel occurrit. Planta fausti ominis, ut nomen indicat. Differt ab Eonymo L. fructus similis Sefami, ἐν φασί.

^p Species tota fragrans, ut videtur, caule sc. et foliis.

^q Syn. Σκορπιου. Vid. infra.

^r Forf. error textus pr. Ιξία.

^s Planta palustris, cum Ἰωνῶ: vox derivari videtur ab ἰκμας, humor.

ἸΠΠΟΝ^a. }
ἸΠΠΟΝ. } iv. 11.

ἸΠΠΟΜΑΝΕΣ^b. ix. 15.

ΙΣΧΑΣ^c. ix. 10.

ΙΨΟΣ^d. iii. 6.

K.

ΚΑΔΥΤΑΣ^e. de C. Pl. ii.

ΚΕΝΤΑΤΡΙΣ^f τριόρχις.

ΚΟΚΚΟΣ^g Κνιδίος. ix. 22.

ΚΟΨΙΜΟΣ^h. iii. 15.

ΚΥΝΩΨⁱ. vii. 8, 10.

ΚΩΜΑΚΟΣ^k. ix. 7.

Λ.

ΛΑΚΑΡΑ^l. iii. 7.

ΛΕΙΜΟΔΩΡΟΝ^m. de C. Pl. vi.

ΛΕΙΜΩΝΙΑ. v. ΕΛΕΙΟΛΕΙΜΩ-
νία.

ΛΕΥΚΟΙΟΥⁿ αὐθι δένδρον, iv.
9.

ΛΙΒΑΝΩΤΙΣⁿ. } iv. 6. ix. 2,
ΛΙΒΑΝΩΤΟΣ. } 4, 12

ΛΙΜΝΩΔΕΣ^o τι.

M.

ΜΑΓΥΔΑΡΙΣ^p. i. 11. vi. 3.

ΜΕΓΑΛΟΚΑΡΠΟΝ^q τι σφο-
δρα.

ΜΗΛΩΘΡΟΝ^r. vi. 1.

ΜΝΑΣΙΟΝ^s. } iv. 9.
ΜΝΑΥΣΙΟΝ.

^a In aquis nascens, cum priore. N. B. Ex nomine conjicere libet Equifitum L. vel Hippurim indicari.

^b Τιθυμαλλου species, (vid.) si non succus inspissatus.

^c Legitur Ισχας Απιος, vel Ισχας, η Απιος. forf. synon.

^d Desc. nulla, nec apud Botánicos vox occurrit; planta forsan venenosa, ab ιπτω.

^e Vox Syriaca, spec. parasiticam indicans.

^f Forf. species Centauriæ. Vid. p. 17. Ex radice facile distinguenda.

^g Forfan Capficum, frutescens.

^h Affinis Cratægi fructu rotundo.

ⁱ An Echinops? vel ex forma floris ringenti, Bot. Antirrhini spec. Angl. "Snap-dragon." Vid. Αχυνωψ, p. 26.

^k Arbor fructu aromatico L. Myrobalano affinis. A quibusdam Myristicæ, spec.

^l Forf. Λακαθη. Vid. Icosandr.

^m Ευθυς τη ρίζη παραφθομινον. Parasitica spec. An error textûs pro Αίμαδωρον? Vid. Didyn. Affinis videtur Βουκκρατος, vel potius syn. Λειμωδωρον το Βουκκρας. de C. Pl. v.

ⁿ Arbor Thurifera nondum clare investigata; ab aliis herba: Athamanta, vel Ligusticum.

^o An Hottonia, palustris? Vid. desc. floris et foliorum, Cat. Alph.

^p Lasepitii spec. ut videtur. Vox Æthiopica?

^q An Mangifera, Indica L. item ἡδυκαρπος σφοδρα.

^r Fruticis inermis spec. cum Cisto, et Eruthedano.

^s Vox Ægyptiaca speciem palustrem indicans, cujus nulla in synon. Linn. mentio.

ΜΥΤΑ ^a . vi. 8.	ΟΙΝΟΘΗΡΑ ^k . ix. 21.
ΜΥΤΑΚΑΝΘΟΣ ^b . vi. 4.	ΟΙΝΟΡΑΝΘΗΣ ^l . de C. Pl. vi.
ΜΥΔΙΟΝ ^c . vi. ?	ΟΛΙΒΑΝΟΣ ^m . ix. 4.
ΜΥΟΦΟΝΟΣ ^d . vi. 1, 2. vii. 10.	ΟΝΟΚΙΧΛΗΣ ⁿ . vii. 10.
ΜΥΡΡΙΣ ^e .	ΟΝΟΠΥΞΟΣ. De C. Pl. vi.
	ΟΞΥΤΑΚΑΡΠΑ ^o . } iii. 6.
	ΟΞΥΚΑΡΠΑ. }
N.	ΟΡΟΒΑΓΧΗ ^p . de C. Pl. v.
ΝΑΙΡΟΣ ^f . } ix. 7.	ΟΤΙΓΓΟΣ ^q . } i. 10, 11.
ΝΑΡΤΗ. }	ΟΤΙΤΟΣ. }
ΝΗΛΕΙΑ ^g i. 8.	Π.
ΝΗΠΕΝΘΕΣ ^h . ix. 15.	ΠΑΝΤΑΔΟΥΣΑ ^r . vi. 4.
O.	ΠΕΡΣΕΑ ^s . } iv. 2.
ΟΙΝΑΡΟΣ ⁱ . i. 15.	ΠΕΡΣΙΟΝ. }

- ^a Cum Celastro. Forf. error textûs.
- ^b A quibusdam Asparagus sylvestris: ab aliis Ἰπποφειῶς syn. v. p. 6.
- ^c Arbor quædam glandifera, forsan Quercûs species.
- ^d Inter umbelliferas, cum Ναρθηκί et Μαραθρώ.
- ^e An id. q. Μυρρίνη.
- ^f Unguentum Ναίρον una cum Ναρτή memorantur. V. Ναρδος, p. 22.
- ^g Error, ut videtur, pro Ελεία, palustri. Ανδραχνη Νηλεία, ib. pr. A. Ελεία.
- ^h An succus inspissatus Papaveris, *Somniferi*, Angl. "Opium," vel Papaveris species? Vires ab Homero decantatæ.
- ⁱ Cum Andrachne; si non nomen triviale.
- ^k Vires εκστατικαί; odor vinosus: affinis Στρυχνου, vel Οναγρας Falc^r.
- ^l Forf. legend. Οινανθης.
- ^m Mentio fit Gummi, Olibanum. Anne scribendum ὁ Λιβανος? Vid. Λιβανος, p. 21.
- ⁿ Cum Cichorio.
- ^o An error textûs? Forfan legendum οξυακανθα, syn. Cratægi?
- ^p Amplexu et luxuria plantas necat, ut Polygonum, *Fagopyrum*; minime Orobanche, L. Moldenhauer conjicit vocem hanc gentilitiam esse Ari, *Colocasia*. V. Tentamen in Theophr. p. 60.
- ^q Pronuntiandum Vingos. Vox Ægyptiaca. Species sub terra radice tuberosa.
- ^r Nullibi occurrit. Forf. nomen gentilitium.
- ^s Non Laurus *Persea* L. sed forf. *Persea* arbor; Ger. em. 1606. Forf. το Περσιον fructus Amygdali, *Perficæ*. L.

ΠΙΛΟΣ ^a ? iii. 8.	ΣΜΥΡΝΑ ^l . iv. 6. ix. 1, 2, 4, 7.
ΠΙΤΤΩΝ ^b . vii. 13.	ΣΠΑΛΑΞ. vid. Ασπαλαξ.
ΠΙΤΤΙΝΗ ^c .	ΣΠΕΙΡΑΙΑ ^m . i. 23. vi. 1.
ΠΟΛΙΟΝ ^d .	ΣΤΕΛΙΣ ⁿ . de C. Pl. ii.
P.	ΣΤΛΕΓΝΙΣ ^o , vel Σιλιγνις.
ΡΟΔΟΥ ^e ανθει δένδρον. iv. 9.	ΣΤΡΟΥΘΙΟΣ ^p . vi. 3.
ΡΥΤΤΟΣ ^f . vi. 3.	T.
Σ.	ΤΕΡΜΙΝΘΟΥ ^q ὁμοιος. iv. 5.
ΣΙΔΗ ^g . iv. 11.	ΤΕΤΡΑΛΙΞ ^r . vi. 3.
ΣΚΟΛΥΜΩΔΗΣ ^h τις. ix. 13.	ΤΙΓΡΙΝΟΝ ^s ξυλον. v. 6.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ⁱ . vi. 3. ix. 14.	ΤΡΙΠΟΛΙΟΝ ^t . ix. 21.
ΣΚΥΘΙΚΗ ^k ῥιζα. ix. 13.	Υ.
	ΥΦΕΑΡ ^u . iii. 16.

^a Incertum an Galla, vel Fungus.

^b Species bulbosa. N. B. Ambo ita dicti ex foliis Pini? Vox Pithyusa occurrit inter syn. Euphorbiæ.

^c An genus diversum? vel forf. Ajuga, *Chamæpitys*.

^d Polium, *Creticum* Bauhin?

^e An Hybiscus L.

^f Certe Cardui affinis genus. N. B. Vox Ritro occurrit inter synonyma Linnei, sc. Echinops, *Ritro*.

^g Planta aquatica. Vid. *Μνασιον*. Pericarpio globoso instar mali granati, unde nomen.

^h Affinis Scolymi Linn. sed lethalis.

ⁱ A quibusdam Genista, sed male; *ακανου* enim mentio. Foliis Cyclaminis; radice revoluta. N. B. Spec. alia aphylla, forf. Ulex. L.

^k Ex dulcedine succûs Glycirhiza videtur innui.

^l Arbor myrrhifera Arabiæ.

^m An Spiræa L? non si licet conjicere ex descriptione.

ⁿ Spec. parasitica in truncis arborum. Cum Visco et Υφεατι.

^o Forfan tritici var.

^p Duo Στρουθιοι occurrunt. 1. Cardui affinis pericarpio lævi, ut Sonchus. Vid. Στρουθιον, p. 12. 2. Pyr. *Cydonia*, sylvestri statu: sic αντι Κυδωνιας Στρουθιον, vi. 3. Apud Varronem enumerantur Mala Struthia, et Mala Cotonea: qu? i. c. 59.

^q Vid. Τερμινθος. Class. Diœc.

^r An Carduus Eriophorus? vel foliorum habitu affinis planta? N. B. Inter Ericas Linn. nomen occurrit triviale Tetralix.

^s Vid. Δενδε. Τιγρινον. p. 25.

^t Spec. pharmaceutica ab Homero decantata. An After, *tripolium* L?

^u Cum Στελιδι et Ιζια in truncis arborum.

Φ.	ΦΛΟΓΙΜΟΝ ^c . vi. 7.
ΦΕΩΣ ^a . vi. 3, 4, 5.	ΦΛΟΜΟΣ ^d μελαινα. ix. 13.
ΦΙΑΥΚΗ ^b . i. 15. iii. 4, 6.	ΦΛΟΞ ^e . vi. 6.
	ΦΥΛΛΟΝ ^f το. ix. 18.

^a Planta spinosa, cum Capparide, Ononidi, Πανταδουση. N. B. Vox Φλειωσ apud Aldum, errore textûs; Φλειωσ enim Scirpus. vid. p. 6. Apud Falc^r, Papyrus Syriacus. Vox Φειωσ synonyma apud quosdam Στοιβης. Vid. Syngen.

^b An Rhamnus, *Alaternus* L.? vid. Desc.

^c Ex colore flammeo forsan Erythronium, *Dens canis* L. etiam si libet con-
jicere ex præcocitate floris.

^d Phlomis Genus L. sed diversum a Φλομφ. Obiter notatur in desc. Papaveris nigri. N. B. Φλομος μελαινα Diosc. Verbascum, *sinuatum* L. φλ. λευκη. Verb. *plicatum*. Prodr. Fl. Græc. 150.

^e Inter flores coronarios cum Διος ανθει an Agrostemma, *flos Jovis* L. N. B. Phlox Linn. Genus novi orbis.

^f Forfan Mercurialis, *perennis*. Spec. duæ; φ. αρρενογονον, et φ. θηλυγονον; ex forma fructûs δικροφ, vel geminata. Vid. Ger. em. p. 333. de Arrenogono et Thelygono.

QUÆ IN REGNI ANIMALIS SEX CLASSIBUS
LINNEI OBITER A THEOPHRASTO
NOTANTUR.

CLASSIS PRIMA.

MAMMALIA.

ΔΟΡΚΑΣ. *Capra, Dorcas*; vel *C. Gazella*.

Hab. Εν τη μη υόμενη γη. (Vid. infr. Πτώξ.)

ΕΛΑΦΟΣ. *Cervus, Elaphus*? an *C. Capreolus*.

Ὡς τα περι τας Ελαφους, αἱ τους Εχεις εσθιουσιν, ὑφ' ὧν τα
αλλα θνησκουσι. de C. Pl. iv.

ἼΠΠΟΣ. *Equus, Caballus*.

Λοφουρος a Theophrasto sæpius vocatur; cauda sc. cristis usitata.
Στελεφουροι e contra, cauda, stipitis instar, cylindrica, æquali; Bos,
Ovis, Cervus.

ΚΤΩΝ. *Canis, familiaris*.

Κυν και Ὑς μονοι των θερμων πολυτοκει, (sc. 12, 15, 20. uno
partu.) de C. Pl. i.

ΛΑΓΩΣ. *Lepus, timidus*.

Τα ιχνη των Λαγων ευοσμοτερα, (the scent lies better) ψε-
κασθεντα μαλακως. Μεταπωρου καιρος κυνηγιας, όταν αἱ οσμαι
των ανδρων ου παρενοχλουσι. de C. Pl. l. vi. Superfætatio Le-
poris occurrit in historia plantarum.

ΠΑΡΔΑΛΙΣ. *Felis, Pardus*.

Solus ευοσμος (odore fragranti delectatur.) de C. Pl. vi. Obser-

vatur a Theophrasto animalia in genere averfari odores. N. B. Species nonnullæ generis Felis L. ευωδεσι delectantur ; e. g. Felis, Rattus L. oleo Rhodii, utpote et Felis, Lutra.

ΠΤΩΞ. Mus, *Jaculus*.

Εν τῇ μὴ ὑομένη, (in partibus Libyæ ubi pluit nunquam,) ἴδια πλειὼ γίνεσθαι· καὶ Πτωκα, καὶ Δορκαδα, καὶ Στρουθιον, iv. 4.

ῚΣ. Sus, *Scrofa*.

Cum Cane ; μουνος των θερμων πολυτοκει, (vid. Κυων.) de C. Pl. iv.

CLASSIS SECUNDA.

AVES.

ΑΕΤΟΣ. Falco, *Cbrysaëtos*.

Mentio fit in plantis magicis colligendis, Αετον φυλαττεσθαι, ix. 9. respectu augurii boni.

ΓΥΨ. Vultur, *Pernopterus*.

Αναιρεται ὑπο των μυρων. de C. Pl. vi.

ΔΡΥΟΚΟΛΑΙΠΤΟΣ. Picus, *martius*, ix. 9.

Νυκτωρ κελευουσιν ορυττειν τας ῥιζας της Παιωνιας· εαν γαρ οφθῃ ὑπο Δρυοκολαπτου, κινδυνευειν τοις οφθαλμοις, ib.

ΙΚΤΙΝ. Falco, *Milvus*.

N. B. Ex voce αἴσσω conjicere licet Ικτινα inter Falcones rapidi volatûs, locum obtinere.

ΚΙΤΤΑ. Sitta, *Europæa*. de C. Pl. ii. p. 155. B.

Ορυττει η Κιττα θησαυριζομενη τας βαλανους.

ΚΟΚΚΥΞ. Cuculus, *canorus*. de C. Pl. ii. 155. B.

Ου δη του Κοκκυγος (φυσις), ει μη ην Ὑπολωις· (vid.) καὶ εἰς την νεοττιαν τα ωα τιθῃσιν.

ΣΤΡΟΥΘΙΟΣ. Struthio, *Camelus*, iv. 4.

Εν τῇ μὴ ὑομένη (γῇ) γινεται.

ΥΠΟΛΩΙΣ. *Motacilla, modularis, vel Curruca antiquorum.* Vid. sup. Κοκκυξ.

ΧΑΡΤΟΔΡΑ ? }
ΧΑΡΑΔΡΙΑ ? }

Κοπρος ανθρωπου και Χαρτοδρας δριμυτατη, ii. 8. an *Fimus Columbinus* ? *cujus vires notissimæ.*

CLASSIS TERTIA.

AMPHIBIA.

ΕΧΙΣ. *COLUBER* ; nomen Genericum.

Vid. Ελαφος, qui dicitur *Serpentibus* vesci. de C. Pl. iv.

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ. *CROCODILUS.*

Ῥιζα του κυαμου (vid. Κυαμος Αιγυπτια, p. 18.) ισχυρα, και επακανθιζουσα· διο και ο Κροκοδειλος φευγει μη προσκοψη τω οφθαλμω, iv. 10.

ΟΦΙΣ. *COLUBER.*

Αναιρουνται υπο των Σκορπιων. de C. Pl. iv. animal αποτον, (fine aqua vivens,) iv. 4.

Οφεις μικροι σφοδρα, συσπειρομενοι, ("coiled up,") iv. 5.

ΣΑΤΡΟΣ. *LACERTA.* Genus αποτον in aridis Libyæ vivens, iv. 4.

CLASSIS QUARTA.

PISCES.

ΚΑΡΧΑΡΙΑ. *Squalus, Carcharias.*

Ἡ δε θαλαττα (Ερυθρα) θηριωδης, και πλεισους εχει τους Καρχαριας, ωσε μη ειναι κολουμβησαι, iv. 8.

CLASSIS QUINTA.

INSECTA.

ΑΤΤΕΛΑΒΟΣ. *ATTELABUS.*

Καταβρωθεντων των εργαων αμπελου, (i. e. furculis *Vitis eros,*) υπ' Αττελαβων, ii. 4.

N. B. Genus *Attelabus* a Linneo fistitur, S. N. 619.

ΚΑΜΠΗ. *Eruca*. Inter *Lepidoptera*.

N. B. *Metamorphoseων Insectorum clarissima extant indicia apud Theophrastum. de C. Pl. l. v.* Αἱ μεταβολαὶ κατὰ τὴν γεν-
νησιν· οἷον ἐπ' αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τῶν καλουμένων *Ψυχῶν*· ἐκ *Καμπῆς*
γὰρ *Χρυσάλλης*, (*Chrysalis vel Pupa L.*) εἴτ' ἐκ ταύτης ἡ *Ψυχή*,
(*Imago L.*) vocantur *τριγωνήσαντα*. *de C. Pl. i.*

ΚΑΝΘΑΡΙΣ. *Curculio, granarius?*

Ἐπιγίνεται ἡ *Κανθάρις* ἐν τοῖς πυροῖς, viii. 10.

ΚΕΝΤΙΣ.

ΚΕΝΤΡΙΣ.

} *Ichneumon parvum non descriptum.*

Ἔστι καὶ ἕτερον γένος τῶν *Ψήνων* (vid.) ὃ καλοῦσι *Κεντίνας*· οὗτοι
δ' ἀργοὶ, ὥσπερ *Κηφήνες*, (*Apis, mas L.*) τοὺς εἰσδυόμενους κτείνου-
σιν, ii. 9. N. B. *De Ψήνι Ficūs fermo est; fors. Cynips, Psenes.*
L. S. N. 919.

ΚΕΡΑΣΤΗΣ. Inter *Coleoptera*.

Ἰδίον τι περὶ τὸν καλούμενον *Κεράσην* συμβαίνει· ἐν τῇ *Ελαίᾳ*
γίνεται, ἐν δὲ τῇ *Συκῇ* ἐντικτεῖ. *de C. Pl. v.* *Σκωληκας ἐντικτομέ-*
νους παντας, (erucas,) εἰς κεράσην ἀποκαθίσασθαι; φθεγγονται
δ' οἷον τριγμόν, (de fridore alarum inter volandum, ib.) de C.
Pl. v.

ΙΨ. CYNIPS.

Οἱ *ιπες*, οἱ ἐν τοῖς κυάμοις ἐγγινομένοι, καὶ ἄλλοι ἐν ἄλλοις,
ὥσπερ ἐν τοῖς δένδρεσι καὶ ξυλοῖς ἐλεχθῇ. N. B. *Animal a fe-*
quente diversum ex modo victus, quod sæpe innuitur, viii. 10.

ΚΝΙΨ. APHIS.

Ἐγγινοῦνται δὲ *Κνίπες* ἐν τισὶ τῶν δένδρων....καὶ δοκοῦσιν ἐκ τῆς
ὕγροτης συνίστασθαι, τῆς ὑπὸ τὸν φλοιὸν αὐτῇ δ' ἐστὶ *ΓΑΤΚΕΙΑ*.
γίνονται δὲ καὶ ἐν *λαχανοῖς*, iv. 7.

ΟΝΙΝΝΟΣ.

ΟΝΙΣΚΟΣ.

} *ONISCUS.*

Ἐν καυλοῖς τῆς *Δρυὸς* καὶ *Ελατῆς* ποντίας ἐνδεκυκότες οἱ *Ονιννοί*,
καὶ τὸ ὅμοιον *Πολυποδι*, iv. 7.

ΟΝΟΣ. *Oniscus, Asellus.*

Πολυποῦν τι, καὶ μελάν συσπειρομένον εἰς ἑαυτὸ, (*in se circum-*
volutum,) frequens in *Libyæ arenis*, iv. 4.

ὍΜΟΙΟΝ Πολυποδι. (Vid. supr.) Nereis, vel Scolopendra in Ne-reide Britannica descripta, in caulibus Fuci Tamariscifolii nidu-lans, iv. 7.

ΠΡΑΣΙΚΟΤΡΙΣ. Cimex, *prasinus* L. 722.

Εν τοις πρασοις, και εν αλλοις πλειοσι αι Πρασικουριδες, vii. 5.

N. B. Hinc forsan vox Anglica, “ Lady Cow.”

ΣΗΠΙΑΙ ? }
ΣΗΤΑΙ. } Genus ignotum.

Animal noxium quoddam mordens cum Εχει et Φαλαγγιω, (Aranea, *Avicularia* L. vel Tarantula.) Χρωνται Πανακη Χειρω-νειω προς τους Εχεις και τα Φαλαγγια, και τας Σητας, και τ’αλλα ερπετα, ix. 12.

N. B. Ex voce ερπετα licet conjicere Σητας vel Σηπας reptilia quædam. Animal aliud Σης.

ΣΚΟΛΟΠΙΑ. Scolopendra, *Electrica* L.

Γηθου ριζαις χαιρει, ut colligi potest ex textu corrupto, vii. 11.

ΣΦΟΝΔΥΛΗ. Iulus L.

Ριζας δριμειας ουδεν αλλο θηριον απτεται, η δε Σφονδυλη πα-σων, ix. 14.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ. SCORPIO.

In aridis nascitur. Vid. quæ dicitur de Scorpione et Serpente. v. Οφεις, p. 33.

ΦΑΛΑΓΓΙΟΝ. ARANEA.

A. *Avicularia* L. vel A. *Tarantula*, ix. 12. Vid. supr. Σηται.

ΦΘΕΙΡ. Pediculus, *humanus*.

Οι Φθειρες συγγενεις εισι αιματος· εξ ου διαφθαρεντος, η γεγε-σις. de C. Pl. ii.

ΨΗΝ. Cynips, *Psenes* L. L. S. N. 919.

Οι δε Ψηνες εκδυονται εκ του ερινεου· γινονται δε εκ των κεγχρα-μιδων. σημειον δε τουτου λεγουσι, οτι επειδαν εκδυωσιν, ουκ ενεισι κεγχραμιδες· εκδυονται δ’ οι πολλοι εγκαταλειποντες, η ποδα η πτερον, ii. 9.

ΨΥΛΛΑ. *Tenthredo, Rapæ?* L. S. N. 926.

Θηρια δε γινεται ταις μεν 'Ραφανισι, Ψυλλαι, vii. 7.

CLASSIS SEXTA.

VERMES.

Molluscæ.

'ΕΛΜΙΣ πλατεια. *Tænia, lata.*

'Η δε ριζα της Πτεριδος (vid.) μονον 'Ελμινθα την πλατειαν εκβαλλει· ἡ δ' 'Ελμις συμφυτον ενιοις εθνεσιν· εχουσι γαρ, ὡς επιπαν, οἱ Αἰγυπτιοι, ix. 22.

ΙΝΕΣ? *Ascarides, vermiculares?*

Φασι δε μονον (ριζαν Ελατηριου) φαρμακον ὑπερ ινων ανω. αυτη μεν ουν ιδιοτης της δυναμεως. N. B. Textus videtur corruptus, ix. 14. Alii legunt ὑπερινον una voce.

ΚΟΧΛΙΑ Συκης.

Animalculum testaceum in truncis arborum; frequens in viridariis, iv. 16. Nescio an descriptum.

ΟΣΤΡΑΚΟΔΕΡΜΑ Ζωα. TESTACEA.

Mentio fit Οστρακοδερμων in apicibus Fuci, *Serrati, et Vesiculosi.* N. B. *Serpulæ præcipue, et juniores Cochleæ illic nidulantur. iv. 7.*

ΠΟΛΥΠΟΥΣ. ASTERIAS.

'Η του Πολυποδιου (vid. Tab. Syft. p. 22.) ριζα δασεια, και εχουσα κοτυληδονας (vid. Lex. Theophr.) ὡςπερ αι του Πολυποδος πλεκταναι (*Asteriæ tentaculæ,*) ix. 14.

ΠΑΤΥΣΙΑ. *Laplysia, depilans?*

'Η Σπογγια, και αι Πλυσαι καλουμεναι εν θαλαττα ετεραν εχουσι φυσιν, (i. e. *Zoophytis, non Plantis adnumerandæ,*) iv. 7.

ΣΚΩΛΗΞ. *Lumbricus, terrestris.*

Ad radices 'Ραφανιδων, vii. 5. N. B. Σκωληξ nomen generale Vermium et Erucarum, &c. ut Σκωληξ Μεσπιλου, iii. 12. Σκ. Συκης. de C. Pl. v. &c.

ΣΠΟΓΓΙΑ. SPONGIA.

Cum Πλυσια, ut naturæ a plantis diversæ.

ΣΥΚΗ ποντια. *Alcyonium, Ficus ?*

Αφυλλος· μεγεθει ου μεγαλη, χρωματι φοινικω.

ΤΕΡΗΔΩΝ. *Teredo, navalis.*

Ου γινεται Τερηδων αλλ' εν θαλασση, v. 5. φασι δε Πευκη
Ελατης μαλλον υπο Τερηδονος εσθιεσθαι, ib.

ΛΕΠΑΣ. *PATELLA.*

Προσπεφυκτια πετραις· optime, iv. 7.

LITHOPHYTA.

ΜΥΚΗΣ λιθινος. *Madrepora, Fungites.*

Suspiciatur Theophr. ότι αφ' Ηλιου απολιθουνται, iv. 8.

ZOOPHYTA.

ΔΕΝΔΥΦΙΑ κερατινα. *Gorgoniæ, vel Ifidis species.*

Τοις οζοις τραχεα, και επ' ακρου πυρρα· item fragilia, nec igni
combustibilia, sed in igne candentia, ut ferrum, iv. 8.

N. B. Ex apicibus cortice nudatis, coccineis, *Gorgonia, Nobilis*
indicari videtur.

ΦΟΙΝΙΞ ποντια. *Gorgonia, flabellum ?*

Βραχυσελεχης σφοδρα· εκφυσεσι των ραβδων ευθειαις· κατω-
θεν κυκλοθεν ως ραβδων· ακρεμονες δ' ωςπερ εν πλατει, κατα
μιαν συνεχεις, (apices expansi et complanati, partibus inter sese
inofculantibus ?)

ΣΧΟΙΝΟΙ λιθινοι. *SERTULARIÆ.*

N. B. Species quædam ramis simplicibus : pluribus ex uno
disco.

LEXICON THEOPHRASTI.

LEXICON THEOPHRASTI.

LEXICON THEOPHRASTI.

ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΟΣ. Angiosper-
mus, *Bot.* cujus femina pe-
rianthio laxo involvuntur.

Vid. Γυμνοσπερμος, vii. 3.

ΑΓΚΥΡΑ. Instrumentum rusti-
cum bi- vel tri-dentatum.

ΑΓΝΩΔΗΣ. Agni, *casti* similis.

Vid. Αγνος, Tab. Syst. p. 14.

ΑΓΟΝΙΟΣ. } Vid. Γωνια.

ΑΓΩΝΙΟΣ. }

ΑΓΩΓΗ. Ordinatio ramorum
arboris, *Angl.* "training," i.
14.

ΑΔΡΟΣ. Firmus, validus, cras-
sus : opp. τῷ λεπτῷ, vii. 4.

ΑΔΥΝΑΜΙΑ. Impossibilitas, δυ-
νασθαι την αδυναμιαν, Græ-
cismus, ix. 19.

ΑΕΠΙΣΠΟΡΟΣ. Vid. Επισπορος,
vii. 1.

ΑΘΕΡΩΔΗΣ. Aristatus, *Bot.* vii.
10.

ΑΘΡΑΥΣΤΟΣ. Tenax, *Angl.*
"tough." de ligno, i. et
pass.

ΑΘΡΙΠΕΔΗΣ. Non erosus ver-
mibus, a Θριψ. v.

ΑΘΥΡΟΣ. Forf. αχυρος. Palea-
ceus, *Bot.* de C. Pl. iv.

ΑΙΓΙΣ. Trunci pars in pinu, ad
nodos, tabulis pictoriis, vel
scriptoriis usitata, iii. 10.
etiam ad clypeos, ib. N. B.
Quandoque cor totum trun-
ci. *Mold.*

ΑΙΜΑΣΙΑ. Sepes ex spinis,
quæ corpus vulnerant, unde
nomen. pass.

ΑΙΝΟΣ. Sine fibris (vid. Ινες,)
de ligno. hinc ενῖνος. pass.

ΑΙΡΩΔΗΣ. Loliaceus *Bot.* Lolio
infestatus. de segete, v. 5.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΝ. Oris palatum.
de C. Pl. vi.

ΑΙΤΙΑΙ αἱ. Effectus, proprie-
tates, vel "potestates herba-
rum." pass. Hinc titulus
Libri Περι Φυτων Αιτιων, vel,
ut Varro rectius scribit, Περι
Φυτικων Αιτιων, l. i. 5.

ΑΚΑΝΟΣ. Pericarpium vel ca-
pitulum in Carduis, &c. &c.
etiam Cardui spec. v. p. 25,

ΑΚΑΝΙΖΩ. supr.

ΑΚΑΡΔΙΟΣ. Vid. *Καρδια*, Bot.

ΑΚΙΔΩΔΗΣ. Triangulari-acutus : similis cuspidis sagittæ ; de forma feminis *Σχοινου*. Vid. iv. 13.

ΑΚΙΣ. supr.

ΑΚΜΑΙ αἱ. Tempora convenientia. Αἱ ἀκμαι πρὸς τὴν τομὴν, "the exact season," v. 1.

ΑΚΝΙΣΟΣ. Scaber, non rufus. *Σωμα ακνισον*. de C. Pl. ii.

ΑΚΟΝΑΙ αἱ. 1. Rupes calcariæ ; ab *ακονη*, cos, "a whetstone," ix. 16. 2. Nomen loci.

ΑΚΟΠΟΣ. Vermibus intactus. de vestibus, feminibus &c. iv. 4. de C. Pl. iii.

ΑΚΡΑΤΗΣ. 1. Immoderatus, p. 2. immistus, crudus : *γη ἀκρατης*. de C. Pl. v.

ΑΚΡΕΜΟΝΕΣ οἱ. Rami majores, vel superiores, i. 4.

ΑΚΡΟΔΡΥΑ τα. Fructus spec. quæ putamine teguntur Cass. Bass. *ῥοια, πισταχια, κασανα*. de C. Pl. iii.

ΑΚΡΟΥ. ἐξ ἀκρ. περιττον. de folio pinnato, impari Bot.

ΑΚΡΟΡΡΙΖΟΣ. Radice horizontali Bot.

ΑΚΤΙΝΟΣ. Sambucinus. Vid. *Ακτη*.

ΑΚΥΛΟΣ. Ilicis glans, ii.

ΑΛΕΑ. Calor Solis. de C. Pl. i.

ΑΛΕΕΙΝΟΣ. Calidus, foli expositus : opp. τῷ ψυχρῷ.

ΑΛΕΠΙΔΟΤΟΣ. Sine tunicis. Vid. *Λεπιδες*, vii. 4.

ΑΛΙΚΟΙ οἱ. Paludes falsæ, iv.

ΑΛΙΚΩΔΗΣ. Supr. ix. 12.

ΑΛΙΦΛΟΙΟΣ. Cortice, gustu salino ? N. B. Spec. Quercûs, ita vocatur, sed forf. error textûs pro *αλλοφλοιος*, pro cortice duplici Q. Suberis L. alii ab *άλις*.

ΑΛΚΥΩΝΙΔΕΣ οἱ. Dies Halcyonis. Vid. Myth. Antiq. ix.

ΑΛΜΑΙ αἱ. Vid. αἱ *ἐλικοι*, supr.

ΑΛΦΟΣ. Scabies ; morbus cutaneus in pecoribus, div. a *ψωρα*, ix. 12.

ΑΜΑΞΑ *μονοτροφος*, vel *μονοτροχος*. Currus rota unica ; an manibus accommodata, e. g. "a wheel-barrow?" v. 8.

ΑΜΒΛΩΣΙΣ *οφθαλμων*. Abortio gemmarum, Bot. iv.

ΑΜΒΛΩΨ. Morbus ipse, ib.

ΑΜΕΝΗΝΟΣ. Debilis, periturus ; *αμενηνα σπερματα*, iii.

ΑΜΕΡΤΩ. Succo privo ; *ὅταν αμερσωσι τον καρπον*, ix. 8.

ΑΜΟΡΓΑ. Amurca : Olei expressi recrementum. de C. Pl. vi.

ΑΜΗΣ. Placenti genus. de C. Pl. vi.

ΑΜΙΣΧΟΣ. Vid. *Μισχος*.

ΑΜΦΑΥΞΙΣ. } Intumescencia
ΑΜΦΙΦΥΑ. } in trunco Abietis post decacuminationem. Vid. desc. accuratam, iii. 8.

ΑΜΦΙΕΡΓΟΣ. Inutilis ; de solo sationi inepto præ humore. de C. Pl. iii.

ΑΝΑΔΕΙΞΕΙΣ ῥιζων. Hort. "the uncovering the roots." de C. Pl. iii.

ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΙΣ. Exhalatio.

ΑΝΑΛΟΓΟΝ. adv. Pari ratione, viii. 5.

ΑΝΑΚΛΑΣΙΣ. Actio circumvertendi, ανακλασις προς τον ἥλιον, i. 16.

ΑΝΑΚΑΥΛΟΣ. Caulis secundarius; οἱ του βολβου ανακαυλοι, i. 10.

ΑΝΑΣΤΗΜΑ. Incrementum sursum, vel altitudo plantæ, ix. 10.

ΑΝΑΤΡΕΠΩ. Agric. Solum evertō: ανατρεπειν κυμαρους, "to plough in the crop," viii. 9.

ΑΝΔΗΡΟΙ οἱ τειχων. Propugnacula, "the ramparts," vii. 14.

ΑΝΕΝΕΡΓΗΣ Inefficiens, ix. 17.

ΑΝΕΠΙΔΟΤΟΣ. Sine incremento. de C. Pl. iv.

ΑΝΘΕΡΙΚΟΝ. 1. Planta. 2. Pericarpium in Liliaceis, vii. 12.

ΑΝΘΗΛΗ. Panicula Bot. de Arundine; Cypero, Papyro, &c. iv. 11, 12.

ΑΝΘΗΡΑ τα. Tempora florendi. de C. Pl. iii.

ΑΝΘΙΚΩΣ. adv. ab ανθος, viii. 9.

ΑΝΘΡΑΞ. Carbo lignarius, "charcoal." Antiqui artem carbonandi apprime callebant, v. 10.

ΑΝΘΩΔΕΣ ανθος. Flos compo-

fitus, Bot.

ΑΝΙΜΑΩ. Aquam e puteo haurio, ἱμαντι, (funē coriario,) sc. machina quadam, iv. 17.

ΑΝΙΩΔΗΣ. Gustu ingratus, vel odore. de C. Pl. vi.

ΑΝΟΖΟΣ. Vid. οζος.

ΑΝΤΙΔΙΗΡΗΜΙΝΟΣ. Separatus a se invicem. Plantæ αντιδιηρημεναι καθ' ἑκαστον (quæ sub genere communi specialiter discriminantur.)

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΩ. 1. Succedo. 2. Sustento.

ΑΝΤΙΛΗΨΙΣ. Fulcrum.

ΑΝΤΕΜΒΑΛΛΩ. Pono vice alicujus, ix. 9.

ΑΝΤΩΘΕΩ. Vi elastica repello. N. B. Opp. ενδιδοναι, recedere, v.

ΑΝΩ καθαιρειν. Vomitus excitare, ix. 10.

ΑΝΩΜΑΛΙΑΙ αι αερος. Vicissitudines aeris, iii.

ΑΞΑΡΙΚΟΙ. Granaria.

ΑΠΑΛΛΑΤΤΩ. Eneco, ix. 15.

ΑΠΑΡΑΒΛΑΣΤΟΣ. Vid. Παραβλαστος.

ΑΠΕΜΦΕΡΗΣ. Diffimilis. Vid. Εμφερης, vii. 8. p.

ΑΠΕΡΑΣΙΣ. Imperfectio. de C. Pl. i.

ΑΠΕΡΥΣΙΒΩ. Rubiginem genero. de C. Pl. v.

ΑΠΕΡΙΤΤΩΤΟΣ. Vid. Περιττωμα. de C. Pl. vi.

ΑΠΕΥΚΟΣ. Non refinofus, iii.

ΑΠΕΧΟΜΕΝΟΙ οἱ παρ Ινδοις. Brachmani, iv. 5.

ΑΠΗΡΩΤΟΣ. Non mutilatus. de ligno. de C. Pl. iii.

ἈΠΛΟΣ. Simplex. ἅπλον ανθος, an de structura monopetala, vel de flore concolore? Alibi ἅπλον τοις ειδεσι.

ΑΠΙΚΜΑΩ. Exsicco, humorem (ικμαδα) abstergo. de C. Pl. iv.

ΑΠΟΚΑΥΛΟΣ. Non regermi- nans? ut Abies, &c.

ΑΠΟΚΛΙΝΩ. Deorsum tendo, vi. 2.

ΑΠΟΚΙΤΤΟΜΑΙ. Habitum hederæ amitto: sc. respectu formæ foliorum.

ΑΠΟΚΛΥΖΩ. Aquam copiose perfundo.

ΑΠΟΛΗΨΙΣ. Absorptio. de C. Pl. ii.

ΑΠΟΛΟΧΜΟΩΜΑΙ. Fruticesco, vi. 6.

ΑΠΟΚΡΙΝΟΜΑΙ. Secernor; όταν αποκριθῇ το ὑδατωδες. de C. Pl. vi.

ΑΠΟΜΑΓΜΑΤΑ δακτυλιων, "the paring of the nails." de C. Pl. vi.

ΑΠΟΡΙΑΙ αἱ. Quæstiones sol- vendæ. "Quere's." de C. Pl. iv.

ΑΠΟΡΡΟΗ ανθων. "A blight:" item απ. βλασησεως. de C. Pl. v.

ΑΠΟΠΡΕΜΝΟΣ. Vid. Πρεμνος, ii. 7. ramus minor?

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ αἱ. Hort. Inter- valla. de C. Pl. iii.

ΑΠΟΣΤΑΦΙΔΩ. } De uvis
ΑΠΟΣΤΑΦΙΔΟΟΜΑΙ. } arefac-

tis in arbore. de C. Pl. ii. Vid. Ασαφισ.

ΑΠΟΣΤΙΦΩ. Condense. de C. Pl. ii.

ΑΠΟΤΙΚΤΩ. Demo. Fructum a- mitto. de C. Pl. v.

ΑΠΟΤΙΣ γη. Ubi aqua deficit. de C. Pl. ii.

ΑΠΟΦΥΣΙΣ. Aliquod adnatum extus. αποφυσεις καυλων in Carduis, (pedunculi foliorum decurrentes, amplexicaules Bot.) Vid. ὕποφυσεις.

ΑΠΟΧΥΣΙΣ. Effluvium, vel jac- tura succi in plantis, όταν ὁ Σκωληξ εσθιει τον καλαμον του Πυρου, εκβιαζεται την αποχυ- σιν, viii. 10.

ΑΠΟΨΙΑΩΣΕΙΣ αἱ, αμπελου. Hort. "the thinning out the branches."

ΑΠΥΡΗΝΟΣ. Vid. Πυρην.

ΑΡΑΧΝΙΟΝ. Morbus Oleæ pro- prius. N. B. Nidus forsan animalculi cujusdam tex- torii. de C. Pl. v.

ΑΡΓΙΛΟΣ. Argilla, gustu ama- ra. de C. Pl. vi.

ΑΡΓΟΣ. Crudus, ix. 4. de terra, incultus, "fallow" Angl.

ΑΡΙΘΜΟΣ. ὡς αριθμος, Prov. de magno numero, vii. 2.

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ. Arcturus. Stella primæ magn. Sideris Arc- tophylacis vel Bootis: sc. in cauda Uræ majoris. N. B. Tempora anni notantur ortu et occasu hujus stellæ, utpote

et Caniculæ et Pleiadum.

μετ' Αρκτουρον, μετα Κυνα.

Accuratiorem qui velit hujus rei notitiam, adeat Gemini Observationes Astronomicas, vel Calendarium Theophrasti Hist. Plant. accommodatum in Opere miscellaneo^a, cujus mentionem feci.

ΑΡΟΥΡΑΙΟΣ. Inter segetes crescens, fativa planta, vii. 7. et passim.

ΑΡΟΤΟΙ. Tempora feminandi. N. B. Τρεις ώραι του σπορου apud Theophrast.

1. περι Πλειαδος δυσιν, (m. Octobri.)

2. Ηρος αρχομενου, (m. Martio.)

3. Αροτος θερινος, (m. Julio,) viii. 1.

ΑΡΡΑΓΗΣ. Compactus, sine rimis vel fissuris. de ligno, v. 5.

ΑΡΡΗΝ. Mas. N. B. Plantæ a Theophrasto in αργήνας et θηλειας quandoque dividuntur; nulla differentia sexuali: v. g. Ελατη, Κρανεια. Spec. robustior, et quæ tarde fructificat, αργήν vocatur, et contra, θηλεια. Sexualis distinctio occurrit in Φοινικι, et alibi, ii. 8.

ΑΡΤΙΟΣ. de plantis adultis et perfectis.

ΑΡΧΙΝΙΟΝ? Error textûs? v.

Αραχνιον, iv.

ΑΡΧΗ. Principium vitæ, ii. 8. Hinc Bot. Corculum feminis, et plumula, viii. 1, 2. Vid. desc. germinationis feminum diverforum, viii. 1.

ΑΡΩΜΑΤΑ. Odores antiquorum. Catalogum odorum antiquitus in usu εν μυροις fisco. 1. Κασια. 2. Κινναμωμον. (Vid. Tab. Syst.) 3. Καρδαμωμον. 4. Ναρδος. 5. Ναιρον. 6. Βαλσαμον. 7. Ασπαλαθον. 8. Στυραξ. 9. Ιρις. 10. Ναρτη? 11. Καςωρ. 12. Πανακες. 13. Κροκος. 14. Σμυρνη. 15. Κυπειςρος. 16. Σχινος. 17. Καλαμος. 18. Αμαρακος. 19. Λωτος. 20. Ανησον, ix. 7.

ΑΣΠΙΣ. Clypeus, olim ex viminibus salignis; ut et ex ligno ejusdem arboris, v. 8.

ΑΣΤΑΦΙΣ. Uva passa, "a raisin." v. p. 44.

ΑΣΤΡΑΒΗΣ. Non tortuosus, ξυλον αστραβες, "strait-grained wood," iii. 10.

ΑΣΤΡΑΒΕΩ. id.

ΑΣΤΡΟΒΟΛΗΤΟΣ. } Planta-
ΑΣΤΡΟΒΟΛΗΣΙΑ. } rum in-
juria ex cœli intemperie, olim fideribus attributa. de C. Pl. v.

ΑΣΤΡΟΝ το. Sirius, Canicula: περι το αστρον, "the Dog-days," ii. 7. Plantæ dicuntur ακολουθειν τοις αστροις,

^a G. Falconer, M. D. Vid. Præf. operis.

(tempora observare in germinando,) vii. 14.
ΑΣΦΑΡΑΓΙΑ. "An asparagus bed," vi. 4.
ΑΤΕΡΑΜΝΟΣ. Vid. Τεραμνων.
ΑΥΛΟΝΙΣΚΟΣ. Dim. ab αυλων. Vallis, ix. 7.
ΑΥΣΤΗΡΟΣ. Astringens : succi plantarum denominantur αυστηροι, γλυκεις, οξεις, respectu gustûs. Ang. "rough."
ΑΥΧΜΑΙ αι. "The Droughts."
ΑΥΧΜΑΙΟΣ. Æstivus; εργα αυχμαια. de C. Pl. iii.
ΑΥΧΜΗΡΟΣ. De odore; folia Salviæ ήττον αυχμηρα. V. Βαρυς.
ΑΦΑΝΕΣ. adv. Occulto, ix. 12.
ΑΦΑΝΕΣ το. Vapor, gas, ib.
ΑΦΕΛΚΟΩ. } Penetro, per-
ΑΦΕΛΚΟΟΜΑΙ. } foro? ix. 12.
 fanor. de C. Pl. v.
ΑΦΟΡΟΣ. Sterilis. de C. Pl. iii.
ΑΦΥΛΛΟΣ. De flore monope-
 talo usurpatur.
ΑΧΡΟΥΣΤΕΡΟΣ. Minus coloratus. Vid. χροομαι, κεχρωσμενος.
ΑΧΥΡΟΝ. 1. Palea, gluma, Bot. αχυρον πυρινον. α κριθινον, viii. 1.
 2. Siliqua Fabæ. de C. Pl. iv.
ΑΩΡΕΙΑΙ. Tempora minus propitia, "bad seasons." de C. Pl. v.
 B.
ΒΑΛΑΝΟΣ ή. Nux arboris βαλανου. Vid. Tab. Syft. p. 11.

et Μυροβαλανον.
ΒΑΛΑΝΗΡΟΣ. Glandifer.
ΒΑΛΛΩ. Germino, ix. 22.
ΒΑΣΙΛΙΚΑ τα. Nuces Juglandis.
ΒΑΛΣΑΜΟΝ το. "Balsam of Mecca or Tolu," (vid. p. 25.) ix. 7.
ΒΑΦΗ χαλυβος. Acies ferri, cujus manipulatio antiquis haud ignota, v. 4.
ΒΕΧΟΣ. Instrumentum rusticum. de C. Pl. iv.
ΒΗΜΑ. Mensura, Passus, "a pace."
ΒΙΟΙ φυτων. 1. stationes, L. i. 7, 23. 2. effectus foli, aëris, &c. respectu fanitatis et durationis vitæ in arboribus, iv. 1, 13, 14.
ΒΛΑΣΤΟΣ. Surculus primus ex radice, i. 5. παραβλασος, surculus secundarius ex ramis.
ΒΛΑΣΤΗΣΙΣ. Prima germinatio. Vid. Calendarium Βλασησιων, iii.
ΒΛΑΣΤΟΛΟΓΙΑ. Pampinatio in vite. N. B. Tres αμπελουργιαι. 1. τομη. 2. διακαθαρσις. 3. βλαστολογια. 1. amputatio generalis hyeme. 2. amputatio furculi teneri. 3. avulsio gemmarum ope manuum, &c.
ΒΛΟΣΥΡΟΣ. 1. Fæculentus. πιττα βλοσυροτερα. 2. de furculis; turgidus, όσαι λιμναιαι, βλοσυροτεραι. de C. Pl. v.
ΒΟΛΒΙΤΟΣ. Fimus bubulus, v. 7.

ΒΟΛΒΟΣ. Bulbus plantæ.

ΒΟΛΗ. Lapsus uvarum imma-
turus. de C. Pl. i.

ΒΟΡΒΟΡΩΔΗΣ. Fæce vel ter-
ra mixtus.

ΒΟΤΑΝΙΖΩ. Herbas noxias e-
vello, "to weed." de C. Pl.
iii.

ΒΟΤΡΥΣ. Racemus uvarum,
item racemus quivis, vel col-
lectio baccarum vel florum.

Βοτρὺς Πτελεας, fructif. iii. 6.

Generatur βοτρὺς ἐν ἀμπέ-
λοις ἐκ μητρᾶς κληματα ἐκ
τοῦ περιέχοντος. de C. Pl.
iii.

ΒΟΤΡΥΟΝ. id. Βοτρυον της Δαφ-
νης, iii.

ΒΟΤΡΥΧΙΟΝ. dim. de C. Pl.
iii.

ΒΟΤΡΥΟΕΙΔΗΣ. ἀπὸ μίας κορυ-
νης, καὶ πολλῶν μισχῶν. de
umbella floris. Bot. iii. 12.

ΒΡΑΓΧΙΟΣ. Branchiæ, "the
gills of fishes," iii. 9.

ΒΡΑΔΥΣ εἰς τροφήν. Concoctu
difficilis. opp. ἐγγυτέρῳ της
τροφῆς. de C. Pl. iv.

ΒΡΑΧΕΙΣ. Madefactus, a βρέχω,
"steeped in water," v.

ΒΡΥΟΝ. 1. Amentum Quer-
cūs, &c. a βρυω, abundo, iii.

6. 2. Thyrsus florum, ut
Thymi Diosc.

ΒΡΥΘΟΔΕΨΙΚΗ. per transp.
pro βυρσοδεψικῇ, Ars coria-
ria.

ΒΡΥΤΟΝ. Cerevisiæ sp. βρυτ.
ἀπὸ Κριθῶν, "Ale." N. B.

Ἄν ζῆθος spec. divers. vel
statu effervescenti? Vid.

Γ.

ΓΑΛΒΑΝΟΝ. Gummi Bubonis,
Galbani L.

ΓΑΛΕΑΤΡΑ. Tendicula captan-
dis feris. ex ligno duro Πτε-
λεας, &c. "a hutch trap." v.
8.

ΓΑΝΩΔΗΣ. Fertilis: γῆ γανωδῆς,
vi.

ΓΕΛΓΙΣ. Divisio capituli Allii;
"a clove of garlick."

ΓΕΛΓΙΟΜΑΙ. id.

ΓΕΝΕΣΙΣ. Propagatio planta-
rum, i. 4.

ΓΕΝΕΣΕΙΣ αἱ. Proventus arbo-
rum. de C. Pl. iv.

ΓΕΝΝΩΜΕΝΑ μέρη τὰ. In arbo-
ribus partes fructiferæ. Mold.
i. 4.

ΓΕΝΟΣ, apud Theophr. spe-
ciem vel varietatem indicat,
pass.

ΓΕΡΑΝΔΡΥΑ τὰ. Annosæ arbo-
res. Quercus nodosæ ætate,
iii. 12.

ΓΕΥΟΜΑΙ. Gustu experimen-
tum facere, ix. 2.

ΓΕΥΣΙΣ. id. item morbus simi-
lis αφῆς.

ΓΙΓΑΡΤΟΝ. Acinus uvæ: ἐξαι-
ρουμένης της μητρᾶς ἀγιγαρτοί.
de C. Pl. v.

ΓΛΙΣΧΡΟΣ. Tenax. de ligno,
ὅσα γλισχρὰ εὐκαμπῆ, v. 6.

de C. Pl. iv. de fructu, τα γλισχρα πλειονος πεψεως δει-
ται. de C. Pl. iv. differentia
inter γλισχρος et λιπαρος,
prior ex humido, posteriore
ex oleoso? lign. Platani ex-
emplum γλισχροτητος pecu-
liare, v. 4.

ΓΛΙΣΧΡΟΤΗΣ των καρπων. id.
de C. Pl. iv.

ΓΛΟΙΟΣ. Debilis, cariosus :
opp. τω ισχυρω. de lignis, v. 5.

ΓΛΥΚΥΣΤΡΥΦΝΟΣ. Afstringens
cum dulcedine. Vid. Στρυφ-
νος, ix. 22.

ΓΛΩΤΤΑ. Lingula in fistulis,
"the tongue-piece," iv. 12.

ΓΟΓΓΡΟΣ. Morbus in truncis et
ramis majoribus : forsan can-
cri spec. Radix videtur ig-
nota, i. 12.

ΓΟΝΥ. Nodus in caulibus gra-
mineis, &c. item flexura.

ΓΟΝΑΤΩΔΗΣ. id. i. 6.

ΓΡΑΜΜΩΔΗΣ. Linearis, Bot.
γραμμωδεις μισχοι (tenues)
σπερματα γραμμωδη, iv. 13.

ΓΥΜΝΟΣΠΕΡΜΟΣ. Nudo fe-
mine, de seminibus umbelli-
ferarum ; minime Gymnos-
pus Linn.

ΓΥΡΟΙ. Foveæ circulares arbo-
ribus plantandis destinatae.
de C. Pl. iii.

ΓΥΡΩΜΑΤΑ. Venarum cir-
cumvolutiones, vel gyri in
ligno ; præcipue ad nodos,
v. 6.

ΓΩΝΙΑ. 1. Eminentia acuta, "a

ridge," folium κυπείρου (vid.)
desc. ὡς γωνιοφυλλος' εκ δυοιν
συνθετον, και το μεσον οιον τρο-
πης, (carina,) i. 16. 2. an-
gulus : sic de folio Hederæ,
γωνιοφυλλος' ουδεν σχημα περι-
καρπιου γωνιας εχει? i. 18.

ΓΩΝΙΟΕΙΔΗΣ. id.

Δ.

ΔΑΔΟΟΜΑΙ. de pice extra-
henda. de C. Pl. v. Vid. δαϊς,
δας, tæda.

ΔΑΔΟΦΟΡΕΩ. Picem genero,
ix. 2.

ΔΑΔΩΔΗΣ et ενδαδος. de ligno
et radicibus, Gen. Pinus L.
resinosum, ib.

ΔΑΙΣ, δας. Lignum fissile Pinus ;
εξαιρουμενης της δαδος, και καιο-
μενης, η της πιττας εκροη, ix.
2. Vid. manipulationem ibi
exacte descriptam.

ΔΑΚΡΥΑ τα. Refina in globu-
los concreta, ii. 16. vi. gum-
mi etiam sponte fluens.

ΔΑΚΕΤΑ τα. Morfûs veneno-
fi Viperæ &c. ix. 21.

ΔΑΦΝΙΣ. Lauri bacca ; drupa,
Bot.

ΔΑΦΝΩΔΗΣ. Sature viridis.
N. B. Tres occurrunt colo-
ris viridis varietates ; Angl.
"shades of green." 1. δαφνω-
δης. 2. πρασωδης. 3. χλοερος.
Vid. ix. 11.

ΔΕΙΝΟΣ. Efficax, "strong," οί

χυλοι των ριζων δεινότεροι του
των φυτων, i. 11.

ΔΕΝΔΡΑ τα. Vegetabilium
divisio quadruplex. 1. Δενδρα.
2. Φρυγανικα. 3. Θαμνοι. 4.
Πωδεις. N. B. Distinctio in-
ter 2dam et 3tiam haud fa-
tis constat: an θαμνοι idem
quod επετειοι, perennes? Ali-
bi λοχυμωδης occurrit, de cala-
mo, &c. Frutex paludofus?
(vid.)

ΔΕΝΔΡΑΔΗΣ. syn. δενδρωδης. de
C. Pl. iii.

ΔΕΝΔΡΥΦΙΟΝ. Arbusculum.
Dim. Corallinis applicatur,
iv. 8.

ΔΕΧΟΜΕΝΟΣ. Proxime succe-
dens; εν τω δεχομενω ετει, και
τω τριτω, vii. 1.

ΔΗΚΤΙΚΟΣ. Pungens: de fuc-
co, vi.

ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ. Cerealis. δημη-
τρειος καρπος. de C. Pl. iii.

ΔΙΑΔΥΝΑΜΑΙ. Valde efficio,
iii.

ΔΙΑΚΑΘΑΡΣΙΣ. Operatio, hor-
ticulturæ. Vid. Βλαστολο-
για.

ΔΙΑΚΟΡΗΣ. Satureus valde, i.

ΔΙΑΚΤΟΡΙΑ. Cantus vehemen-
tior, vel acutior. Hinc Mer-
curius apud Homerum δια-
κτορος Αργειφοντης. Tibiæ γλωτ-
τα συμμενει τω χρονω, (per æ-
tatem contrahitur,) et inde
χρησιμος προς την διακτοριαν.
N. B. Forf. η διακτορια in
scena antiqua cantus prælu-

dens, Angl. "overture," iv.
12.

ΔΙΑΠΑΤΤΟΜΕΝΟΣ. Conculca-
tus, viii. 11.

ΔΙΑΠΑΛΗΣ. Saturè plenus. de
C. Pl. ii.

ΔΙΑΠΙΑΙΝΟΜΑΙ. Saturor ex
omni parte. de C. Pl. vi.

ΔΙΑΠΝΟΗ. Evaporatio. Vid.
Διατμιζω. de C. Pl. vi.

ΔΙΑΠΤΥΣΣΩ. Expando. κοπτον-
τες εν τω ὀλμω, και διαπτυ-
σαντες λεπτα, και επιπαττον-
τες εφ' ὕδωρ. Methodus præ-
parandi Cicutam, ix. 17.

ΔΙΑΠΥΡΟΣ. Fervidè candens,
"red hot," iv. 8.

ΔΙΑΡΡΕΩ. Late evagor. de Ni-
lo. de C. Pl. vi.

ΔΙΑΣΤΟΛΗ. Intervallum, *hort.*
de C. Pl. iii.

ΔΙΑΤΜΙΖΩ. Evaporare facio.
τα μεν χυλων εκκρινει, η δια-
τμιζει τα δε παχυνει και συν-
ισησι. de C. Pl. vi.

ΔΙΑΦΕΡΟΝ το. Excellens quod-
dam, ix. 14.

ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΣ. Eximie.

ΔΙΑΦΟΡΗ. Excellentia, iv. 4.

ΔΙΑΦΟΡΟΝ. id. si non error
textus.

ΔΙΑΦΥΣΕΙΣ αι. Internodia cau-
lina, *Bot.* iv. 10.

ΔΙΑΦΥΩ. *act.* Penetro. de C.
Pl. v.

ΔΙΑΦΥΩ. *pass.* Minus apte, vel
loco alieno nascor. de C. Pl.
iii.

ΔΙΑΦΩΝΕΩ. Discrepo, iii. 10.

ΔΙΑΧΕΩ. de diffusionem per
coctionem, ix. 15. opp. τῷ
συναγεῖν, "to coagulate."

ΔΙΑΧΥΣΙΣ. Diffusio æqualis : de
coctione fabarum et pisorum,
"when they are reduced to
a smooth paste."

ΔΙΕΝΝΑΘΗΡΙΣ. Novennium,
iv. 12.

ΔΙΕΝΝΑΕΤΗΡΗΣ. Novennis.

ΔΙΕΤΡΥΝΟ. Dilato. de C. Pl. v.

ΔΙΗΘΗΣΙΣ. Percolatio, ib.

ΔΙΗΚΩΝ. Quod transversim
pervadit? ἐν τῷ διηκοντι τῆς
γελγίδος. Vid. de C. Pl. vi.

ΔΙΗΡΘΡΩΜΕΝΟΣ. Nodos trans-
iens, permeans.

ΔΙΘΥΡΟΙ. Januæ bivalves, viii.
2.

ΔΙΚΑΡΠΙΟΣ. Fructus duorum
annorum simul gerens. de
arb. quibusdam, iii. 6.

ΔΙΚΕΛΛΑ. Instrumentum rus-
ticum : ligo biceps. Angl.
"a double hoe." de C. Pl.
iii.

ΔΙΚΡΑΝΗΣ. Biceps, cacumine
fisso, ix. 12.

ΔΙΜΕΡΗΣ. Bi-partitus, viii. 2.

ΔΙΞΟΟΣ. Duplici venarum
cursu. Vid. μονοξοος et κτη-
δων, v. 2.

ΔΙΠΑΛΑΙΣΤΗΣ. Duas palmas
altus, iv. 12.

ΔΙΦΟΡΟΣ. Vid. δικαρπος.

ΔΙΩΚΩ. simpl. (pro διωκω βιον)
Vivo. πρὸς ἑτέρῳ διωκει, de pl.
scandente, Bot. de C. Pl. ii.

ΔΟΡΑ. Cortex arboris, ix. 2.

ΔΟΧΟΣ. Facile suscipiens : δα-
χος οὐσα ὑγρὸν ἰ δερμου. de
C. Pl. ii.

ΔΡΙΜΥΣ. Acris, pungens. de
odore, vi. 7.

ΔΡΟΣΟΒΟΛΟΣ. Roridus : ubi
rores abundant. δροσοβολαί
χωραι. de C. Pl. vi.

ΔΡΥΠΕΤΗΣ. Vid. δρυπιψ. de C.
Pl. ii.

ΔΡΥΠΕΨ. 1. Fructus maturus
et deciduus, *pass.* N. B. Δρυς
pro quavis arbore. 2. Bacca
Oleæ, iv. 17.

ΔΡΥΠΙΣ. Fructus quidam. (Hinc
forſan Drupa Linn.) ακανος,
δρυπις.

ΔΡΥΦΡΑΚΤΟΝ. Ager ſepibus
cinctus? iv. 5.

ΔΥΝΑΜΕΙΣ αἱ. Vires planta-
rum.

ΔΥΣΜΟΙ οἱ. Occidens, ἀνεμος
ἀπο δυσμῶν, κλαυθμος dict.
(forſ. καυθμος,) "the Siroc-
co." de C. Pl. v.

ΔΥΣΡΙΓΟΣ. Frigoris impatiens,
vi. 7.

ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ. Aliquod ingratum
reſpectu ſaporis. de C. Pl.
vi.

E.

ΕΓΓΕΙΟΣ. de terra; opp. τῇ
ἐνυδρῳ, iv. 7.

ΕΓΓΥΣ πρὸς. Proxime accedens
ad : κατ' εὐωδιαν οὐκ ἐγγυς
πρὸς ἐκεῖνον, "not near ſo
fragrant as," de C. Pl. vi.

ΕΓΚΕΝΤΡΙΖΩ. Perforo: dicitur de actione succum vel refinam extrahendi e truncis arborum, ii. 3.
 ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΟΜΑΙ. Ramis luxurio. de C. Pl. iii.
 ΕΓΧΥΛΟΣ. Succulentus; opp. τῷ δυσχυλῷ. de C. Pl. vi.
 ΕΔΑΦΗ τὰ. Varietates foli; Agricult. de C. Pl. ii.
 ΕΔΑΦΙΕΩ. Solum complano, ix. 4.
 ΕΔΡΑ. Εκπιπτειν την ἐδραν. de prolapsu ani, ix. 9.
 ΕΙΛΗΘΥΙΑ. Σφαιριῶδες τι, vel forsan pistilliforme in trunco Abietis: in magicis usitatur. de C. Pl. v.
 ΕΚΑΤΕΡΟΙ. Utrique; (dicitur de duobus paribus.)
 ΕΚΑΤΕΡΩΤΗΣ? Qualitas; forsan error. de C. Pl. vi. vid. supr.
 ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΙΣ. Secunda germinatio; "Michaelmas shoot." iii. 7.
 ΕΚΒΛΟΣΥΡΟΣ. Vid. βλοσυρος.
 ΕΚΘΑΜΝΕΟΜΑΙ. Fruticesco.
 ΕΚΙΔΟΝ. Oblique, iii. 13.
 ΕΚΚΟΛΑΠΤΩ. Tundendo evacuο, ὡν εκκεκολαμμενον, iii. 16.
 ΕΚΚΡΙΝΩ. Secerno.
 ΕΚΚΡΙΝΟΜΑΙ. Secernor.
 ΕΚΚΡΙΤΙΚΟΝ το. id. }
 de C. Pl. v. vi.
 ΕΚΛΥΤΟΣ. Languidus: succo privatus. de C. Pl. iv.
 ΕΚΜΑΣΣΟΜΑΙ. Abstergor, aridus fio. de C. Pl. v.

ΕΚΠΑΠΠΟΟΜΑΙ. In pappum abeo. Bot. iii. 18.
 ΕΚΠΛΗΞΙΣ. De arboribus; Sideratio. Vid. ασροβολησις, ib.
 ΕΚΠΝΕΥΣΙΣ φλεγμονων. Exhalationes ulcerum, i. e. ad virus extrahendum, ix. 10.
 ΕΚΣΤΑΣΙΣ. Degeneratio, ab εξισημι, infr.
 ΕΚΤΗΚΩ. Emacero, ix. 3.
 ΕΚΤΟΠΟΣ. Climati proprius: χειμων εκτοπος εν Θρακη. de C. Pl. vi. N. B. Forf. legendum εντοπος.
 ΕΚΦΥΣΑΩ. Tumescō. de C. Pl. iii.
 ΕΚΦΥΣΗ ἡ. Tumor. de C. Pl. iii.
 ΕΚΦΥΣΙΣ. Degeneratio plantæ. de C. Pl.
 ΕΚΧΥΛΟΣ. Subtilis, tenuis: de succo. de C. Pl. vi.
 ΕΛΑΙΟΝ. N. B. Usus Olei occurrit in maturandis Ficubus. de C. Pl. ii. item ad enecandas radices arborum, ib.
 ΕΛΙΞ. Cirrus; Bot. i. 3.
 ΕΛΚΗΘΡΟΝ. Buris aratri, vi.
 ΕΛΚΟΜΑΙ. Distorqueor, "to be warped." de ligno, v. 7.
 ΕΛΚΟΟΜΑΙ. Perforor. N. B. ἑλκος foramen in trunco Abietis, per quod refina fluit, iv. 19.
 ΕΛΛΟΒΟΣ. Siliquosus, viii. 1.
 ΕΛΜΙΣ πλατεια. Tænia lata: Angl. "tape-worm," ix.
 ΕΜΒΙΩΣΑΣ. Vitam pertrahens, vi. 7.
 ΕΜΒΟΘΡΟΝ. adv. plane? in

- puteo. ουκ εμβοδρον (τιθεασι) αλλα τας σχιζας "the billets," ορθας προς αλληλας, (sursum inclinantes,) ix. 3. sed forsan textus corruptus.
- ΕΜΒΟΛΗΤΟΣ. Gleba involutus. de C. Pl. v.
- ΕΜΒΟΛΟΣ. Navis rostrum æratum, vi. 8. ab εμβάλλω, ex modo pugnae navalis.
- ΕΜΒΡΥΟΝ, in plantis το μελλον βλασσειν. N. B. Vox βρυον (amentum Bot.) de racemo flosculorum fugacium. de C. Pl. i.
- ΕΜΜΗΤΡΟΣ. Medullam habens, i. 9.
- ΕΜΦΥΤΕΙΑ. Infusio, horticult. "grafting." de C. Pl. i. vid. ενοφθαλμισμος.
- ΕΜΦΥΤΕΥΩ. ii. 1.
- ΕΝΑΕΝΑ τα. Annua: διενα, biennia.
- ΕΝΔΑΔΟΣ. Pice abundans, ix. 4.
- ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ. imperf. ουκ ενδεχεται λαβειν, non admittit convenienter, iv.
- ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΝ το, quod convenit, ii. ib.
- ΕΝΔΙΔΩΜΙ. Cedo: κλιναρια ενδιδοντα, an lectuli elastici?
- ΕΝΕΙΛΕΩ. Obvolvo? ενειλαντες εν γλυκει, ix. 9.
- ΕΝΙΑΥΤΟΦΟΡΟΣ. De arbore cujus fructus annum durat in arbore; aliter δικαρπος.
- ΕΝΟΦΘΑΛΜΙΣΜΟΣ. Infusio gemmæ (οφθαλμου) in arboribus; Ang. "budding?" Vid. εμφυτεια. de C. Pl. i. N. B. Ex descr. apud Theophr. l. c. εμφυτεια videtur infusio per incisionem, και ξυλου σχισιν, "cleft-grafting;" ενοφθαλμισμος infusio, per relaxationem corticis, "rind-grafting."
- ΕΝΤΑΥΘΑ. Hac de causa, pass.
- ΕΝΤΕΡΙΩΝΗ. Pars interior, five medulla ligni, iii. 8.
- ΕΝΤΟΜΑ τα. Insecta: hinc εντομολογια. de C. Pl. vi.
- ΕΝΤΟΜΗ. Folii incisura, vel divisio in lobos, i. 16.
- ΕΝΥΜΕΝΟΣΠΕΡΜΑ. Hymenosperma L. semine membrana incluso, vel pericarpio laxo, viii. 7.
- ΕΞΑΔΥΝΑΤΕΩ. Elanguesco, iv.
- ΕΞΑΙΤΕΙΡΟΜΑΙ. De Populo, (Αιγειρω) habitum mutare. de C. Pl. ii.
- ΕΞΑΜΒΛΩΣΙΣ. Abortio, ix. 9.
- ΕΞΑΝΘΗΣΙΣ. Deflorescentia.
- ΕΞΕΛΑΙΟΟΜΑΙ. Super saturatus sum Oleo: unde effluviū fit; de C. Pl. vi.
- ΕΞΕΠΙΤΗΔΕΣ. Consulto. de C. Pl. v.
- ΕΞΕΣΜΕΝΟΣ. Rafus, a ξεω, ib. iii.
- ΕΞΙΚΜΑΩ. Humorem perdo, vii. 5.
- ΕΞΙΝΩΩ? Evacuo.
- ΕΞΙΣΤΗΜΙ. Degenero. de C. Pl. v.
- ΕΞΥΒΡΙΖΩ. Luxurio. de arb. ii.

- ΕΠΑΚΑΝΘΙΖΩ. Leviter spinosus sum, ix. 4.
- ΕΠΑΛΛΟΚΑΥΛΟΣ. Caule scandenti, *Bot.* iii. 8.
- ΕΠΑΜΑΟΜΑΙ. Accumulo, iv. 15.
- ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ. Recupero. de C. Pl. iii.
- ΕΠΑΦΗΣ. Tactu sensibilis.
- ΕΠΕΣΘΙΩ. Edo post aliquod, insuper edo.
- ΕΠΕΤΕΙΟΚΑΥΛΟΣ. Planta caule caduco, radice perenni, Angl. "a perennial plant," vii. 7.
- ΕΠΕΤΕΙΟΚΑΥΛΕΩ. id.
- ΕΠΕΧΩ. Duro, continuo. de C. Pl. iii.
- ΕΠΙΒΑΛΛΩ. Attribuo. καὶ ὅσον ἐπιβάλλειν τοῖς γενεαῖς, viii. 5.
- ΕΠΙΒΛΑΣΤΑΝΕΙ. De germinatione Autumnali, vii. 2.
- ΕΠΙΒΡΟΧΟΣ. Madidus. γῆ ἐπιβροχος, viii. 6.
- ΕΠΙΓΕΙΟΚΑΥΛΟΣ. Caule prostrato. *Bot.*
- ΕΠΙΓΕΙΟΦΥΛΛΟΣ. Foliis radicalibus, *Bot.* vii.
- ΕΠΙΔΟΞΑΖΟΜΕΝΟΣ. Suspictus; per conjecturam. de C. Pl. i.
- ΕΠΙΔΟΣΙΣ. Incrementum, proventus, i. 5. de C. Pl. iii.
- ΕΠΙΘΕΤΑ τα. Commentitia. τα ἐπιθετα, καὶ πορῶθεν, "far fetched, and with additions," ix. 9.
- ΕΠΙΚΑΥΛΟΦΥΛΛΟΣ. Folioso caule, vii.
- ΕΠΙΚΑΩ. Inuro. N. B. Vox καίω usitatur de effectu frigoris, utpote et caloris; item de morfu venenoso pecorum. de C. Pl. v.
- ΕΠΙΚΗΡΟΣ. Morbo obnoxius. Angl. "tender," vi. 7.
- ΕΠΙΚΝΙΖΩ. Unguibus vello, "to nip off." de C. Pl. iii.
- ΕΠΙΚΟΠΗ. Succisio, decacuminationio. de C. Pl. v.
- ΕΠΙΚΥΤΙΣΚΟΜΑΙ. Actus superfœtationis; utpote in leporibus. de C. Pl. i.
- ΕΠΙΚΥΠΤΩ. Declinare facio, "to weigh down." de C. Pl. iii.
- ΕΠΙΝΕΩ. Supernato, ut lignum. in aqua, vi. 3.
- ΕΠΙΞΥΝΔΕΩ. Strictius alligo. de C. Pl. ii.
- ΕΠΙΠΑΤΤΩ ἐφ' ὕδαρ. Sensim in aqua tractando, manibus miscere, ix. 17.
- ΕΠΙΠΟΛΑΖΩ. In superficie fluito.
- ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΣ, ab ἐπιπολής, superficialis; de radicibus opp. βαθεῖ.
- ΕΠΙΡΡΥΤΟΣ. Inundatus: γῆ ἐπιρῥυτος, *Agric.* "flooded ground."
- ΕΠΙΣΙΝΗΣ. Noxius.
- ΕΠΙΣΠΑΣΙΣ. Attractio. de C. Pl. v.
- ΕΠΙΣΠΟΡΑ. Secunda satio. ἐπισπορα τα de plantis quæ sæpius in anno feruntur, vii. 1.

ΕΠΙΣΤΑΣΙΣ. Continuatio habitus: opp. *εκστασει*. de C. Pl. v.
 ΕΠΙΣΥΝΑΓΚΑΙ. Valles quædam Afæ. de C. Pl. v.
 ΕΠΙΣΧΙΖΩΝ. Ab imo divisus. de C. Pl. v. N. B. *Δενδρα επισχιζοντα* opp. *μονοφελεσσι*.
 ΕΠΙΤΑΣΙΣ. Impulsus. de C. Pl. ii.
 ΕΠΙΦΑΝΗΣ. Violens. *αηρ θολερος και επιφανης*. de C. Pl. v. sic *χειμων επιφανεστατος*. Polyb.
 ΕΠΙΦΟΡΑ. Proventus secundus. de C. Pl. v.
 ΕΠΙΧΡΟΙΣΙΣ. Levis coloratio, "a light staining." de C. Pl. ii.
 ΕΠΟΥΛΟΣ. Vid. *ουλος*, iii. 10.
 ΕΠΩΤΙΔΕΣ. Prominentiæ laterales utrinque ex puppi, ubi navis nomen inscribebatur. *Poll.* v. 7.
 ΕΡΓΑΣΙΑ. Manipilatio. *ε. της πιττης*, ix. 2.
 ΕΡΕΨΙΜΟΣ. Ad tecta facienda. *ξύλον ερεψιμον*, "roof timber," v. 4.
 ΕΡΙΝΟΝ το. Fructus Ficûs, *sylvestris*.
 ΕΡΙΟΛΑΜΒΑΝΩ. Percolare ope lanæ; "to strain through wool," ix. 8.
 ΕΡΥΣΙΒΗ. Robigo; morb. Forf. Uredo, Persoonii. Fungi species. de C. Pl. iii.
 ΕΣΧΑΡΑ. Pars plana Πυρείας, (vid.) fovea circularis, ubi circumagitur το τερετριον ad

accendendum ignem, v. 10.
 ΕΣΧΑΤΕΥΟΝΤΑ τα. Apices ramorum, &c. de C. Pl. v.
 ΕΤΟΣ φερεi ουκ αρουρα. Adagium vetus: plus cælo quam terræ tribuendum, viii. 8.
 ΕΥΑΤΜΩΤΟΣ. Volatilis. de C. Pl. ii.
 ΕΥΑΥΡΟΣ. Bene fitus, bene ventilatus, viii. 11.
 ΕΥΑΦΗΣ. Tractabilis. *γη ευαφης*. de C. Pl. ii.
 ΕΥΔΙΑΙΝΟΣ. τοπος κοιλος και ευδαινος, "a well sheltered mild situation," iii. 4.
 ΕΥΕΜΕΩ. Vomitus ciere sine dolore, ix. 11.
 ΕΥΕΤΗΡΙΑ. Anni prosperitas, viii. 8.
 ΕΥΗΚΩΣ. Facilis, pronus; ab *ακουω*. *ευηκοτα προς μεταβολην*. de C. Pl. ii.
 ΕΥΘΥΠΟΡΕΩ. De arboribus, "to grow straight."
 ΕΥΚΤΗΔΩΝ. Vid. *κτηδων*.
 ΕΥΟΓΚΟΣ. Levis, portatu facilis, ix. 17.
 ΕΥΟΔΕΩ. Luxurio, i. 9.
 ΕΥΣΤΟΜΟΣ. Gratus palato, "relishing."
 ΕΥΤΟΝΟΣ *προς*. Aptus ad. de C. Pl. v.
 ΕΥΧΥΛΟΣ. Succulentus, viii. 10.
 ΕΥΩΔΙΑ. Gratus odor. N. B. *Γυπες averfantur odores; apibus etiam nocivi sunt; nec datur animal, homine excepto, εωδια gaudens αυτης χαριν*. de C. Pl. vi.

ΕΦΑΛΜΑ το. Morbus arb. ex nimio sale? de C. Pl. v.

ΕΦΗΛΙΔΕΣ. Solis maculæ, "freckles," ix. 22.

ΕΦΗΜΕΡΟΝ φαρμακον. Venum quod cito enecat (eodem die,) ix. 6.

ΕΧΙΝΟΣ. 1. Placentæ genus ex farina cruda. 2. morbus ex ejus usu. de C. Pl. iv.

ΕΧΟΜΕΝΑ τα. Quæ succedunt, i. 1.

ΕΩΜΕΝΟΣ. "Left to itself," vi. 6.

Z.

ΖΗΘΟΣ. Cerevisia (a ζεω ferveo, "to mantle." Αρχαιοιου φυσικως ζηθου εκ τεχνης. de C. Pl. vi. N. B. An differentia inter ζηθον et βρυτον? Vid.

ΖΥΓΙΝΟΣ. Carpineus, v. 6.

H.

ΗΘΙΚΟΣ. Percolatus. οινοι ηθικοι. de C. Pl. vi.

ΗΛΟΣ. 1. Clavus; 2. Innatum quoddam in trunco Oleæ coni instar acuti? An Schlerotium, vel Hypoxylon? Bot. N. B. Semel vidi specimen ex Portugallia, iv. 16.

ΗΛΙΟΣ εκνεφελος. (sine nubibus) Obstat aliquando arboribus,

(viii. 10.)

ΗΜΕΡΟΥΝΤΕΣ οι. Qui terras incultas subigunt. de C. Pl. v.

ΗΜΕΡΩΜΑΤΑ τα. Animalia mansuefacta, pecora, ib.

ΗΜΙΒΡΑΧΗΣ. Sub-madidus. de C. Pl. iii.

ΗΜΙΗΛΟΣ. Sub-solanus, ib.

ΗΡΙΝΟΣ. id. q. ιρινος, ab ιρις, Iris, viii. 7.

Θ.

ΘΑΛΑΜΩΔΗΣ. Foraminosus. N. B. Vox θαλαμος, apertura narium; λιθοι θαλαμωδεις (porosi.) de C. Pl. vi.

ΘΑΛΕΙΑ. } 1. Ramulus tener
ΘΑΛΛΙΑ. } herbaceus. de C. Pl. v. 2. Frondescentia, vel frondosus rami vestitus.

ΘΑΜΝΟΙ. Plantarum divisio. Vid. δενδρον.

ΘΕΡΜΟΣ συμφυτος. Calor innatus; vitalis Mold. i. 3. ξυλα δερμα. Vid. ξυλον, πυρεια.

ΘΗΛΥΣ. Vid. αρσην supr. N. B. Non semper de sexu in Dialectis pl. N. B. Hinc Ελατης spec. θηλεια vocatur, i. e. minus robusta. Alibi vox ut distinctio sexualis occurrit.

ΘΗΡΙΔΙΑ. Animalcula.

ΘΟΛΕΡΟΣ. Turbidus. H. de differentia inter animalia et plantas dicitur ὅσω θολερωτε-

ρα και ψυχροτερα, (τα φυτα,) τοσντον απεχειν του ζωα ειναι : forsan minus cocti.

ΘΟΛΟΕΙΔΗΣ. Cancellatus, clathratus. (Vid. Præfat. operis.) iii. 10.

ΘΟΡΟΣ. Piscis masculi lac feminine ; "the milt." 'Ο αρ-
ρην ιχθυς επιρραινει τοις ωοις
αποτικτομενοις του θορον. de C.
Pl. ii.

ΘΡΑΥΟΜΑΙ. Lacero : de ef-
fectu salis in enecandis plan-
tis. de C. Pl. vi.

ΘΡΙΟΝ. Folium ficulneum. de
C. Pl. v.

ΘΥΣΑΝΟΙ. fimbriæ ; filamen-
torum fasciculi, "a fringed
edge," "tassels."

ΘΥΣΑΝΩΔΗΣ. Fimbriatus.

I.

ΙΔΙΟΣ. Peculiaris, extraordina-
rius, *pass.*

ΙΔΙΟΤΗΣ. *supr.*

ΙΘΜΟΣ. forf. diversus ab ιθμα-
τι ? διεισιν ως ιθμος, (transit
per aquam ut atomus ?) ουκ
εχον ω στεγει, (non inveniens
unde suspendatur.) de C. Pl.
vi.

ΙΚΜΑΣ. Succus feminalis, vel
simpliciter humor, vi. 4.

ΙΚΡΙΑ τα. Opera sculptilia in
navibus ; ornamenta lignea
domuum. Συκαμινου ξυλον εις
τα ικρια, και τας στεφανας, και
ολως προς τον κοσμον, v. 7.

ΙΝΕΣ. 1. ξυλου. Fibræ. N.B. Li-
bro i^{mo}. c. 3, 4. comparatio
instituitur inter animalia et
vegetabilia : ut in prioribus
ινες και φλεβες, (arteriæ et ve-
næ,) sic in posterioribus ωσ-
περ ινες, &c. Ινες describuntur
συνεχεις, σχιστοι, επιμηκεις
(congesti, vel fasciculati ; di-
visibiles ; in longitudinem
procurrentes ;) απαραβλητοι,
(non confusi inter sese) αβλα-
στοι, (non ramosi.) Congruunt
hi cum canalibus capillaceis,
vel lymphæductibus Grew-
ii, Lewenhoek, aliorumque.
Quod ad φλεβας, vel vasa spi-
ralia, vid. φλεψ. 2. Vermes.
Ascarides in corp. humano,
ix. 14.

ΙΝΩΔΗΣ. *supr.*

ΙΟΣ το. Gas, vapor ex fermen-
tatione. τοσντον ιος υφισταται
τω οινω σακκιζομενω, ωτε και-
εσθαι υπο των λυχινων. De C.
Pl. vi.

ΙΟΥΛΟΣ. Iulus, amentum, *Bot.*
iii. 6.

ΙΠΠΟΜΑΝΕΣ. Succus lethalis
του Τιθυμαλλου, (vid. p. 12.)
ix. 15.

ΙΣΟΠΟΔΙΑΙΟΝ. de triangulo
æquilaterali. de C. Pl. vi.

ΙΣΧΑΣ. Fructus Απιου ισχαδος,
ix. 10.

ΙΩΝΙΑ. Violetum ; N.B. A
Theophrasto aliquando Vio-
læ planta ; utpote ιον flos
ejus, vi. 6.

Κ.

ΚΑΘΑΙΡΩ. *Pbarm.* Purgo. κ.

κατω, per alvum. κ. ανω, vomitum cieo.

ΚΑΘΑΣΤΩΣ δ. Oppositum aliquod. de C. Pl. iii.

ΚΑΘΥΓΡΟΣ. Sub-madidus, i. 7. opp. καταξηρω: forf. intentionem indicat.

ΚΑΜΠΗ. Larva, Linn. vid. Tab. Systematicam; ubi transformationes insectorum accurate notantur a Theophrasto, sc. Καμπη, Χρυσαλλις, Ψυχη, Larva, Pupa, Imago L. de C. Pl. v. N. B. Σκωληξ etiam Larva quandoque ὅς εἰς ἄλλο μεταβάλλει. Ζωον πτηνον, vii. 12.

ΚΑΝΑ. pr. κανης. Canistrum, v. 8.

ΚΑΠΤΗΡ. } Corbis spec. vas
ΚΑΜΠΤΗΡ. } ex ligno flexili.
de C. Pl. v.

ΚΑΠΝΙΟΣ. "Smoaky coloured;" "grey." Αμπελος καπνιος, vitis helvola, Columella. Varro de Re Rustica. Apud nos extat spec. "grey Frontignac" dicta, ii. 4.

ΚΑΡΔΙΑ ξυλου. Pars interna trunci dura: "the heart of wood." opp. τῷ περιειληφоти, "the Alburnum," Bot.

ΚΑΡΚΙΝΟΟΜΑΙ. De ramis, et radicibus; implicor instar pedum cancri? "to tiller." Agric. i. 9. de C. Pl. i. 2.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Cancer, morbus arb. de C. Pl. i.

ΚΑΡΝΕΙΟΣ. Pila lanæ? iii. 16.

ΚΑΡΠΙΖΟΜΑΙ. Exhaustio, viii. 9.

ΚΑΡΥΗΡΟΣ. Nucifer, i. 16.

ΚΑΣΤΑΝΑΙΚΟΝ καρνον. Nux Castaneæ, iv. 10.

ΚΑΣΤΟΣ? Occurrit inter aromata, ix. 7. Forf. legend. Κοσος. Tab. Syst. p. 3.

ΚΑΤΑΒΑΛΛΩ. Semino, viii. 5. 11.

ΚΑΤΑΒΟΡΟΣ. Edax: de sterili solo, "hungry land." de C. Pl. v.

ΚΑΤΑΔΕΩ. Incanto, vi. 2.

ΚΑΤΑΚΑΡΠΙΟΝ. Syn. περικαρπιου, iv. 11.

ΚΑΤΑΚΟΡΗΣ. Satorus; de colore, iv. 10.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Congruens. ουδεν καταλογον τουτων, το ανω προς το κατω, vii. 3.

ΚΑΤΑΠΑΤΕΩ. Pedibus conculco: καταπατεμενος, και συμπατουμενος, (N. B. Vox posterior conculcationem plurimorum indicat) viii. 7.

ΚΑΤΑΠΟΘΕΙΣ αι. Voragines cænosæ: a καταπινω. de C. Pl. v.

ΚΑΤΑΡΡΥΗΚΩΣ. Delapsus. ib. ii.

ΚΑΤΑΣΚΛΗΜΙ. Aresco, flaccidus fio. τα ανθη κατεσκληκε, πως, εκλελειπτος του οικειου θερμου. de C. Pl. vi.

ΚΑΤΑΣΠΑΣΜΑΤΑ. Vibratio-

nes. κατασπασματα τας γλωτ-
τας εχειν, de lingulis fistulæ,
iv. 12.

ΚΑΤΑΣΤΑΜΝΙΣΜΕΝΟΣ. In ur-
ceolis fervatus: de vino; vid.
σαμνισκος. de C. Pl. ii.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Temperamen-
tum. καταστασις ετους, viii. 8.

ΚΑΤΑΤΡΑΓΩ. id. q. κατατρωγω.
Comedo, ix. 12.

ΚΑΤΑΦΕΡΟΜΑΙ. Deorsum fe-
ror, deterior fio, iv. 15.

ΚΑΤΑΧΑΣΜΩΜΕΝΟΣ. Hians,
ringens, Bot. de C. Pl. vi.

ΚΑΤΕΡΓΟΣ γη. Terra bene
subacta: opp. γη αργη. de C.
Pl. v.

ΚΑΥΘΜΟΣ. 1. Uredo, Scal.
morbus arborum ex nimio
calore. 2. Ventus calidus,
"Sirrocco," iv. 17.

ΚΑΧΡΥΤΑΙΟΝ. } Oleum aqua
ΚΑΧΡΥΤΑΙΟΝ. } mistum. de
C. Pl. v. Forfan fæces olei.

ΚΑΧΡΥΣ. Amentum, Bot. "Cat-
kin," vi. 1. ix. 12.

ΚΕΙΧΡΑΜΙΣ. Semen Ficûs, ii.
3.

ΚΕΔΡΙΣ. Juniperis, Cedri, L.
bacca. de C. Pl. vi.

ΚΕΚΛΙΜΜΕΝΟΣ. Flaccidus,
procumbens; de foliis, iii. 10.

ΚΕΛΥΦΑΝΩΔΗΣ. An α κελυφας,
ανος? vel error pro κελυφω-
δης? de C. Pl. i.

ΚΕΛΥΦΟΣ. Putamen nucis, te-
gumentum filiquæ, iii. et
pass.

ΚΕΝΤΡΑ τα. Nuclei in lapil-

lis. v. 3.

ΚΕΡΑΙΑ τα. Antennæ navium.
iv. 1.

ΚΕΡΑΜΙΟΝ. Amphora figulina.
de C. Pl. vi.

ΚΕΡΜΗΣΤΙ. Minutatim, v. 3.

ΚΕΦΑΛΟΡΡΙΖΟΣ. Radice bul-
bosâ, vii. 2. vel forf. fusifor-
mi. Bot. vid. infr.

ΚΕΦΑΛΩΔΗΣ. Radice fusifor-
mi, Bot. cujus apex κεφαλη
vocatur, ix. 8.

ΚΗΡΙΩΔΗΣ. Alveolatus; ex fi-
militudine alveolarum favi.
N.B. Dicitur de situ florum,
in plana superficie pl. um-
belliferarum, iii. 12.

ΚΙΒΛΟΣ? syn. Βιβλου. sed forf.
error textus, iv. 9.

ΚΙΒΩΤΙΟΝ. Dim. cymbula, v.

ΚΙΝΕΩ. De ascensu succûs. de
C. Pl. i.

ΚΙΣΣΗΡΙΣ. Pumex; lapidis ge-
nus, ix. 19.

ΚΙΣΣΗΡΟΙΔΕΣ. id.

ΚΛΑΣΙΣ. Methodus ordinandi
vites; vid. διακαρσις, βλαστο-
λογία.

ΚΛΑΥΘΜΟΣ. Ventus calidus,
forfan pr. κλυθμος, supr.
N.B. Aliter Olympias ven-
tus: ex ambiguo sensu vocis
καιω forfan ventus frigidus
ex monte nivoso, "Vent de
Bise." Fr.

ΚΛΗΜΑΤΙΔΕΣ. Dim. ramuli.
de C. Pl. iii.

ΚΛΙΝΑΡΙΑ ενδιδοντα. Lectuli e-
lastici ex ligno flexili, v. 8.

ΚΛΙΝΗ. Receptaculum in floribus compositis. *Bot.* ii. 8.

ΚΛΙΝΗΣ. Pronus, declivis: opp. ορθός. de C. Pl.

ΚΛΩΝ. Ramus major: an κλημα id. vel ramus secundarius? i. 1.

ΚΝΗΜΗ. Flexura, genuflectio in caule, ix. 14.

ΚΝΗΜΟΠΑΧΗΣ. Suræ crassitudine, ix. 4.

ΚΝΗΠΕΡΙΣ. Folliculus, *Bot.* a κνήψ, qui ibi nidulatur, ii. 9.

ΚΟΓΧΗ. 1. Mensura 2 cochlearium. 2. Bivalvis cujusdam testa ad mensuram usitata, ix. 6.

ΚΟΚΚΟΣ. Granum: semen Mali Punici. de C. Pl. v.

ΚΟΛΟΒΟΣ. Curtus, imperfectus. ανθος κολοβον, alias κολοβοανθης, flos papilionaceus, *Bot.* viii. 3.

ΚΟΛΟΥΣΙΣ. Amputatio: κολων των ῥιζων Αμυγδαλης προς το γλυκαινειν. de C. Pl. ii.

ΚΟΜΗ ἡ. 1. Pappus Tragopogonis, vii. 7. 2. Caput frondosum arboris. de C. Pl. iii. 3. Frondes in genere.

ΚΟΝΙΑΣΙΣ τειχους. Dealbatio muris calce soluta, "white-washing," iv. 11.

ΚΟΝΙΟΡΤΟΣ. 1. Pollen, *Bot.* ii. 8. ubi fecundatio Palmæ feminae accurate describitur. 2. Collectio staminum in flore; hinc κονιορτώδες ανθος, de flore stamineo. vid. χυρος.

ΚΟΠΑΔΕΣ αἱ. "Coppices of wood," voce retenta.

ΚΟΠΡΟΣ. Fimus. *Agric.* Qualitates et genera κοπρου accurate discriminantur. de C. Pl. v.

ΚΟΠΤΟΜΑΙ. Corrodor a vermibus, viii. 10.

ΚΟΡΜΟΣ. Truncus ligni: κορμοι οἱ, "Billets."

ΚΟΡΣΙΟΝ. Radix Loti, sic dicta, iv. 10. Vox Ægyptiaca.

ΚΟΡΥΜΒΑ. Corymbus, *Bot.* Κίττε κορυμβάεις σφαιραν, iii. 18.

ΚΟΡΥΝΗ. Inflorescentia thyrsiformis; ut Pruni, *Lauro cerasi* L.

ΚΟΡΥΝΑΩ. id.

ΚΟΤΥΛΗΔΩΝ. 1. Umbilicus 2. Cavitates in radice Polypodii; vel potius tentacula, ix. 14.

ΚΟΥΡΑ. } De tonsuris arborum, ii. 2.

ΚΟΥΡΙΖΩ. }

ΚΟΧΛΑΚΩΔΗΣ. Terra cochleis abundans; de stratis terræ, testaceis fossilibus, ix. 10.

ΚΡΑΔΑΙ αἱ. Verrucosæ intumescentiæ magnæ molis, in truncis arborum, i. 13.

ΚΡΑΔΑΩ. id.

ΚΡΑΔΗ. Ramus major. vid. κλων. de C. Pl. vi.

ΚΡΑΔΟΣ. Morbus in truncis vel ramis, όταν μελανθωσι, iv. 16.

ΚΡΑΜΒΟΣ. Morbus Oleæ. vid. desc. de C. Pl. v.

ΚΡΑΣΙΣ. Temperamentum ex mixtura: κρasis αἶρος, temperamentum aeris. de C. Pl. iv.

ΚΡΑΥΡΟΣ. Fragilis: opp. τῷ γλισχρῷ. i. 8.

ΚΡΕΙΤΤΩΣΙΣ. Morbus affinis ερυσιῆς.

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ τα. Pedunculi penfiles florum Arbuti, iii. 16.

ΚΡΙΝΙΟΣ. Liliaceus, a κρίνον, iv. 10.

ΚΡΟΤΗΤΟΙ οἱ. Viæ tritæ, vi. 6.

ΚΤΑΝΕΑ? Pectinis spec. (vid. Præf.) iii. 10.

ΚΤΗΔΩΝ. Cursus venarum in ligno, v. 2. vid. μονοξοος.

ΚΥΑΜΟΝ το. Fructus Κυαμου, iv. 10.

ΚΥΕΩ. Fructifico.

ΚΥΗΜΑ. Pericarpium, Bot. vi. 4.

ΚΥΡΙΟΝ το. Principium: hinc κυριον του ζην. de C. Pl. v.

ΚΥΤΙΝΟΣ. Pericarpium globosum Punicæ; vel potius Calyx carnosus, εν τῷ κυτινῷ το ανθος Ποιας, i. 22.

ΚΥΤΤΑΡΟΝ. 1. Strobilus in Pinu. 2. Cavea in receptaculo Loti, Heleotropii, &c. iii. 6.

ΚΥΩΝ δ. Canis major, fidus, i. 15.

ΚΩΔΙΑ. Papaveris pericarpium, ix. 13.

ΚΩΜΥΘΕΣ. "Beds of reeds,"

vox Ægypt. iv. 2.

ΚΩΝΟΣ. Strobilus. vid. κυτταρος, i. 18.

ΚΩΡΥΚΗ. Folliculus. De floribus Ulmi, iii. 14, 15.

Λ.

ΛΑΒΗ. Manubrium: αἱ λαβæ των εγχειριδιων, vi. 4.

ΛΑΓΑΡΟΣ. Laxus. Pharm. de alvo, ix. 11.

ΛΑΧΑΝΑ. Olera: τα προς ἡμετεραν χρειαν, vii. 7.

ΛΑΧΑΝΗΡΟΣ. } Divisio plan-
ΛΑΧΑΝΩΔΗΣ. } tarum esculentarum in λαχανῶδη, και σιτωδῇ, vii. 1.

ΛΕΑΝΤΙΚΟΣ. Lævis: item de succo molli, oleoso. Χυμος λεαντικός ἢ λεπτός, ἢ λειος. de C. Pl. vi.

ΛΕΙΜΩΝΙΟΣ. Pratenfis? Distinguitur solum in λειμωνιον, pratenfe; ελειον, palustre; λιμνωδῇ inundatum: γη λειμωνια. de C. Pl. ii.

ΛΕΙΟΚΑΥΛΟΣ. Caule lævi: opp. τῷ νευροκαυλῷ, vii. 2.

ΛΕΙΡΙΩΔΗΣ. Respectu odoris, iii. 12.

ΛΕΙΧΗΝΙΑΩ. Lichenibus infestor; de truncis arborum; "to grow mossy." de C. Pl. v.

ΛΕΚΙΘΩΔΗΣ. Instar pulmenti, iv. 10. a λεκιθος.

ΛΕΜΜΑ. Cortex arundinis, iv. 11.

ΛΕΠΙΔΕΣ αἱ. Ramenta: particulæ minutæ in aëre, "motes."

iv. 19. ὅταν αἰθρίας οὐσης (hyemis tempore) αἱ λεπίδες καταφέρονται, ὡς περ ξυσματα, πλὴν πλατυτέρα. N. B. Forf. particulæ glaciales, ib.

ΛΕΠΤΟΓΕΩΝ. Terra levis: de qualitate foli. Angl. "a light soil."

ΛΕΠΤΟΙΝΟΣ. Fibris tenuibus, de ligno, "fine grained." vid. ινές, iii. 10.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ. De particulis primordiis. Aqua pura sic dicta. de C. Pl. vi.

ΛΕΠΤΥΝΩ. Lævigo: Differt ab ἀληθεύω, molo. de C. Pl. iv.

ΛΕΠΤΥΡΙΑ τα. 1. Squamæ piscium; 2. Squamæ in corticibus et frondibus Fucorum, iv. 7.

ΛΕΠΤΥΡΩΔΗΣ. id. vii. 9.

ΛΕΥΚΑ τα. In ligno; alburnum, Bot. iii. 10.

ΛΕΥΚΟΓΑΙΟΣ. Inter foli varietates: opp. μελαγγειῶ. de C. Pl. ii.

ΛΙΘΙΑΩ. Pharm. calculo laboro, vii. 6.

ΛΙΘΟΣ ἡ. Magnes. Forf. Lapis Lydius, "touch-stone." ix. 19.

ΛΙΠΑΡΟΣ. Oleosus, nitens: vid. γλισχρός. de C. Pl. iv.

ΛΙΠΑΩ. De fluxu, vel ascensu succi in arboribus: παν το δένδρον, ὅταν βλασάνει, λιπᾶ,

iii. 6. δια το λιπᾶν ευπεριαιρετός ὁ φλοιός. ib.

ΛΙΠΟΣ. Fluxus succi.

ΛΙΠΟΤΗΣ. Morbus ex nimia fluxu. de C. Pl. v.

ΛΟΒΟΣ. Siliqua: hinc ελλοβός lobatus, μακρολοβός, &c. &c.

ΛΟΓΟΥ δεομαι. phras; Solutione egeo. de C. Pl. v.

ΛΟΠΑΣ. Morbus in radicibus ex nimio humore; οἷον μαδισίς, vid. λιπαώ: præcipue in Ficu. de C. Pl. v.

ΛΟΠΕΩ. Vid. infr. λοπός, iv. 18.

ΛΟΠΙΑ. } Tempus decorticationis, v. 1.

ΛΟΠΟΣ. Tunica corticis: hinc cortex μονολοπος, πολυλοπος, i. 8.

ΛΟΥΣΣΟΝ το. In trunco Abietis nodus similis αἰγίδος: (vid.) sed albus, το λευκον λουσσον: Αἰγίς autem ευχρως δια το ενδεδον, iii. 10. N. B. id. q. αἰγίς in Pinu.

ΛΟΦΟΥΡΟΙ οἱ. Equi, Afini? Vox λοφύρος, crista-caudatus, ex usu caudæ equinæ ad galearum cristas: opp. τοῖς σελεφεροῖς, Ovibus, Capreis, Damis, &c. quorum cauda cylindrico-æqualis, instar stipitis, iii. 10. p.

ΛΟΧΕΙΑ. Parturitio, item met. in arboribus. de C. Pl. iii.

ΛΟΧΜΗ. Dumetum paludosum: "a jungle."

ΛΟΧΜΩΔΗ τα. Frutices ibi crescentes, iv. 9.

ΛΥΠΡΟΤΗΣ. Ariditas, macies :
forſan a λυπηρος, triftis. de
C. Pl. v.

ΛΥΤΙΚΟΣ. Φαρμακον λυτικον, an-
tidotum, ix. 16.

M.

ΜΑΔΑΩ. infr.

ΜΑΔΙΣΙΣ. Morbus Ficûs ad ra-
dices, ex nimio humore, iv.
16.

ΜΑΚΕΔΩΝΙΑ. Montes hujus
regionis arboribus variis ſca-
tent: Ελαίη, Πευκη, Πίλυσ, Π.
αγρία, Φιλυρα, Φηγος, Πυξος,
Ζυγία, Ανδραχνη, Μίλος, Αρ-
κευθος, Τερμινθος, Ερινεος, Φι-
λυκή, Αφαρκη, Καρυα, Διος βα-
λανος, Πρίνος, iii. 4.

ΜΑΛΑΚΟΣ. Reſpectu temperi-
ei cœli: αηρ μαλακος, “a ſoft
air,” vi. 7. reſpectu ſaporis
vini: opp. αυστηρ. de C. Pl.
ii.

ΜΑΛΑΣΣΩ. Tundendo mollio,
de C. Pl. v.

ΜΑΝΟΣ. 1. Rarus reſpectu ſi-
tûs: φύλλα μανα opp. πυκ-
νοις, v. 3. 2. laxus, poroſus;
γη μανα, και ευδιοδος, i. 8.
ξύλον μανον, i. 6.

ΜΑΝΟΤΗΣ, id.

ΜΑΣΑΩ. } De actione man-
ΜΑΣΗΜΑ. } ducandi: “chew-
ΜΑΣΗΣΙΣ. } ing,” iv. 9.

ΜΑΣΠΕΤΟΣ. Folium Silphii,
vi. 3. N. B. Vox Syriaca?

ΜΑΣΧΑΛΗ. Axilla rami, vel
folii, Bot. iii. 9.

ΜΑΤΙΑΙΟΣ. Per contractionem
pr. ναματιαιος· ὕδωρ ματιαιον,
aqua fontinalis, ii. 8.

ΜΕΛΑΓΓΕΙΟΣ. } Soli ſpec. Α-
ΜΕΛΑΓΓΕΩΣ. } gric. γη πιειρα
και μελαγγειος, “a rich black
mould.” de C. Pl. ii.

ΜΕΛΑΝΔΡΥΟΝ. Cor ligni quer-
cûs, vel generaliter; Δρυς
enim vox generalis: opp. τοις
λευκοις. (vid. τα λευκα) i. 9.

ΜΕΛΑΣ. } De colore; ob-
ΜΕΛΑΝΙΑ. } ſcuritatem quan-
dam indicat; ita apud nos,
“dark coloured,” v. 4. et paſſ.

ΜΕΛΙ. Methodus edulcorandi
ſpecies quaſdam infuſione
ſeminum in melle. de C.
Pl. v.

ΜΕΛΙΤΤΑ. Avertatur unguenta
pretioſa. de C. Pl. vi.

ΜΕΛΙΤΤΟΥΤΑ. Placenta farrea
melle condita: παγκαρπος
μελιττουτα, in qua ſαφιδες,
aliique fructus paſſi: “a
plum cake.”

ΜΕΡΟΣ. κατα μέρος· ανα μέρος,
ſucceſſive, vii. 3. et p.

ΜΕΣΟΓΟΝΙΟΝ. Internodium,
iv. 12.

ΜΕΤΑΒΛΑΣΤΑΝΩ. Iterum
germino: δένδρα αυτομάτως
μεταβλαστανει, μεταβολης τινος
γινομενης εκ των ουρανιων, ii. 7.

ΜΕΤΑΛΛΑ τα. Fodinæ metal-
licæ, ix. 13.

ΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΑ τα, Mi-

neræ crudæ; "Ores." de
C. Pl. vi.

METEΩΡΟΣ. Superficialis; de
radicibus, iii. 11.

MΗΛΙΝΟΕΙΣ. Subflavus, iii. 11.

MΗΛΙΝΟΣ, α μηλον. Flavus. de
C. Pl. ii.

ΜΗΡΙΚΑΖΩ. } Rumino. N. B.

ΜΗΡΥΚΑΖΩ. } Animalia distin-
guuntur in μηρυκαζοντα, et λο-
φουρα, (vid.)

ΜΗΤΡΑ. 1. Medulla, pars ca-
va, vasculosa in truncis et
ramis: το μεταξύ του ξυλου,
τριτον απο φλοιου, i. 3. 2. In-
terior pars trunci in adultis,
aliter καρδια, εγκαρδιον, εντε-
ριωνη. N. B. evanescit ætate
ἡ μητρα. In quibusdam, ut
observat Theoph. est ὑμενωδης,
(vasculosus,) in aliis σαρκω-
δης, in aliis ξυλωδης, i. 9. Μη-
τρα μαλιστα ζωτικον. de C. Pl.
v. Hinc cel. Linn. in Amœ-
nit. "vita plantarum in sub-
stantia medullari consistit;"
forf. in junioribus: sed de
hoc inquirendum.

ΜΙΔΑΣ. Morbus in Fabis, Pi-
sis, &c. Forf. Puccinea, *Pha-
seolorum* Hedw. fil. Fung.
ined. t. 19. vel Uredo, *ap-
pendiculata* var. β, Persoon,
Syn. 222. Fungi hi minutif-
simi folia et plantas totas
quandoque cooperiunt, unde
ex aureo colore nomen for-
san a fabula inditum.

ΜΙΚΡΟΠΗΝΟΣ. Per contract.

α πυρην, nucleo parvo. de C.
Pl. i.

ΜΙΣΧΟΣ. 1. Pedunculus, *Bot.*

p. ὃ συνηγεται το φυλλον. 2.
Ligonis spec. forf. tridens
quoddam. vid. δικελλω. de
C. Pl. iii.

ΜΟΛΥΝΣΙΣ. Tarda concoctio.
de C. Pl. iv.

ΜΟΝΑΧΟΥ. Uno in loco, ix. 10.

ΜΟΝΟΚΩΛΟΣ. Simplex, *Bot.*
non lobatus, de folio, ix. 20.

ΜΟΝΟΞΟΟΣ. De cursu vena-
rum in ligno; "the grain."

N. B. Haud facile intelligen-
dus sensus auctoris respectu
κτηδονων in ligno; (vid.) 1.
μονοξοα, vel μονοζοα, (*Bot.*)

πλειω εισι των αλλων ξυλων.
(v. 2.) 2. Διξοα εχουσι κτηδα-
να μιαν εφ' ἑκατερα της εντερια-
νης και ταυτας εναντιας αλλη-
λαις, ib. 3. Δενδρα τετραξοα,

οσοις εφ' ἑκατερα της εντεριανης
δυο κτηδονες εισι εναντιας εχου-
σαι την φυσιν. ib. N. B. Lign.

Pinus exemplum præbet pos-
terioris, ex singulari modo
crescendi, sc. quatuor ramis

horizontalibus; hinc κτηδονων,
vel cursuum venarum in lig-
no dispositio.

MONOPPIZOS τη παχεια. Ra-
dix fusiformis. *Bot.* vi. 7.

ΜΟΝΟΣΤΡΟΦΟΣ. Rota sim-
plici; μονοστροφος αμαξα, v.

8.

ΜΟΝΟΦΥΗΣ. Homogeneus. de
C. Pl. i.

ΜΟΝΟΦΥΛΛΟΣ. Respectu germinationis feminum; Monocotyledonus. *Bot.* viii. 2.

ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ τὰ. Surculi: opp. φυτευμασι, plantis ex femine. de C. Pl. vi.

ΜΟΣΧΕΥΩ. Propago per surculos. 1. simpl. "to plant cuttings or suckers;" 2. μοσχευειν vel προμοσχευειν ἐπ' αὐτοῦ τοῦ δένδρου, "to graff." ii. 7. et p.

ΜΟΧΘΗΡΟΣ. Met. sterilis; γη μοχθηρα, ii. 3.

ΜΥΡΙΟΠΟΥΣ? Leg. αμαυροπους, de Triangulo inæquilaterali. opp. ισοποδιαῖω. de C. Pl. vi.

ΜΥΡΙΣ. Vas unguentarium: "a perfume pot."

ΜΥΟΧΟΔΟΙ. Rectius Μυοδοχοί. 1. Cavitates murium. 2. Te rebrellum, "a gimlet;" cujus actio denotatur δια το περιστραφῆσθαι, v. 5.

N.

ΝΑΙΡΟΝ. Unguenti pretiosi spec. ix. 7.

ΝΑΜΑΤΙΟΣ. } Fontinalis. vid.
ΝΑΜΑΤΙΑΙΟΣ. } per contrac-
tionem ματιαῖος, supr. N. B. ναμ. ὕδωρ, opp. ὕδατι ἐκ δῖος, ("rain water,") viii. 7.

ΝΑΡΔΟΣ. Ung. Vid. Ναρδος, *Tab. Syst.* p. 22. "spike-nard," ib. N. B. Andropo-

gon *Schoenantbus* L. accurate delineatur et describitur in opere egregio apud Gallos "Jardin de Cels" dicto. *Tab.* 89.

ΝΑΡΘΗΞ. Internodium. 1. Ferula pl. (v. *Syst.*) 2. Internodium caulinum. N. B. Τὸ κοῖλον ναρθηκος, vice phialæ apud antiquos in usu, ix. 16.

ΝΑΡΤΗ. Forfan præparatio diversa ναρδου, supr. separatim enumeratur in *Cat.* ix. 7.

ΝΕΑΩ. De actione novandi agros: "to fallow."

ΝΕΙΟΣ. } Novale. νεῖος εαρινός.
ΝΕΙΟΝ. } νεῖος χειμερινός, viii. 6.

ΝΕΜΟΜΕΝΟΣ. Excavatus: νεμομενα ἔλκη, ulcera profunda, inveterata, ix. 12.

ΝΕΟΔΕΡΟΣ. Recens excoriatus, ix. 15. met. de cortice in arboribus.

ΝΕΩΤΑ. Εἰς νεωτά, in annum proximum.

ΝΗΠΙΟΣ. *metaph.* de plantis junioribus, viii. 1.

ΝΗΣΟΙ πλοαδες. Fluitantes. Frequens mentio in lacubus et fluviis. L. Orchomeni, ix. 13.

ΝΙΤΡΟΝ. Sal nitrum: singularis usus ejus ad edulcorandos Raphanos. de C. Pl. iii.

ΝΟΣΤΙΜΟΣ. Gustu dulcis; a νοστός. *Phav.* σπέρματα ευχολότερα, νοστιμότερα. de C. Pl. iv.

Ξ.
ΞΥΛΟΝ. Pars solida trunci et ramorum, constans ex partibus quæ *ινες, φλέβες, σαρξ* vocantur. (vid.) N.B. Ξύλα antiquitus in *δερμα και ψυχρα* dividebantur respectu usus in *πυρραις*. Ξύλα *δερμα* frictione, calida evadunt, et hebetant aciem telorum; hujus generis *Κιττος, Δαφνη, Συκαμινος*, v. 4.

ΞΥΝΑΝΘΡΩΠΕΥΟΜΑΙ. *Met.*
 Mansuefactus sum, de plantis cultura amelioratis. de C. Pl. i.

ΞΥΝΕΙΣΤΗΚΩΣ. Compressus, vi. 2.

ΞΥΡΟΣ? An error pro *ξηρος*?
ξηρος και ξυλωδης.

ΞΥΩ. Rado: *ξυειν εν οινω*, "scraping a root into wine," ix. 12.

Ο.
ΟΓΚΟΣ. 1. Tumor. 2. Pericarpium globosum rosæ, i. 22.

ΟΖΟΣ. Nodus in arbore, ubi ramus oritur. N.B. Fibræ (*ινες*) ibi deflectuntur, et in orbem circumferuntur: (vid. *κτηδων, μονοξοος*.) *εστι οζος αρχη τις του κλαδου*. Hinc *τριοζα δενδρα, τετροζα, πενταοζα*, i. 13. N.B. *Οζοι* præcipue conspiciuntur in Pinu et Abiete L.

ΟΙΚΕΙΟΣ. Conveniens, moderatus, consentaneus.

ΟΙΚΗΜΑ. Receptaculum in Compositis. *Bot. de C. Pl. iv.*

ΟΙΝΑΡΟΝ. Vitis folium. de C. Pl. vi.

ΟΙΝΟΣ. Vinum: potestates variae in diversis vini generibus. *οινος αγονος*, (sterilitatem inducens,) ix. 12. *οινος υπνωτικός* *οινος εκστατικός*. N.B. Vini usus ad arcendos vermes ex feminibus. de C. Pl. iii.

ΟΙΝΩΔΗΣ. Purpureo-ruber respectu coloris; *υγρασια οινωδης τη οψει*, iii. 13.

ΟΙΝΩΨ. } Id. N.B. Lig-
ΟΙΝΟΧΡΩΣ. } num *Αριας λευκοτερον του Πεινου, οινωποτερον της Δρυος*, "darker coloured," iii. 16. *υνα οινοχρωτες, και ερυθροι*, ix. 3.

ΟΛΙΒΑΝΟΝ. Fructus vel gummi *Ολιβανου*. Vid. *Tab. Syst.* p. 28.

ΟΛΙΓΟΧΟΟΣ. Parcius fructum ferens: opp. *πολυχωω*, viii. 4.

ΟΛΚΗ. Pondus: ab *ελκω*, (vergo,) ix. 17.

ΟΛΚΟΝ το. Vis attractiva, ab *ελκω*, (traho): *τουτο το ολκον της τροφης*. de C. Pl. iv.

ΟΛΜΟΣ. Mortarium: *κοπτοντες εν ολμω*, "pounding in a mortar," ix. 16.

ΟΛΥΜΠΙΑΣ. Ventus ex M. Olympo, iv. 17. vid. *καυδμος*,

ΟΛΥΝΘΑΖΩ. Ab ολυνθος, caprifico. N. B. Caprificationis methodus et notitia sexûs plantarum Theophrasto cognitæ. Investigatione instituta de influentia aëris respectu fructificationis, de C. Pl. ii. ita pergit Auctor: και των τοιούτων εν τη προσαρτησει τε, και τοις ογκοις (in appendice florali et pericarpis) η αιτια (causa vel modus impregnationis:) των δε Συκων και Φοινικων ουκ εν τουτοις εστι μονον, αλλα και εν τη διασασει αυτων, (etiam quando arbores ipsæ situ separentur,) διο και εριναζουσι τας Συκας· τουτο δε ποιουσιν οπως οι Ψηνες (Cynips Pfenes) οι εκ των Ερινων (vid.) επικρεμαννυμενων γινόμενοι διοιγωσι τα επι της Συκης.

ΟΜΑΛΗΣ. Lævis, homogeneus; texturæ simplicis: opp. λεπυρωδει, tunicato, vii. 9.

ΟΜΟΙΟΜΕΡΗΣ. In partes similes divisibilis, ut aqua &c. N. B. Opp. ανομοιομερει, ut truncus arboris in corticem, lignum, fibras, succum, i. 2.

ΟΜΟΣΤΙΧΟΣ. Serie simplici: vid. διστιχος, &c. de C. Pl. vi.

ΟΜΦΑΚΩΔΗΣ. Color fature purpureus: hinc bacca Sambuci, nigri L. ita vocatur, iii. 12.

ΟΜΦΑΞ. Succus uvæ inspissatus.

ΟΜΩΝΥΜΙΑ. Synonymia.

ΟΜΩΝΥΜΟΣ. Synonymus, Bot. vii. 14. id.

ΟΞΥΒΑΦΟΝ. Acetabulum, mensura, ix. 12.

ΟΟΝ. } Fructus Sorbi, ii. 3.
ΩΟΝ. }

ΟΠΟΒΑΛΣΑΜΟΝ. Gummi Amyridis, Giliadensis L. Vid. Tab. Syst.

ΟΠΙΣΜΟΣ. Collectio fucci sponte fluentis: opp. χυλισμω, succo expresso. vid.

ΟΠΟΚΙΝΝΑΜΩΜΟΝ. Oleum Cinnamomi, iv.

ΟΠΟΣ. Succus sponte fluens: opp. χυλω, succo expresso. N. B. Οπος coagulatus aliquando δακρυον vocatur, i. 3.

ΟΠΩΔΗΣ. Aqueus: opp. γαλακτωδει, πιττωδει, i. 19.

ΟΡΓΑΩ. Intumesco: όταν οργατα σπερματα, antequam germinent. de C. Pl. ii. γη οργωσα, ενικμος, ib. iii.

ΟΡΕΟΤΥΠΟΙ. Lignarii, ib. vi.

ΟΡΜΗ. Excitatio, tendentia: opp. τη φθορα respectu odorum. de C. Pl. vi.

ΟΡΝΙΘΕΣ. Ætate progrediente dissimiles sibi, plumarum colore mutato. de C. Pl. v.

ΟΡΟΣ. } 1. Serum lactis,
ΟΡΡΟΣ. } "whey." 2. Serum sanguinis. 3. Succus tenuis serofus, iii. 10. ix. 2.

ΟΡΡΩΔΗΣ. Serofus.

ΟΣΜΗ. Διηθησις του ξηρου δια τε υγρε, de C. Pl. vi. ubi sub-

tilis admodum Demetrii Philosophi occurrit disquisitio de differentiis odorum ex forma particularum.

ΟΣΤΑΥΓΞ. } 1. Tentaculum.
ΟΣΤΑΙΓΞ. } Nat. Hist. 2. Cir-
rhus, Bot.

ΟΥΛΟΣ. 1. Crispus, cirrhatus; de coma capitis apud Afros. 2. Fibrarum distorsiones in ligno, (αἱ συσφραγαὶ τῶν ξύλων, v. 6.) 3. Curvitates ramorum, iii. 17. 4. De rugoso Brassicæ folio. (vid. ῥαφανός, Tab. Syst. p. 15.)

ΟΥΛΟΤΗΣ. Id.

ΟΥΡΟΝ. Usus urinæ in edulcorandis amygdalis. de C. Pl. iii.

ΟΥΟΝ. Vid. ΟΟΝ.

ΟΦΘΑΛΜΟΣ. Gemma. Bot. Hinc οφθαλμιζω, Hort. et εν-οφθαλμισμος. (vid.)

ΟΥΙΟΣ. ὕδατα οψία in calidis regionibus, "Tropical rains" dict.

Π.

ΠΑΓΚΑΡΠΙΟΣ. Fructibus omnigenis farctus. παγκ. μελιττοῦτα. vid.

ΠΑΓΟΙ οἱ. Tempus glaciale, iv. 17.

ΠΑΘΗ τα. Proprietates, vires, respectu plantarum; sic apud Virg. "Scire potestates herbarum," i. 1.

ΠΑΙΔΕΙΑ φυτῶν. Hort. "the training of trees." de C. Pl. iii.

ΠΑΛΑΘΗ. Massa fructuum conditorum, præcipue Ficum; hoc modo facta; ξηραίνοντες τὸν καρπὸν, (τῆς Κοκκυμηλίας) καὶ τοὺς πυρήνας εξαίρουντες κοπτοῦσι, (tundunt) καὶ ποιοῦσι παλαδάς. Angl. "Marmalade." iv. 9.

ΠΑΛΙΒΛΑΣΤΟΣ. Iterum germinans: de germ. autumnali, "the autumn shoots," bort.

ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΣ. Reciprocus; sibi invicem succedens. de C. Pl. iii.

ΠΑΝΑΞ το. Succus inspissatus Πανακειας. vid.

ΠΑΠΠΙΟΣ. Lanugo; pappus, Bot.

ΠΑΠΠΩΔΗ σπέρματα. Papposa; pappo coronata. Bot. vi. 4.

ΠΑΡΑΒΛΑΣΤΑΝΩ. Germino ex radice: i. e. "by the side of the trunk."

ΠΑΡΑΒΛΑΣΤΟΣ. Ang. "a sucker," i. 9.

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΙ. Apud Orientes. Septa spatiosa arboribus confita, feris omnigenis servandis. vid. Desc. v. 9. ix. 6.

ΠΑΡΑΚΑΘΙΗΜΙ. vid. παραβλασανω, viii. 2.

ΠΑΡΑΚΑΝΘΙΖΩ. Juxta folium spinosus sum? vel forf. spinulis, ex margine vel rachi folii, i. 17.

ΠΑΡΑΚΑΤΛΙΖΩ. De fruticibus
ab imo caulescentibus : opp.

μονοκαυλιζω. *Bot.* vi. 2.

ΠΑΡΑΚΙΝΕΩ. Infanire facio,
ix. 20.

ΠΑΡΑΛΙΘΑΖΩ. Lapidescō : de
concretionē in fructu Pyri,
iii. 10.

ΠΑΡΑΛΛΑΞ. Alternatim.

ΠΑΡΑΛΛΑΤΤΩΝ. Alternans.
Bot.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ. Oppositus. *Bot.*

ΠΑΡΑΠΛΗΓΩ. Distorqueo, v.
3.

ΠΑΡΑΠΛΗΘΙΑ. Abundantia.
de C. Pl. iii.

ΠΑΡΑΠΟΙΕΩ. Perperam facio.
de C. Pl. iii.

ΠΑΡΑΣΠΑΔΕΣ. Rami avulsi ad
propagandum : "fets." N.B.
Rami abscissi apud nos voc.
"cuttings," ii. 2.

ΠΑΡΑΤΕΜΝΩ. Intempestive
cædo, vi. 3.

ΠΑΡΑΦΥΑΔΕΣ. id. q. παρα-
βλαστοί.

ΠΑΡΑΦΥΩ. Pullulo eodem tem-
pore; vel act. emitto radices,
furculos, &c. vii. 2.

ΠΑΡΙΗΜΙ. Debilitor. de C. Pl.
iii.

ΠΑΡΙΣΤΗΜΙ. id. quod εξίστημι,
de vino. de C. Pl. vi. "to
turn four." Οἱ λεπτοὶ οἶνοι
ευωδεῖς, καὶ θάττον παρῖσταμ-
μενοί. ib.

ΠΑΡΥΔΡΟΣ. Juxta aquas cres-
cens : ενυδρὸς, in aquis, iv.
13.

ΠΑΡΩΡΟΣ. Intempestivus. de
C. Pl. iii.

ΠΑΤΤΑΛΟΣ. Paxillum : "a
peg." π. σιδηρὸς, ii. 3.

ΠΑΤΤΩ. Complano, premo.
de C. Pl. vi. Calco pedibus.
Hinc

ΠΑΤΟΣ. Via calcata : Angl.
voce fere retenta, "a path,"
vi. 6.

ΠΕΠΕΙΡΟΣ. syn. πεπαῖνος, ma-
turus. de C. Pl. iii.

ΠΕΡΙΑΔΕΙΦΩ. Circumluto, v.
9.

ΠΕΡΙΑΛΛΟΚΑΥΛΟΣ. Caule
scandente. *Bot.* viii. 8.

ΠΕΡΙΒΩΘΡΩΜΕΝΟΣ. *Hort.*
"trenched round." de C.
Pl. v.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ. Circumscindo;
notas circum incido, ix. 9.

ΠΕΡΙΚΑΘΑΙΡΩ. *Hort.* vid. κα-
θαίρω.

ΠΕΡΙΚΑΤΑΛΗΨΙΣ. Successio
continuata florum vel fruc-
tuum.

ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΟΣ. Ambitus
capitis; mensura, iii. 13.

ΠΕΡΙΚΟΜΟΣ. Frondosus val-
de, iii.

ΠΕΡΙΜΗΤΡΙΟΣ. De ligno. vid.
μητρα, iii. 10.

ΠΕΡΙΟΧΗ. Tegmen; cuticula
pericarpii. *Bot.* de C. Pl. i.

ΠΕΡΙΠΑΤΤΩ. vid. παττω, ii. 8.

ΠΕΡΙΠΠΤΩ. Undique decido;
de cortice arbuti, i. 8.

ΠΕΡΙΠΝΟΥΣ. "An eddy of
wind," v. 2.

ΠΕΡΙΣΑΤΤΩ. } Circumstipo.
ΠΕΡΙΣΑΞΙΣ. } Vid. σαττω. de
C. Pl. v.

ΠΕΡΙΣΚΕΛΗΣ, a σκελλω. Ari-
dus, durus: de radice Helle-
bori: σκληρόν και περισκελη,
ix. 11. item de vento, Angl.
“a dry parching wind.” de
C. Pl. ii.

ΠΕΡΙΤΤΟΣ. 1. Extraordinarius,
excellens, ix. 7. 2. Superflu-
us, ἐξ ακρου περιττος, de folio
pinnato, extremo impari. Bot.
iii. 15.

ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ. Superflua;
excrementa: N.B. Animalia,
τα περιττώματα, per alvum
ejiciunt, non tamen plantæ,
quæ idcirco απεριττωτοι, i. 4.
de C. Pl. vi.

ΠΕΡΙΦΕΡΩ. Sustineo: de viri-
bus stomachi ad digerendum,
ix. 13.

ΠΕΡΝΙΞ. Pars fructifera Cacti,
opuntiae L. vi. 4.

ΠΕΡΥΣΙΝΟΣ. Prioris anni; de
fructu. ὁ καρπος (Juniperi)
διαμενει εις ενιαυτον· ειθ' ὅταν
ὁ αλλος επιφυη, ὁ περυσινος
αποπιπτει, iii. 12.

ΠΕΣΣΟΣ. Pharm. “a tent for
a wound,” ix. 22.

ΠΕΤΑΣΟΙ οἱ. Folia Ari, colocas-
iae, ex similitudine.

ΠΗΓΝΥΩ. Planto manibus. Bot.
vii. 1.

ΠΗΚΤΙΚΟΣ. Congelans.

ΠΗΞΙΣ. Concretio gummosa,
ix. 1. αἱ Πηξεις de tempore

pruinoso.

ΠΗΝΙΟΝ. Fusus: “spindle.”
forf. ex voc. Græc. vii. 3.

ΠΗΡΩΣΙΣ. met. οφθαλμων, in
arboribus, “a blight,” iv.
16.

ΠΙΕΣΑΓΓΑΙ. } Anginæ pecto-
ΠΙΕΣΑΓΧΑΙ. } ris. de C. Pl. iv.

ΠΙΛΗΣΙΣ. Constipatio. de C.
Pl. ii.

ΠΙΛΟΣ ἡ. Pars floccosa, iv. 10.

ΠΙΛΩΝ. Coarctio. ὁ χειμων πι-
λοι και καρκινοι (vid.) τας ῥι-
ζας. de C. Pl. iii. 4.

ΠΙΤΤΟΚΑΥΤΕΩ. De actione
ligna Abietina comburendi
ad extrahendam picem. vid.
Desc. ix. 2.

ΠΛΑΓΙΟΚΑΡΠΙΟΣ. Fructu late-
rali, vii. 3.

ΠΛΑΓΙΟΚΑΥΛΟΣ. Caule hori-
zontali: opp. ορθοκαυλω, viii.
3.

ΠΛΑΚΟΥΝΤΩΔΗΣ. Placenta-
ceus, iv.

ΠΛΑΚΩΔΗΣ. Schistofus. Geo-
log. γη υπαργιλος και πλακω-
δης, ix. 4.

ΠΛΑΣΙΣ. επει εις την πλασιν με-
τεβησαν, (quando cœperunt
fistulas formare,) συν πλασ-
ματι, iv. 12.

ΠΛΑΣΜΑ. “the mouth-piece
of the fistula.” οἱ μετα
πλασματος αυλοντες: vid. et-
iam γλωττα, iv. 12.

ΠΛΕΚΤΑΝΑΙ. Tentacula: πο-
λυποδος πλεκταναι, ix. 14.

ΠΛΙΝΤΡΙΣ. Latericius, figuli-

nus. γη πλιντρεις. de C. Pl. iii.
 ΠΛΟΑΔΕΣ. (νησοι) Insulæ fluitantes, iv. 11.
 ΠΛΟΚΑΜΟΣ. Textilis: Καλαμου spec. iv. 11.
 ΠΝΕΥΜΑ το. Vapor, gas. εν οινω ζεοντι, ix. 18.
 ΠΝΙΓΗ τα. Calor æstivus, ix. 5.
 ΠΟΑ. 1. Pars herbacea plantæ, ix. 16. 2. Vires vel succi plantarum. τας φυλλωδεις δυναμεις ποας καλουσι, ix. 8.
 ΠΟΑΣΜΟΣ. Sarculatio; actus averruncandi: "weeding." de C. Pl. iii. vid. σκαλισις.
 ΠΟΔΙΑΙΟΣ. vid. ισοποδιαιος.
 ΠΟΛΛΟΥ δια, respectu loci, longo intervallo. de C. Pl. iii.
 ΠΟΛΥΛΟΠΟΣ. vid. λοπος, μονολοπος.
 ΠΟΛΥΜΑΣΧΑΛΟΣ. vid. μασχαλη, iii. 17.
 ΠΟΛΥΝΟΣΤΟΣ. Fœcundus valde, viii. 8.
 ΠΟΛΥΧΟΟΣ. id. de C. Pl. ii.
 ΠΟΝΕΩ. Marcesco, debilis sum. de C. Pl. iii.
 ΠΟΩΔΗΣ. Herbaceus: divisio plantarum, viii. 1.
 ΠΡΑΝΗΣ. Supinus: inferior folii superficies: opp. τω ὑπτίῳ, i. 14, 16.
 ΠΡΕΜΝΟΝ. 1. Surculus major; stipes, ii. 1. 2. morbus, seu intumescencia in ramo, i. 13.
 ΠΡΙΟΝΩΔΗΣ. Serratus, Bot. iii. 14.

ΠΡΙΣΙΣ. Actio ferræ, v. 6.
 ΠΡΙΣΜΑΤΑ τα. Particulæ ligneæ ex ferratura: "sawdust," v. 8.
 ΠΡΟΑΠΤΩΤΟΣ. Immature decidens: ερινεα προαπτωτα, iii. 5.
 ΠΡΟΒΟΛΑΙ αι. Primæ germinationes. de C. Pl. v.
 ΠΡΟΔΡΟΜΑΙ αι. Fructus præcox Ficûs. de C. Pl. v.
 ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΙΣ. Præparatio arundinum ad fistulas faciendas.
 ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ. Prævenio; magico sensu. καταδειν και προλαμβάνειν, vi. 2.
 ΠΡΟΣΑΓΩ. Applico remedium, ix. 13.
 ΠΡΟΣΑΦΕΨΕΩ. De præparatione ad coquendum: προσαψηθεντα εν οξει, (prius infusa et cocta in aceto,) vii. 11.
 ΠΡΟΣΔΕΝΔΡΟΝ. Parasita. Bot. de C. Pl. ii.
 ΠΡΟΣΘΕΤΑ τα. Menses muliebres, ix. 10.
 ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ. Recens: χλωρος και προσφατος. de C. Pl. vi.
 ΠΡΟΣΦΟΡΑΝ κατα. De cibo idoneo ad fumendum. de C. Pl. vi.
 ΠΡΟΣΦΟΡΟΣ. Conveniens, viii. 6.
 ΠΡΟΣΦΥΣΙΣ. 1. Infertio, i. 18. adhæfio, viii. 2. 2. Receptaculum in Compositis, Bot. vii. 13.

ΠΡΟΤΕΡΕΩ. Præcedo : προτε-
ρειν διμηνω, de præcocitate
florum in Ægypto, vi. 7.

ΠΡΟΤΡΙΤΑ. Adv. tertio. de C.
Pl. iii.

ΠΡΟΩΘΕΟΜΑΙ. Sursum impel-
lor, iii. 7.

ΠΡΩΡΟΣ. Præcox, vii. 12.

ΠΡΩΡΑ. Bot. Apex vel fasti-
gium rami, &c. ii.

ΠΤΕΡΝΙΞ. Caulis Cacti, *opun-
tia* L.

ΠΤΕΡΩΔΗΣ. Pinnatus. Bot. ii.

ΠΤΙΣΣΩ. Tundo, item decor-
tico, ii. 5.

ΠΤΟΡΘΑΚΑΝΘΟΣ. Ramis spi-
nosus, vi. 1.

ΠΥΓΩΝ. Cubitus; mensura, iv.
6.

ΠΥΘΜΗΝ. Corona radice fus-
formis. Bot. iv. 12.

ΠΥΚΝΟΣ. De ligno; solidus,
densus : opp. *μανω*. vid.

ΠΥΡΕΙΑ. } Instrumentum igni
ΠΥΡΕΙΟΝ. } accendendo vi fric-

tionis : partes sunt, 1. *σχά-
ρα*, (lignum planum foveâ in
medio;) 2. *τρυπανον*, (tere-
bra; pistillum obtusum ex
ligno duro,) v. 10. N.B. Mos
adhuc obtinet in India oc-
cidental.

ΠΥΡΗΝ. 1. Bacca, vel drupa,
Bot. 2. Nucleus in medio
lapilli, vel calculi. 3. Granum
in baccis. de C. Pl. ii.

ΠΥΡΩ. Torreo : igni coquo :
de C. Pl. vi.

ΨΥΡΩΣΙΣ (a *Ψυρος*). Panifici-

um. de C. Pl. iv.

ΠΩΡΟΟΜΑΙ. In tophum con-
vertor : de cortice arboris,
iv. 18.

P.

ΡΑΒΔΟΙ οί. Venæ minerales,
ῥαβδοι μεταλλων. de C. Pl. iv.

ΡΑΒΔΟΣ Φοινίκος. Spatha, Bot.
ii. 8.

ΡΑΓΑΔΗΣ. } A *ῥαξ*, acinus :

ΡΑΓΩΔΗΣ. } de fructu Man-
dragoræ acinis pleno, vi. 3.
de p. Punicæ. de C. Pl. v.

ΡΑΧΙΣ. Rachis, Bot. neryus
intermedius folii; pedunculi
continuatio, iii. 8.

ΡΕΙΝ τα. Morbus vitis, ex ni-
mio succo. de C. Pl. v.

ΡΗΓΜΑΤΑ τα. Fracturæ. Med.
vii. 11.

ΡΗΤΙΝΗ. } Propr. Terebinthi-

ΡΥΤΙΝΗ. } na fluido statu :
hinc vox Angl. "refin," de
concreto, iii. 15.

ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ. Resinosus, ut-
pote lignum Abietinum.

ΡΙΖΟΤΟΜΙΑ. Anni tempus
herborifando proprium, ix. 8.

ΡΙΖΟΤΟΜΟΣ. Herbarius, iv. 5.

ΡΙΖΟΦΥΛΛΟΣ. De plantis, fo-
liis radicalibus. Bot. vii. 10.

ΡΟΑΔΕΣ αί. Grana vel semina
Mali Punici, iv. 11.

ΡΟΑΣ. } Morbus vitis. Syn. τῶ

ΡΟΙΑΣ. } *ῥεῖν*. de C. Pl. v.

ΡΟΔΩΝΙΑ. 1. Rosa planta
2. Rosetum.

ῬΟΠΗ. 1. Inclinator, propensio, iv. 4. 2. Vis insita. de C. Pl. iv.

ῬΟΠΟΙ? An id. ῥοποι μασχαλίδος. a ῥέπω, iv.

ῬΟΥΣ Succus fruticis. (vid. *Tab. Syst.*) Ῥοος, inspissatus, iii. 18.

ῬΩΔΗΣ. Irriguus, γη ῥωδης. de C. Pl. iii.

ῬΥΠΤΙΚΟΣ. Abstergens; de C. Pl. v.

ῬΥΠΤΟΜΑΙ. Abstergor: τραχισκαί της τρυγος, (vid.) οἱς ῥυπτομεθα, (quorum usus in abstergendis sordibus, ut hodie saponis,) ix. 10.

ῬΥΤΟΝ ὕδωρ. Aqua rivularis: occurrunt etiam 2. ὕδ. ναματιαιον, "spring-water," 3. ὕδ. ἐκ Διως, "rain-water," ii. 3.

Σ.

ΣΑΚΚΙΖΟΜΕΝΟΣ. In sacco vel utri servatus. οἶνος σακκιζόμενος. de C. Pl. vi. N. B. Ασκου mentio fit vinis servandis apud Homerum, Il. iii. 247. item apud Herod. lib. ii. c. 121. sæpius apud LXX. in V. T. etiam in N. T. Matth. ix. 17. Luc. v. 37, 38.

ΣΑΡΙΣΣΑ. Hasta praelonga, Macedonica. N. B. Altitudo Corni, *fæminæ* L. comparatur ὕψει της σαρισσης, unde quivis Κρανειαν δηλειαν statu natu-

rali investigans longitudinem celebris istius teli assequetur.

ΣΑΡΚΟΡΙΖΟΣ. Radice carnosâ; distinctio inter plantas, vii. 11.

ΣΑΡΚΟΦΥΛΛΟΣ. Crassifolius, Bot. "Plantes grasses," Gall.

ΣΑΡΞ. In plantis, pars intermedia inter ἰνας et φλεβας. (vid.) Constat laminulis flexilibus in cellulas orbiculares vel ovaes dispositis, i. iv. Qui accuratiorem hujus rei velit scientiam, consulat Grewium, Malpighium, Duhamel. N. B. Caro fructûs Citri Aurantii, monente illo, nudo oculo vascula exhibet, alibi ope Microscopii ægre conspicienda. L. c. 4. p. 24. Vid. etiam Hillium de structura ligni, l. ii. c. 4.

ΣΗΜΕΙΟΝ. Punctum. ἀφ' ἑνός σημείου οἱ μισχοι, iii. 18.

ΣΗΠΩ. In aqua macero, iv. 10.

ΣΗΤΑΝΕΙΟΣ. } Ex voce Dor.
ΣΑΤΑΝΕΙΟΣ. } σατες, annuus, vii. 4. N. B. Apud Romanos vox synon. hornus, ab hora.

ΣΙΔΙΟΝ. Fructus Punicæ, *Granati*, L. etiam pl. aquaticæ Nymphææ affinis. de C. Pl. v.

ΣΙΝΔΩΝ. Vestis tenuis gossypina, "mullin," æque ac lintea. N. B. Vox ἑρῖον apud Theophr. gossypium æque

ac lanam amplectitur. Εριον εξ
 ὡς σινδονες ευτελεις, "coarse
 muslins," πολυτελεις, "fine
 muslins," (vid. Εριοφορα *Tab.*
Syst. p. 15.) iv. 9.
 ΣΙΝΟΣ. Detrimentum, injuria.
 de C. Pl. ii.
 ΣΚΑΛΙΑ. Pericarpium Caeti,
opuntiae L. de C. Pl. v.
 ΣΚΑΛΙΣΙΣ. } Sarculatio, "rak-
 ΣΚΑΛΣΙΣ. } ing," *hort.* σκαλι-
 σις και ποασμος. de C. Pl.
 iii.
 ΣΚΑΝΔΙΚΩΔΗΣ. vid. Σκανδιξ,
Tab. Syst. p. 9.
 ΣΚΙΝΘΟΣ. Urinator, "a diver,"
 iv. 6.
 ΣΚΛΗΡΟΣ. 1. Rigidus; "stiff;"
 opp. ευκαμπτω; de ligno Ar-
 buti, iii. 10. 2. De qualitate
 vini annosi. Angl. "dry."
 de C. Pl. vi.
 ΣΚΛΙΟΟΜΑΙ. syn. σκλημι, du-
 resco, i. ix.
 ΣΚΟΛΟΠΩΔΗΣ. Cruciformis,
Bot. α σκολοψ, i. 16.
 ΣΚΥΤΑΛΙΟΝ. Scutica: "a
 thong whip," iv. 5.
 ΣΠΑΘΗ. Palmes fructui infer-
 viens; Spatha, *Bot.* ii. 8.
 ΣΠΑΘΟΦΥΛΛΟΣ. Folio vagi-
 nato, *Bot.* i. 16.
 ΣΠΑΡΤΟΣ. Satus, fativus, *Bot.*
 opp. αγριω, vi. 7.
 ΣΠΕΙΡΑ. συσροφη του ξυλου:
 venæ in ligno in orbem cir-
 cumactæ ad nodos. v. 3.
 ΣΠΕΡΜΑ. Semen: ovo com-
 paratur: ὡς εχον εν εαυτω το

ὑγρον και θερμον συμφυτον ὡς
 εκλιποντων αγονον γινεται, i.
 18.
 ΣΠΙΛΑΣ. adj. γη σπιλας, terra
 glareosa. de C. Pl. i.
 ΣΠΙΝΘΕΡΙΖΩ. Scintillas inter
 urendum emitto, iii. 10.
 ΣΠΟΔΙΟΣ. Cinereus de colore.
 Κοκκυρηλια σποδια, iii. 7.
 Αμπελος σποδια.
 ΣΠΟΡΗΤΟΙ οί. Sementes, vel
 tempora ferendi: Anglice,
 "seed-time," viii. 3.
 ΣΠΟΡΟΙ οί. id.
 ΣΤΑΘΕΥΩ. Lente coquo: hinc
 derivata forsan vox Angl.
 "to stew," vii. 12.
 ΣΤΑΜΝΙΣΚΟΣ. Urceolus vinis
 fervandis: οινον εσαμνισμενον,
 ex verb. σαμνισκομαι. de C.
 Pl. ii.
 ΣΤΑΣΙΜΟΝ το. Situs loci. de
 C. Pl. v.
 ΣΤΕΓΝΟΣ. Astringens, densus.
 de C. Pl. vi.
 ΣΤΕΓΩ. Sustineo; fixus sum;
 opp. τω συμμυειν, vi. 8.
 ΣΤΕΛΕΦΟΣ? id. cum στελεχος,
 stipes.
 ΣΤΕΛΕΦΟΥΡΟΣ. 1. Cylindrico-
 caudatus, ut Bos: opp. λο-
 φουρω, cristæ-caudato, ut E-
 quus. 2. De spica Phlei L.
 aliorumque, et Plantaginis,
 vii. 10.
 ΣΤΕΡΕΟΣ. Firmus: dicitur de
 qualitate uvarum: Anglice,
 "firm, fleshy." de C. Pl.
 iii.

ΣΤΕΡΕΩΜΑ. Rostrum navis, cum ligneis firmamentis, ad impetum faciendum, vi. 8.

ΣΤΕΦΑΝΩΜΑΤΙΚΟΣ. } De
ΣΤΕΦΑΝΗΠΛΟΚΟΣ. } plantis
ΣΤΕΦΑΝΩΤΙΚΟΣ. } ad co-
ronas usitatis; "garland
flowers," vi. 7.

ΣΤΙΛΒΗΔΩΝ. Splendor; "a glossy polish." vi. 5.

ΣΤΑΕΓΓΥΣ? spec. Tritici, Catalogo Specierum inferenda *Tab. Syst.* p. 6. Vox Ægyptiaca? viii. 4.

ΣΤΟΙΧΕΩ. Ordinatum, vel in serie (στοιχῶ) dispono, iii. 16.

ΣΤΡΑΒΗ. Distortio: hinc ξυλον ασραβες, "strait-grained timber," vi. 2.

ΣΤΡΑΓΞ. Gutta: κατα στραγγα, guttatim, ix. 19.

ΣΤΡΕΦΕΙΝ τα ὑπτια. De versura foliorum in quibusdam arboribus autumnī tempore, sæpius occurrit mentio apud Theophrastum: sic quoque M. T. Varro de Re Rustica, l. i. c. 46. "Admiranda discrimina sunt naturalia, quod ex quibusdam foliis propter eorum *versuram*, quod sit anni tempus, dici possit, ut Olea, et Populus alba, et Salix."

ΣΤΡΙΦΝΟΣ. Strigosus, macilentus; hinc *metaph.* de ligno dicitur ξυλον ασραβες, στριφνον, vi. 2.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ. Cylindricus, vi. 7.

ΣΤΡΟΦΙΓΞ. Cardo: antiquitus ex ligno duro, vi. 7.

ΣΤΡΥΦΝΟΣ. Austero-acerbus, astringens: uva πρῶτον ὑδατωδης, μετα ταυτα στρυφνος· εἰτ' οξύς· εἰτ' εσχάτον γλυκύς. de C. Pl. vi.

ΣΤΥΓΕΣ αἱ. Venti gelidissimi ex antris montium: αἷς οὐκ εἰσι φυλαξασθαι, οὐδ' ἐν τοῖς στρωμασι κατακειμενον. de C. Pl. v.

ΣΤΥΠΤΗΡΙΩΔΗΣ. Astringens, stypticus. De aquis aluminosis. de C. Pl. ii.

ΣΤΓΚΛΑΩ. Confringo, iv. 8.

ΣΤΓΚΡΙΣΙΣ. Judicium ex comparatione. iv. 14.

ΣΤΖΥΓΙΑ. Conjunctio: κατα συζυγίαν, de paribus lorum folii pinnati ex opposito, Bot. iii. 15.

ΣΥΜΜΕΤΡΟΣ. Sibi accommodatus, gratus.

ΣΥΜΜΕΤΡΟΟΜΑΙ. id. Hinc Ang. vox "symmetry."

ΣΥΜΠΑΤΕΩ. Quando multitudo vel exercitus conculcat: opp. καταπατεῖν, viii. 7.

ΣΥΜΠΕΠΤΩΚΟΣ. Connivens, Bot. opp. ανεωγμενῶ. de C. Pl. i.

ΣΥΜΠΙΛΕΟΜΑΙ. Constipor: σφαιρίον φυλλικόν συμπεπιλημένον. τῇ ῥαχί του φυλλου, iii. 8.

ΣΥΜΦΥΣΙΣ. Generatio novi ligni, ix. 1.

ΣΥΜΦΥΤΟΣ. 1. Innatus: το θερμον συμφυτον, i. 18. 2. Con-
fuetus, vulgaris. ἡ Ἑλμς (tæ-
nia) συμφυτον ἐνίοις ἐθνεσι, ix.
22.

ΣΥΝΑΓΚΕΙΑ. Vallis continua-
ta. de C. Pl. ii.

ΣΥΝΑΙΤΙΑ. Causa infuper. vid.
αἰτία, ix. 6.

ΣΥΝΑΠΤΩ εἰς το αὐτο. Conglu-
tino, ix. 19.

ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΕΥΟΜΑΙ. vid. ξυν-
ανθρωπευομαι.

ΣΥΝΕΚΡΑΙΝΩ. Sensim effluo,
iii. 13.

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΣ. Compactus. de
C. Pl. iv.

ΣΥΝΕΡΕΦΩ. Una tectum effi-
cio: de tecto frondoso syl-
væ, iii. 2.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Continuatio, con-
tinuata successio, vi. 7.

ΣΥΝΘΛΑΩ. Comprimendo u-
nire: όταν συνθλωσιν ἑκατέρου
κλαδους το ἡμισυ, de unione
duorum furculorum post sec-
tionem longitudinalem. de
C. Pl.

ΣΥΝΘΕΣΙΣ. } Compositio me-
ΣΥΝΤΙΘΗΜΙ. } dicamenti: "to
make up a prescription," ix.
16.

ΣΥΝΤΑΡΡΟΣ. Ramis implica-
tis, corbis in modum, vid.
ταρρός. de C. Pl. iii.

ΣΥΝΤΗΚΩ. Una marcesco,
maceror. de C. Pl. vi.

ΣΥΡΜΑΤΙΤΙΣ. In acervum
congestus, undique attractus,
a συρω. Κοπρος συρματιτικῃ,
Quisquilix, Scal. vii. 5.

ΣΥΡΡΟΗ δακρυωδης. Coagmen-
tatio resinosa, iv. 6.

ΣΥΣΣΗΠΩ. Una marcesco. de
C. Pl. iii.

ΣΥΣΤΑΣΙΣ. 1. Coagulatio: opp.
διαλυσει. 2. ἡ πρώτη συστασις,
embryon plantæ. de C. Pl. v.

ΣΥΣΤΡΟΦΑΙ αἱ. Circumvolu-
tiones, v. 6. (vid. Σπειρα.)

ΣΦΑΚΕΛΗ. } Gangræna
ΣΦΑΚΕΛΙΣΜΟΣ. } in arboribus,
iv. 16.

ΣΦΗΚΙΟΝ. Favus Vesparum,
iv. 10.

ΣΦΗΝΟΕΙΔΗΣ. Cuneiformis.
de C. Pl. i.

ΣΦΥΡΑ μεγαλη. "a large wooden
mallet," v. 9.

ΣΦΥΡΙΓΞ. Pedunculus obtusus
malleiformis? Bot. vii. 4.

ΣΦΥΡΙΟΝ. dim. Σφυρας. Σφυ-
ριον plerumque εκ Κοτινου:
sc. ligno præduro, ib.

ΣΧΕΔΙΑ. Navis tumultuarie
facta ex lignis vel trabibus,
"a raft." Mentio fit σχεδιας
ἡ ἐχρησαντο πεντηκοντα ἱσσις,
vi. 9.

ΣΧΕΛΟΜΑ. Pars navis juxta
rostrum: το σχελομα και τας
επωτιδας, (vid.) v. 8.

ΣΧΗΜΑ. Habitus plantæ, vii.
6.

ΣΧΗΜΑΠΟΙΕΩ. Notas inuro,
ix. 4.

ΣΧΙΖΑ ἡ. "A billet of wood,"
ix. 3.

ΣΧΙΣΜΑΤΑ φυλλων. Lobi. Bot.
iii. 11.

ΣΧΟΙΝΙΑ ἡ. Juncetum: "a
bed of rushes," iv. 13.

ΣΩΜΑΤΩΣΙΣ. Induratio humi-
di: reductio in solidum. de
C. Pl. vi.

T.

ΤΑΛΑΡΟΣ. Calathus. N. B.
Antiqui semina Cucumeris,
aliorumque id genus, εν τα-
λαροις (vasibus fictilibus, an
corbibus?) durante hyeme,
locis apricis, tectis, ferebant:
"garden-pots?" de C. Pl. v.

ΤΑΝΕΙΑ. Antenna navis, a τει-
νω, "the yard of a ship on
which the sails are spread,"
iv. 1. Differt a κεραια, sed
quomodo? ambo simul oc-
currunt.

ΤΑΡΙΧΕΙΑ τα. Radiculæ vel fi-
brillæ caulinae, Hederæ pro-
priae: N. B. Succidia Gloss.
vet. sed quære: an radices
sucedaneæ? Mallem scri-
bere duplici ε, utpote ex
ταρῶν derivatum.

ΤΑΡΡΟΣ. 1. Crates ex ligno
textili, unde συνταρῶς impli-
catus. N. B. Antiquitus ταρ-
σος a τερσω, quia casei super
illis impositi exsiccabantur.

2. Implicatio ramorum vel
fibrarum radicis, ουκ ενοχλει
τω ταρῶν δια την βραχυριζιαν.
de C. Pl. iii.

ΤΑΡΡΩΔΗΣ. Implicatus. Ἐρ-
πυλος και Σισυμβριον εχουσι
ῥιζας πολλας και ταρῶδεις, vi.
7.

ΤΕΛΟΣ. Perfectio; εν τελει γε-
νεσθαι. de C. Pl. vi.

ΤΕΡΑΜΝΟΤΗΣ. Mollities.

ΤΕΡΑΜΩΝ. Tener; de quali-
tate Pisorum, &c. post coc-
tionem; τεραμονες vel ατερα-
μονες, ("they boil hard or
soft,") viii. 9.

ΤΕΡΕΤΡΙΟΝ. Pars πυρρειας.
(vid.) ex duro ligno, sc. Κο-
τινου, v. 8.

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ τα περι τρο-
πας. Dies antiquitus insigni-
nes, æque ac Halcyonii, etsi
numero impares. de C. Pl.
v.

ΤΕΤΑΝΟΕΙΔΗΣ. supr. iv. 7.

ΤΕΤΑΝΟΣ. Rigidus, tensus: de
foliis, iii. 18.

ΤΕΤΡΑΞΟΟΣ. Vid. μονοξοος.
N. B. Vox ξοος, a ξυω, rado.
Εστι γαρ πολυλλοπος ἡ Ἐλατη,
διο και τας κωπας ξυοντες αφαι-
ρειν πειρωνται καθ' ένα και
ὁμαλως, ("they work with
the grain of the wood,")
v. 2.

ΤΕΤΡΙΧΩΜΕΝΟΣ πηλος. Lu-
tum capillis mixtum ad ope-
ra cæmentitia, ut apud nos.
de C. Pl. i.

ΤΙΘΑΣΙΑ. Mansuefactio, iii. 3.

ΤΜΗΤΙΚΟΣ. Acie acuta: dicitur de glacie: ἡ παχὺν τμητικώτερα της χιονος. de C. Pl. v.

ΤΟΡΝΕΙΑ ἡ. Opus tornatile; "carved work, or turnery," v. 8.

ΤΡΑΓΑΩ. Luxurio, met. ex libidine hirci: hinc τραγᾶν dicitur de morbo vitis ex nimia luxurie; articulatio; Plin. xvii. 24. "a swelling of the joints." de C. Pl. v.

ΤΡΑΓΗΜΑ. Bellaria; "sweetmeats." N.B. Hinc vox Gallica "dragées."

ΤΡΙΓΜΟΣ. Stridor alarum infecti; "buzzing:" φθιγγονται οἷον τριγμον. de C. Pl. v.

ΤΡΙΓΟΝΕΩ. De triplici metamorphosi insectorum, τριγωνησαντες μεταβαλλουσι. vid. Καμπη.

ΤΡΙΜΜΑΤΑ τα. ῥιζων 1c. Pharm. "powders of roots in medicine?" ix. 9. 12.

ΤΡΙΟΖΟΣ. Ramis terna serie, iv. 5.

ΤΡΙΟΡΧΙΣ. Radicibus bulbosis ternis, ix. 9.

ΤΡΙΧΟΦΥΛΛΟΣ. Foliis tenuibus, linearibus, ut Pinus, &c. iii. 10.

ΤΡΟΠΑΙ αἱ. Solstitia. τρ. εαριναι, τρ. χειμεριναι.

ΤΡΟΧΙΣΚΟΣ. Trochiscus. Ang. "lozenge:" antiquitus radicis medicinalis frustulum ita

appellabatur, ix. 9.

ΤΡΟΧΜΑΛΟΣ. 1. Acervus lapidum: 2. adj. lapideus, calculis plenus, γη τροχμαλος. de C. Pl. iii.

ΤΡΥΓΗ ἡ. Fæx vini, cuius usus vice saponis, ix. 10.

ΤΡΥΠΑΝΟΝ. id. q. Τερετριον. (vid.) v. 10.

ΤΡΩΞΑΝΑ τα, a τρωξ. Radices fibrosæ? furculi juniores semesi a vermibus? de C. Pl. iii.

ΤΥΠΩ εν. Quodammodo: εν τυπω λαβειν, phras. ut ita loquar.

ΤΥΦΛΟΣ οφθαλμος. De arbore læso; "blighted;" οφθαλμος enim gemma, i. 13.

ΤΥΧΩΝ. Ordinarius: γη τυχουσα, communis, viii. 7.

Τ

ΥΓΡΑ ἡ. Tempus pluviale. de C. Pl. iv.

ΥΓΡΑΣΙΑ. Humiditas, succus, iii. 13.

ΥΔΑΡΗΣ. Aquosus: opp. πυκνω, in succis, ix. 1.

ΥΔΑΤΑ τα. Anni tempestas pluviosa in calidis regionibus, ix. Υδατα δερμα πηγνυσι διατον, optime. de C. Pl. v.

Υδρεπεπης? forf. υδρεπεψις. Succus aquosus. de C. Pl. vi.

ΥΛΗ. Materies primaria.

ΥΛΗΜΑ. Frutex, i. 9.

- ὙΛΙΚΟΙ. Foramina. Vasa fibrosa succum haurientia; "sap vessels." de C. Pl. vi.
 ὙΛΙΣΜΟΣ. Percolatio. ib.
 ὙΜΕΝΟΣΠΕΡΜΟΣ. Ab ὕμην; cujus semen capsula membranacea tectum. Hymenosperrmus. *Bot.*
 ὙΜΕΝΩΔΗΣ. Membranaceus: N. B. Μητρα vasculosa Sambuci ita vocatur, sc. vasculis membranaceis, i. 3.
 ὙΠΑΡΓΙΛΛΟΣ. Sub-argillaceus, de solo, ix. 3.
 ὙΠΑΡΩ. Leviter aro, viii. 11.
 ὙΠΕΡΠΥΡΟΣ. Calidus valde. de C. Pl. i.
 ὙΠΕΡΡΙΖΩΝ. Valde radicans. de C. Pl. iii.
 ὙΠΕΡΤΑΖΩ. } Leviter, et
 ὙΠΕΡΤΑΖΟΜΑΙ. } superficiem
 tenuis aro: εἰ μὲν ὑπερταζωνται καὶ κινήσωσι τὴν γῆν, iii. 2.
 ὙΠΙΝΟΣ. *met.* Somnus plantarum; hinc dicuntur, καθενδὲν νυκτός.
 ὙΠΟΒΑΛΛΩ. Oblique planto: opp. ὀρθοβαλλεῖν, ii. 7.
 ὙΠΟΖΥΓΙΑ. Ex usu antiquitus distinguebantur Boves aratorii a lactariis. Βοῦσι καὶ ἵπποις καὶ τοῖς Ὑποζυγίοις, ("cows, horses, and working cattle,") iv. 4.
 ὙΠΟΚΑΤΩΡΥΧΙΑ. Sursum, deorsum fossio: "trenching ground." de C. Pl. v.
 ὙΠΟΚΟΝΙΣΙΣ. Methodus maturandi uvas et cucumeres pulvere superinjecto, ii. 8. de C. Pl. iii.
 ὙΠΟΚΟΝΙΟΣ. id. ii. 8.
 ὙΠΟΛΗΨΙΣ ἢ. Fætura floris? "the setting of blossoms." de C. Pl. v.
 ὙΠΟΝΕΑΣ. Vid. νεῶω, iii. 2.
 ὙΠΟΠΤΕΡΟΣ. Volatilis; de odore. de C. Pl. vi.
 ὙΠΟΠΤΙΣΣΩ. Vid. πτισσω, iv. 10.
 ὙΠΟΡΕΙΑ. Pars subjacens monti, ix. 1.
 ὙΠΟΦΕΡΩ. vid. Ὑποληψίς.
 ὙΠΟΦΕΥΓΩ. Devito, quasi abhorreo, ix. 15.
 ὙΠΟΦΥΣΙΣ. Quod subtus crescit: distinguitur a προσφυσίς φλοιού, vi. 3.
 ὙΠΤΙΑ τὰ. Superior pars folii: opp. τῷ πρᾶναι, i. 16.
 ὙΠΤΙΟΝ τεμνῶ. *Hort.* "to prune with the cut upwards." de C. Pl. v.
 ὙΠΩΠΙΑ. Cavitates sub oculis: τὰ ὑπώπια, sugillationes, "a black eye," vulgo, ix. 22.
 ὙΣΤΕΡΕΩ. De plantis Serotinis: opp. τῷ προτερεῖν, vi. 7.
 ὙΣΤΑΙΓΞ. 1. Tentaculum in Molluscis. Linn. 2. Cirrhus in arboribus, iii. 18.
 ὙΦΙΣΤΗΜΙ. Subfido; de fluidis. de C. Pl. iv.
 Φ. ΦΑΙΟΣ. Color: ἐκ λευκοῦ καὶ μελανοῦ, "grey." de C. Pl. vi.

ΦΑΚΟΣ. Legumen φακου, viii.

5. An φακον?

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ. Medicinalis. de C. Pl. iii. Opp. φαρμακωδεις.

ΦΑΡΜΑΚΟΝ εναιμον. Medicamentum stypticum, iv. 8.

ΦΑΡΜΑΚΩΔΗΣ. Venenosus: φαρμακωδεις δυναμεις ασθενεσθαι τοις ειδικμενοις. Ita Poeta, "Effecit potō Mithridates sæpe Veneno, Toxica ne poterint sæva nocere sibi."

ΦΑΥΛΙΑ? τα. Olivæ minutæ inutiles, ii. 3.

ΦΙΛΗΔΕΩ. Sibi placeo: δια το φιληδειν, (voluptatis causa,) ix. 16.

ΦΙΛΟΖΩΟΣ. Vivax: φιλοζωα τα κεφαλορριζα, (quia hyemem durant,) vii. 12.

ΦΛΕΒΕΣ. Apud Theophrastum vasa spiralia. Vide Grewium, ii. c. 4. iii. 3. Hilium de structura ligni, ii. c. 2, 3. ubi multa de lactiferis, refiniferis, et gummosis enumerantur; etiam Malpighii Anat. t. 7. f. 30. Vid. etiam Ives, i. iv.

ΦΛΕΒΙΚΑ τα. Superficies papillosa cutis. de C. Pl. vi.

ΦΛΕΓΜΟΝΗ. Inflammatio: vid. εκπνευσεις φλεγμονων, ix. 10.

ΦΛΟΙΟΣ. Cortex plantæ. 1. φλ. κυριος. 2. φλ. επιπολης. quorum posterior sæpius, ut in Arbutō, et Platano, αυτοματως εκπιπτει. 3. φλ. adsciti-

tius, utpote Φιλλε, iv. 18. p.

ΦΟΒΗ. Loculus, capsula minutata; Bot. viii. 3. hinc Angl. "a fob."

ΦΟΡΑ. Proventus, feges, iii. 14.

ΦΡΥΓΑΝΟΝ. Ξυλωδες, και μικροφυλλον, vi. 1. Divisio generalis, Δενδρων, Θαμνων, Φρυγανικων, Ποωδων, vi. 1. Φρυγανα dividuntur in ανακανθα (inermia, Bot.) και ακανθωδη, (spinosa:) posteriora etiam in ακανθωδη αφυλλα, φυλλακανθα, (foliis spinosis,) πλορδακανθα, (ramis spinosis,) ib.

ΦΥΛΛΟΝ. Indefinite pro folio et petalo, Bot. Lobi etiam in pinnatis φυλλα vocantur; sed semel observat το ολον, folii pennati, φυλλορριζειν, διοπερ αν τις ειποι το ολον φυλλον ειναι, iii. 12.

ΦΥΛΛΟΣΚΕΠΗΣ. De arbore valde frondosa, adeo ut solis radios arceat. de C. Pl. i.

ΦΥΜΑΤΑ. Tumores, pustulæ, ix. 12.

ΦΥΣΑΙ. id.? An inflatio totius corporis, in pecoribus, "being hosed," ix. 10.

ΦΥΣΙΜΟΣ. Generativus, generando aptus. de C. Pl. iv.

ΦΥΤΕΥΜΑΤΑ τα. Plantæ ex semine: opp. μοσχευμασι.

ΦΩΛΕΥΩΝ. Nidificans: τα φωλευοντα, aves in genere: sed rectius quando plumas exuunt, a φωλεω, quia tunc

temporis latebras quærent :
"moulting birds."

X.

ΧΑΡΑΓΜΟΣ. Serratura folii.

Bot. iii. 10.

ΧΑΡΑΞ. Sudes, vallum, ii. 1.
de C. Pl. v.

ΧΑΥΝΟΣ. Laxus, porosus, iii. 6.

ΧΕΙΜΩΣΠΟΡΕΩ. Hyeme fero.
de C. Pl. iv.

ΧΕΛΥΣΜΑ. Statumen navis gu-
bernaculi ; roborandi gratia.
Poll. v. 8.

ΧΕΙΡΟΠΛΗΘΗΣ. Manipulus,
manipuli instar, ii. 7.

ΧΛΟΕΡΟΣ. } Luteo-viridis : fo-

ΧΛΩΡΟΣ. } lia Platani vo-
cantur χλωρα, "pea-green."
Varietates alibi occurrunt ;
e.g. 1. ποωδης, "grafs-green ;"
2. πρασινος, "green as a
leek ;" 3. δαφνωδης, "dark-
green."

ΧΛΟΗ. Vox generalis, pars her-
bacea : εκ του κατω κρομμυον
εκ του ακρου χλοη, vii. 4. viii. 2.

ΧΝΟΥΣ. } 1. Pollen. Bot. 2.

ΧΟΥΣ. } Villi in pericarpio
Rosæ, vi. 6. 3. Staminum
congeries in floribus.

ΧΝΟΩΔΗΣ. De floribus stami-
neis, apetalis, ut Vitis, He-
deræ, &c. viii. 3.

ΧΟΑ. Mensura, viii. 3.

ΧΟΓΧΗ. Eadem ; ex Concha
testacea. Duo cochlearia con-
tinet, ix. 6.

ΧΟΝΔΡΟΣ. Far, *Phav.* sed rec-
tius Tritici vel Hordei cujus-
dam massa farinacea. de C.,
Pl. iv.

ΧΥΛΕΥΩ. Viridi herba pasco :
"to foil cattle." de C. Pl. ii.

ΧΥΛΟΣ. } Succus plantæ ex-

ΧΥΜΟΣ. } pressus. vide οπος,
succus sponte fluens, i. 3. fa-
por, i. 19.

ΧΥΛΙΣΜΟΣ. Succu expressio :
differt ab οπισμος, ix. 8.

ΧΥΛΩΩ. Succo abundo.

ΧΡΩΜΑΙ. Coloror : ανδρος κε-
χρωμενον ανδρικως : opp. ανδρεσι
λευκοις, vii. 9.

Ψ.

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ. Instrumentum
musicum lyræforme, cui ζυ-
γον (pars curvata instar cor-
nu) proprium, v. 8.

ΨΕΚΑΔΕΣ αἱ. Τίνα πλατεα ατ-
τα φερομενα μεν φανερα· αλλ'
ου διαμενει. ψεκαδες και δρο-
σοι. de C. Pl. iv. όταν ὑπουσης
ὑγροτητος μετα τας ψεκαδας
ὑποκαυση ὁ ἥλιος. de C. Pl. v.
ου γινεται πληθος ὑδατος, αλλ',
ὡς ἐπὶ το πολυ, ψεκας. Pruinæ
particulæ glaciales hic per
τίνα πλατεα αττα videntur
describi, nisi textus sit cor-
ruptus.

ΨΙΔΩΘΡΟΣ. Calvities : radix
Αμπελου αγριας εἰς ψιλωθρον,
(vis depilatoria,) ix. 22.

ΨΙΝΕΣΘΑΙ. An ψηνεσθαι. Erodi

vermibus ψηνες vocatis. vid.

Tab. Syst. p. 35. N. B. Το ψινεσθαι, morbus Punicæ, Granatæ, L. iv. 16.

ΨΥΧΗ. Theoph. Papilio. vid. Metamorphoses Insectorum. Tab. Syst. p. 34.

ΨΥΧΡΟΣ. Qualitas lignorum quorundam: opp. θερμῶ. vid. θερμός, Πυρεΐα, v. 4.

ΨΩΡΑ. Morbus in truncis arborum scabiei similis, præcipue in Ficubus, iv. 16.

ΨΩΡΙΑΩ. id. de C. Pl. v.

Ω.

ΩΛΕΣΙΚΑΡΠΙΟΣ. Epithetum Homeri Ιτεα (Salici L.) proprium, δια το ταχυ προκαταβαλλειν προ του τελειως αδρυναι, και πεψαι τον καρπον, iii. 2. N. B. Sensum Homeri haud

plane intellexisse videtur Theophrastus, qui verbo hoc immensam substantiæ papposæ diffusionem solummodo indicat. Botanicis satis notum est flores masculos et fœmineos in Salicibus calyce papposo instructos esse. Naturæ saltem incongruum est *immatura* femina spargere, nisi morbo, vel aëris vitio. Cuivis autem, μετ' απανθησιν Ιτεας, videre licet aërem totum materie papposa repletum; amentis sc. utriusque sexûs dilabentibus, et undequaque circumfufis.

ΩΡΑ. Tempus anni; "the season of the year:" ώρα διαγελωσα, "the smiling spring." de C. Pl. i.

ΩΡΑΙΟΣ. Tempestivus: καρπος ωραιοι, iv. 5.

plane intellectus videtur
Theophrastus, cui verbo hoc
invenimus. Substantia pap-
pae distinctionem saltem modo
inducit. Hic enim satis no-
tum est, flores masculinos et
feminas in salicibus capere
proprie in se habere esse. Na-
ture saltem incongruum est
naturae femininae spargere
sui generis, et non viri-
litatis autem, nec a se ipsis
iter, videtur fieri. Item to-
tam materiam papulae rephe-
ram; autem sic utrinque
textus dissimiles, et unde
proprie circumstantia.

ΘΡΑ. Tempus anni: "the
season of the year": "the spring."
de C. Pl. i. 1. 1. 1.
ΘΡΑΙΟΖ. Temporis: "the
season": "the spring": "the summer".

verumque sunt vocis. vid.
Tab. Syll. p. 35. N. B. 7.
Hic enim, motus huius
Graecus, I. 1. 10.
ΘΡΑ. Theophr. Epist. vid.
Metamorphoses Theophrasti.
Tab. Syll. p. 34.
ΘΡΑΙΟΖ. Quibus signorum
proportio: "the proportion": "the
proportion": "the proportion".
ΘΡΑ. Hic enim in urbis ar-
borum salicis similis, praeci-
pue in Piceis, in 10.
ΘΡΑΙΟΖ. id. de C. Pl. v.

ΘΡΑΙΟΖ. Epitheton
Homeri Icar (Salicis I.) pro-
prium, de quo Theophrastus
ΘΡΑΙΟΖ. et de quo Theophrastus
et de quo Theophrastus, in 2.
N. B. Sententia Homeris habet

CATALOGUS ALPHABETICUS

PLANTARUM LINNEI

QUÆ APUD THEOPHRASTUM OCCURRUNT.

		Tab. Syst. Pag.		
A.			ALOPECURUS	4.
			Althæa, <i>officinalis</i>	15.
Abies, <i>marina</i>	23.		Amaranthus, <i>Blitum</i>	19.
Acer, <i>campestre</i>	22.		AMOMUM	3.
Aconitum, <i>Lycoctonum</i>	13.		Amomum, <i>Cardamomum</i>	ib.
Acorus, <i>calamus</i>	10.		Amygdalus, <i>communis</i>	12.
Acrosticum, <i>Thelypteris</i>	22.		Amygdalus, <i>Persica</i>	28.
ADIANTUM	ib.		Amyris, <i>Gileadensis</i>	25.
Adiant. <i>Trichomanes</i> .	23.		Anchusa, <i>tinctoria</i>	7.
Ægilops, <i>ovata</i>	21.		Andropogon, <i>Ischæmum</i>	21.
AGARICUS	23.		Andropogon, <i>Nardus</i>	22.
Agrostemma, <i>Flos Jovis</i> ^a	11.		Andryala, <i>integrifolia</i>	17.
AGROSTIS	4.		ANEMONE	13.
Ajuga, <i>Chamæpitys</i>	29.		Anethum, <i>bortense</i> ,	7.
Alchemilla, <i>arvensis</i> ^b	26.		Anethum, <i>fœniculum</i>	8.
ALLIUM : <i>spec. sex</i>	10.		ANTHEMIS	17.
Allium, <i>Cepa</i>	ib.		ANTIRRHINUM	27.
Allium, <i>Moly</i>	ib.		Apium, <i>graveolens</i>	7.
Allium, <i>Porrum</i>	11.		Aquilegia, <i>vulgaris</i> ^c	8.
Allium, <i>Scorodoprasum</i>	ib.		Arbutus, <i>Andrachne</i>	11.

^a Vid. not. p. 11.

^b Vid. not. p. 26.

^c Vid. not. p. 8.

Arbutus, <i>Unedo</i>	12.	Buxus, <i>sempervirens</i>	20.
ARISTOLOCHIA	18.		
Arum, <i>Dracunculus</i>	ib.	C.	
Arum, <i>Colocasia</i>	ib.	Cactus, <i>Opuntia</i>	12.
Arum, <i>maculatum</i>	ib.	Caltha, <i>palustris</i>	17.
Arundo <i>Donax</i> ,	4.	Capparis, <i>spinosa</i>	13.
ARUNDO : <i>spec. septem</i>	ib.	Capficum, <i>frutescens</i>	27.
Artemisia, <i>Absynthium</i>	17.	Carduus, <i>Acarua</i>	17.
Asclepias, <i>vincetoxicum</i> ^a	7.	CARDUUS : <i>spec. sex</i>	17.
Asparagus, <i>apbyllus</i>	10.	Carduus, <i>Eriophorus</i>	29.
ASPHODELUS	ib.	Carlina, <i>acaulis</i>	18.
Asphodelus, <i>ramosus</i>	ib.	Carpinus, <i>Betulus</i>	19.
Asphodelus, <i>luteus</i>	ib.	Carpinus, <i>Ostrya</i> ^e	20.
Asplenium, <i>Hemionitis</i>	22.	Carthamus, <i>corymbosus</i>	18.
After, <i>Tripolium</i> ?	29.	CAUCALIS	8.
Astragalus, <i>Tragacantha</i>	16.	CELASTRUS	ib.
ATHAMANTA : <i>spec. duæ</i>	8.	Celtis, <i>Australis</i>	22.
Athamanta, <i>Oreoselinum</i>	8.	CENCHRUS	24.
Atractylis, <i>gummifera</i>	16.	Centaurea, <i>Centaureum</i>	17.
ATRIPLEX ^b	21.	Centaurea, <i>Stæbe</i>	18.
Atropa, <i>Mandragoras</i>	8.	Ceratonia, <i>filiqua</i>	21.
Atropa, <i>Belladonna</i> ^c	9.	Cercis, <i>filiquastrum</i>	12.
Avena, <i>fatua</i>	4.	Cerithe, <i>aspera</i>	8.
		CHAMÆEROPS	22.
B.		Chelidonium, <i>majus</i>	14.
Bambusa, <i>arundinacea</i> ^d	4.	Chenopodium <i>Bon. Henricus</i>	7.
Beta, <i>vulgaris</i>	10.	Chondrilla, <i>juncæ</i>	18.
Betula, <i>alba</i>	20.	Cicer, <i>Arietinum</i>	16.
Betula, <i>Alnus</i>	19.	Cichorium, <i>Intybus</i>	17.
Brassica, <i>oleracea</i>	15.	CISTUS	14.
Brassica, <i>Rapa</i>	ib.	Citrus, <i>Medica</i>	16.
Bubon, <i>Galbanum</i>	10.	Citrus, <i>Aurantium</i>	ib.
Bulbocodium, <i>vernum</i>	ib.	Clematis, <i>Orientalis</i>	13.
Bupleurum, <i>rigidum</i>	26.	Clematis, <i>Vitalba</i> ^f	

^a Vid. not. p. 7.^b Vid. omiffa ad finem.^c Vid. not. p. 9.^d Vid. not. p. 4.^e Vid. omiffa ad finem.^f Vid. not. p. 13.

CNEORUM	5.	D.	
CNICUS	18.	Daphne, <i>Cneorum</i>	11.
<i>Cocos, nucifera</i> ?	22.	Dianthus, <i>Caryophyllus</i>	ib.
<i>Coix, Lachryma Jobi</i>	19.	Dipsacus, <i>Fullonum</i>	6.
COLUTEA : <i>tres species</i>	16.		
<i>Conium, maculatum</i>	8.	E.	
CONVALLARIA	10.	Ebenus, <i>Cretica</i>	15.
<i>Convolvulus, Scammonia</i>	9.	Echinops, <i>Ritro</i> ?	29.
<i>Convolvulus, sepium</i>	8.	EQUISETUM	26.
CONYZA	18.	ERICA	11.
<i>Coriandrum, sativum</i>	8.	Erigeron, <i>graveolens</i>	17.
<i>Cornus, mas</i>	6.	Erythronium, <i>Dens Canis</i>	30.
<i>Cornus, sanguinea</i>	ib.	ERVUM	16.
<i>Coronilla, securidaca</i>	16.	Ervum, <i>Lens</i>	15.
<i>Corylus, Avellana</i>	19.	Erysimum, <i>officinale</i>	15.
<i>Corylus, Colurna</i>	ib.	Euonymus, <i>Europæus</i>	10.
<i>Costus, Arabicus</i>	3.	EUPHORBIA : <i>spec. tres.</i>	12.
COTULA ^a	17.	Euphrasia, <i>odontitis</i>	14.
<i>Cratægus, Aria</i>	12.		
<i>Cratægus, torminalis</i>	ib.	F.	
<i>Cratægus, Azarola</i>	13.	Fagus, <i>Castanea</i>	19.
<i>Cratægus, Oxyacantha</i>	ib.	Fagus, <i>Sylvatica</i>	20.
<i>Cratægus, Pyracantha</i>	13.	Ferula, <i>communis</i>	8.
<i>Cressa, erratica</i>	9.	Ferula, <i>Ferulago</i>	ib.
CROCUS : <i>spec. duæ</i>	5.	Ferula, <i>Affasætida</i> ^b	9.
<i>Cucumis, Colocynthis</i>	19.	Ficus, <i>Caprificus</i>	21.
<i>Cucumis, sativus</i>	20.	Ficus, <i>Carica</i>	22.
CUCURBITA	ib.	Ficus, <i>Religiosa</i>	ib.
<i>Cuminum, cyminum</i>	8.	Fraxinus, <i>excelsior</i>	3.
<i>Cupressus, sempervirens</i>	19.	Fraxinus, <i>Ornus</i>	ib.
<i>Cycas, revoluta</i>	22.	FUCUS : <i>spec. octo</i>	23.
<i>Cyclamen, Europæum</i>	8.	Fumaria, <i>capreolata</i> ?	26.
<i>Cyperus, longus</i>	5.		
<i>Cyperus, esculentus</i>	ib.		
<i>Cyperus, Papyrus</i>	ib.		
<i>Cytisus, Laburnum</i>	16.		

^a Vid. not. p. 17.^b Vid. not. p. 9.

G.

Galium, verrucosum	6.
Geropogon, glaber ^a ?	18.
GLADIOLUS	5.
GLYCYRRHIZA	29.
Gossypium, arboreum	15.
Guilandina, Bonduc	11.
Gypsophila, Struthium	12.

H.

HEDERA: spec. quatuor	8.
Hedera, Helix: spec. tres	7.
Heliotropium, Europæum	ib.
HELLEBORUS: spec. duæ	13.
Heracleum, Panaces ^b ?	9.
Hesperis, matronalis	15.
Hieracium, murorum	18.
HIPPURIS ?	27.
Hordeum, vulgare: var. septem	5.
Hordeum, Zeocriton	ib.
Hottonia, palustris ? ^c	27.
Hyacinthus, comosus	11.
HYDNUM	23.
HYPOCHÆERIS	18.

I.

Iris, Florentina	4.
Iris, Sisyriuchium	6.
Iris, Xiphium	ib.
Juglans, Regia	19.
Juniperus, communis	20.
Juniperus, Oxycedrus	21.

Juniperus, Lycia	21.
Juniperus, Sabina	ib.
Ixia, bulbocodium ? ^d	10.

L.

Lactuca, sativa	17.
Lactuca, sylvestris	ib.
Laserpitium, latifolium	9.
Laserpitii var. tres	ib.
Lathyrus, amphicarpus	15.
Lathyrus, Aphaca	ib.
Lathyrus, Clymenum	16.
Lathyrus, sativus	ib.
Laurus, nobilis	11.
Laurus, gracilis	ib.
Laurus, Cassia	ib.
Lavandula, spica	14.
Lavatera, arborea	15.
Lemna, trisulca	19.
Leontodon, Taraxicum	17.
Leucoium, vernum	10.
Lichen, pulmonarius	23.
Lilium, album	10.
Linum, usitatissimum,	8.
Liquidambar, styraciflua	20.
Lolium temulentum	4.
Lotus, Melilotus	16.
LUPINUS	15.
LYCHNIS	12.
Lycium, Europæum ^e	9.
Lycoperdon, Bovista	23.
Lygeum, spartum	5.

^a Vid. not. p. 18.^b Vid. not. p. 9.^c Vid. not. p. 27.^d Vid. not. p. 10.^e Vid. not. p. 9.

M.		Nymphæa, <i>Lotus</i>	14.
		Nymphæa, <i>Nelumbo</i>	ib.
Mangifera, <i>Indica</i> ?	27.	O.	
Marrubium, <i>album</i>	15.		
Marrubium, <i>Pseudo-dictamnus</i> ^a	ib.	Ocimum, <i>Basilicum</i>	14.
MATRICARIA ^b	17.	Olea, <i>Europæa</i>	3.
Medica, <i>sativa</i>	16.	Olea, <i>sylvestris</i>	ib.
Medicago, <i>arborea</i>	16.	Ononis, <i>Antiquorum</i>	16.
Melampyrum, <i>arvense</i>	14.	Onopordum, <i>Acanthium</i>	18.
Melissa, <i>officinalis</i> ^c	14.	Ophrys, <i>nidus avis</i>	ib.
Melittis, <i>Melissophyllum</i>	14.	ORCHIS	ib.
MENTHA	ib.	Origanum, <i>Ægyptiacum</i>	15.
Mentha, <i>Pulegium</i>	ib.	Origanum, <i>Dictamnus</i>	14.
Menyanthes, <i>trifoliata</i>	8.	Origanum, <i>Majorana</i> : var.	
Menyanthes, <i>Nymphæoides</i> ^d ?	ib.	duæ	ib.
Mercurialis, <i>perennis</i>	30.	OROBANCHE	ib.
Mespilus, <i>Germanica</i>	13.	OROBUS	16.
MILIUM ^e ?	5.	Oryza, <i>sativa</i>	10.
Mimosa, <i>Nilotica</i>	21.	P.	
Mimosa, <i>sensitiva</i>	22.		
MOMORDICA	20. 27.	Palma, <i>Thebaica</i>	22.
Morus, <i>nigra</i>	ib.	PANICUM	4.
Myrica, <i>Gale</i>	21.	Panicum, <i>Italicum</i>	5.
Myrica, <i>Cordifolia</i>	ib.	Papaver, <i>Orientale</i>	14.
Myrtus, <i>communis</i>	13.	Parietaria, <i>officinalis</i>	22.
N.		Peucedanum, <i>officinale</i>	9.
		PEZIZA ?	23.
NARCISSUS	10.	PHALLUS	ib.
Narcissus, <i>Pseudo-Narcissus</i>	ib.	Phaseolus, <i>vulgaris</i>	15.
Narcissus, <i>Poeticus</i>	ib.	Phillyrea, <i>latifolia</i>	4.
Narcissus, <i>Bulbocodium</i> ^f	ib.	PHLEUM ^g	

^a Vid. omiffa ad finem.^b Vid. not. p. 17.^c Vid. not. p. 14.^d Vid. not. p. 8.^e Vid. omiffa ad finem, et not. *Μελις*, p. 5.^f Vid. not. p. 10.^g Vid. omiffa ad finem; etiam not. p. 4.

Phœnix, <i>Dactylifera</i>	22.	Pyrus, <i>sylvestri statu</i>	24.
Phyllanthus, <i>Emblica</i> ^a	27.	Pyrus, <i>Cydonia</i>	13. 24.
Physalis, <i>somnifera</i> ^b	9.		
PICRIS	18.	Q.	
Pinus, <i>Abies</i>	19.	QUERCUS: <i>spec. octo</i>	19.
Pinus, <i>Cembra</i> ^c	20.	Quercus, <i>Prinus</i>	20.
Pinus, <i>Picea</i>	19.	Quercus, <i>Ægilops</i>	19.
Pinus, <i>Pinea</i>	20.		
Pinus, <i>Pinaster</i>	ib.	R.	
Pinus, <i>sylvestris</i>	ib.	Raphanus, <i>sativus: var.</i>	
Pinus, <i>Larix</i> ^d	ib.	<i>quatuor</i>	15.
Piper, <i>nigrum</i>	4.	RHAMMUS: <i>spec. duæ</i>	9.
Pistacia, <i>Terebinthus</i>	21.	Rhamnus, <i>Alaternus</i>	7. 30.
Pisum, <i>sativum</i>	16.	Rhamnus, <i>Paliurus</i> ^f	8.
Pisum, <i>Ocbrus</i>	ib.	Rhamnus, <i>Spina Christi</i>	8.
Plantago, <i>major</i>	6.	Rheum, <i>Rhaponticum</i>	11.
Plantago, <i>Coronopus</i>	ib.	RHIZOPHORA	12.
Plantago, <i>Cynops</i>	ib.	Rhus, <i>Coriaria: spec. duæ</i>	9.
Plantago, <i>Psyllium</i> ^e	ib.	Rhus, <i>Cotinus</i>	8.
Platanus, <i>Orientalis</i>	20.	Ribes, <i>Grossularia</i>	ib.
POA	5.	Ricinus, <i>Palma Christi</i>	19.
Polygonum, <i>Fagopyrum</i>	11. 28.	ROSÆ: <i>var. quatuor</i>	13.
POLYPODIUM	22.	RUBI <i>spec. tres</i>	12.
Populus, <i>nigra</i>	20.	Rubia, <i>tinctorum</i>	6.
Populus, <i>alba</i>	21.	Rubus, <i>Idæus</i>	12.
PRUNUS	13.	Rumex, <i>acetosa</i>	10.
Prunus, <i>Laurocerasus</i>	12.	Ruscus, <i>hypophyllum</i>	21.
Prunus, <i>Padus</i>	13.	Ruscus, <i>aculeatus</i>	ib.
Prunus, <i>Cerasus</i>	12.	Ruta, <i>graveolens</i>	12.
Prunus, <i>Mahaleb</i>	ib.		
PTERIS	22.	S.	
Punica, <i>granata</i>	13.	Saccharum, <i>Ravennæ</i> ^g	
Pyrus, <i>communis</i>	12.	Salicornia, <i>fruticosa</i>	3.
Pyrus, <i>sylvestri statu</i>	ib.		
Pyrus, <i>malus</i>	13.		

^a Myrobalanus Bauh.^b Vid. not. l. p. 9.^c Vid. not. p. 20.^d Vid. not. p. 20. item Cat. Alph. p. 59.^e Vid. not. p. 6.^f Vid. not. p. 8.^g Vid. omiffa ad finem.

SALIX : <i>spec. tres</i>	21.	T.	
<i>Salix, viminalis</i>	24.	<i>Taxus, baccata</i>	21.
<i>Salvia, borminum</i>	4.	<i>Teucrium, Chamædrys</i>	15.
<i>Salvia, bortenſis</i>	ib.	THAPSIA	7.
<i>Salvia, officinalis</i>	3.	<i>Thapſia, Aſclepium</i>	ib.
<i>Salvia, Sclarea</i>	24.	THYMBRA	14.
<i>Sambucus, nigra</i>	7.	<i>Thymus, vulgaris</i>	ib.
<i>Santolina, Roſmarinifolia</i>	16.	<i>Thymus, ſerpyllum</i>	ib.
<i>Satureia, bortenſis</i>	14.	<i>Thymus, maſticbina?</i>	26.
<i>Satureia, Thymbra</i> ^a	ib.	<i>Thuja, apbylla</i>	19.
SATYRIUM ^b	18.	<i>Tilia, Europæa</i>	14.
<i>Scandix, Peçten</i>	9.	<i>Tordylium, officinale</i>	9.
SCHŒNUS : <i>ſpec. tres</i>	6.	TORMENTILLA	13.
<i>Scilla, unifolia</i>	10.	<i>Tragopogon, Orientale</i>	18.
SCILLA : <i>ſpec. duæ</i>	11.	<i>Trapa, natans</i>	7.
SCIRPUS	6.	<i>Tribulus, terreſtris</i>	12.
<i>Scolymus, Hiſpanicus</i>	18.	<i>Trifolium, officinale</i>	16.
<i>Secale, Cereale</i>	4.	TRITICUM : <i>var. octo.</i>	6.
SELINUM	9.	<i>Triticum, monococcum</i>	4.
<i>Selinum, paluſtre</i> ^c	7.	<i>Triticum, Spelta</i>	6.
<i>Sempervivum, arboreum</i>	12.	TUBER	23.
<i>Serapias, Helleborine</i>	18.	<i>Typha, latifolia</i>	20.
<i>Serratula, arvenſis</i>	17.		
<i>Sefamum, Orientale</i>	15.		
<i>Sinapi, nigrum</i>	ib.	U.	
SISYMBRIUM	7.	ULEX	29.
<i>Sifymbrium, Naſturtium</i>	15.	<i>Ulmus, campeſtris</i>	9.
<i>Smilax, aſpera</i>	21.	<i>Ulmus, montanus</i>	ib.
<i>Smyrnum, oliſatrum</i>	8.	<i>Ulva, Lactuca</i>	23.
SOLANUM : <i>ſpec. tres</i>	9.		
<i>Sonchus, aſper</i> ^d	17.	V.	
<i>Sonchus, oleraceus</i>	18.	<i>Vaccinium, Vitis Idæa</i>	24.
<i>Sorbus, domeſtica</i>	13.	VERBASCUM	7.
SPARGANIUM	19.	<i>Veronica, Chamædrys</i>	4.

^a Vid. not. p. 14.^b Vid. not. p. 18.^c Vid. not. p. 7.^d Vid. not. p. 17.

Viburnum, <i>Opulus</i>	7.	Vitex, <i>agnus castus</i>	14.
Viburnum, <i>Lantana</i> ^a	11.	Vitis, <i>vinifera</i> : var. <i>sex</i>	7.
Vicia, <i>cracca</i>	15.		
Vicia, <i>Faba</i>	16.		
VIOLA : var. <i>duæ</i>	17.	Z.	
Viscum, <i>album</i>	21.	Zostera, <i>marina</i>	23.

^c Vid. not. Δαφνη αγγια. p. 11.

CORRIGENDA ET OMISSA.

CATALOGUS ALPHABETICUS.

Αιγιρος. <i>Diæc.</i>	Ἰπποφειως. <i>Tetradyn.</i>
1. Αιγιλωψ. <i>Triandr.</i>	Κυδωνιος. <i>Icosandr.</i>
2. Αιγιλωψ. <i>gram. Polygamia.</i>	Λακαρα. <i>Icosandr.</i>
Ἄλιμον, το. <i>Polygamia</i> , lege <i>Monandr.</i>	Λειμωδωρον. <i>Class. incert.</i>
Ἀπατη. <i>Class. incert.</i> lege <i>Syngenes.</i>	Λιβανον. <i>Class. incert.</i> lege <i>Diæc.</i>
Syn. Αφακης.	Λιμνωδες τι. <i>Class. incert.</i>
Βαλανος. <i>Class. incert.</i> lege <i>Decandr.</i>	Μυα? an error textûs? id.
Βλιτον. <i>Polygam.</i> lege <i>Monæc.</i>	Μυδιον? id.
Δενδρον τιγρινον. <i>Class. incert.</i>	Ναρτη. vid. <i>Ναρδος. Polygam.</i>
Δρυς ποντια. <i>Crypt.</i>	Οινοθηρα. <i>Hexandr.</i>
Ελατηριον. <i>Class. incert.</i>	Οινορανθης? de C. Pl. vi. <i>Class. incert.</i>
Ελειολειμωνια. <i>Class. incert.</i>	Οξυακαρπα. iii. 6. an pro Οξυακανθα?
Ελαιοχρυσος. <i>Class. incert.</i> lege <i>Syngen.</i>	Οσπρις. vid. <i>Δρυς.</i>
Ἐλξινη. <i>Class. incert.</i>	Παιωνια. <i>Polyandr.</i> syn. <i>Γλυκυσιδης.</i>
Ἐσπρις. <i>Tetradyn.</i>	Πιλος. <i>Class. incert.</i>
Θησειον. <i>Class. incert.</i> lege <i>Enneandr.</i>	1. Στρουδιος. <i>Icosandr.</i>
Ιξινη. <i>Class. incert.</i> lege <i>Syngenes.</i>	2. Στρουδιος. <i>Class. incert.</i>

TAB. SYSTEMATICA.

Σαρι το. <i>Saccharum, Ravennæ, Fl.</i>	Οχνη. <i>Icosandr.</i>
Græc. <i>Triandr.</i> Vid. Cat. Alph. p. 65.	Ψευδο-Δικταμνος, lege <i>Marrubium</i>
Στελεφουρος. <i>Triandr.</i> Gramen <i>Phleum.</i>	<i>Pseudo-dictamnus</i>
Sed textus corruptus. Vid. Cat. Alph. p. 70.	Κεντηρια. <i>Syngenes.</i> syn. <i>Ατρακτυλιδος.</i>
Ορτυξ <i>Tetrandr.</i> syn. <i>Αερογλωσσου.</i>	Οσρυα. <i>Carpinus, Ostrya.</i>
Ευηπατον. <i>Pentandr.</i> syn. <i>Στρυχνου.</i>	Κεγχρος, <i>Cenchrus, Polygam.</i> nisi for- san <i>Milium</i> vel <i>Panicum.</i>
Ανδραφαξις. } Inter <i>Pentandr.</i> et <i>Poly-</i>	Πιλος inter <i>Fungos</i> , ut affinis <i>Σφαιρις.</i>
Ατραφαξις. } gam. occurrit. Incertum	Δαφνη ποντια. <i>Tab. Syst.</i> p. 37. infe- videtur an <i>Chenopodium</i> vel <i>Atriplex.</i>
Σχοινος, <i>Καλαμος. Hexandr.</i>	Θυμον λιθοειδες. <i>Tab. Syst.</i> p. 37. infe- rend.

ERRATA TYPOGRAPHICA.

CATAL. ALPHABETICUS.

Pag.

14. l. 21. *lege* comparantur

18. l. antepenult. *lege* πλατυφυλλος

24. l. 2. *lege* κυκλῆδον

32. l. 27. *lege* solstitio

35. l. 13. *lege* fluviorum

55. l. 9. *lege* Polygonum

TAB. SYSTEMATICA ET LEX.

Pag.

11. not. b. *lege* frequentissimus

19. col. 2. l. ult. *lege* trifulca

43. col. 2. l. 8. *lege* Αντιδιηρημενος

48. col. 1. l. 30. *lege* Gymnospermus

50. col. 1. l. 11. *lege* Διευρυνω

63. col. 2. l. 6. *lege* δικιλλα

Stackhouse, John

Illustrationes Theophrasti in usum botanicorum

Oxonia 1811

A.gr.b. 3269

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10238436-2